

执业医师考试考前直播冲刺

中医-执业医师

【中医妇科学】

1. 下列哪项不是月经的生理现象

- A. 周期21-35天
- B. 经期3-7天
- C. 经量100-150mL
- D. 经色暗红
- E. 经质不稀不稠，无血块，无特殊气味

【答案】C

2. 直接损伤冲任，导致妇科疾病的是

- A. 气血失调，脏腑功能失常
- B. 情志不畅，肝气郁结
- C. 思虑过度，劳伤心脾
- D. 阴虚肺燥，虚火内生
- E. 经期产时，感染邪毒

【答案】E

3. 下列除哪项外，均是胞宫的别称

- A. 胞室
- B. 子宫
- C. 子处
- D. 阴户
- E. 女子胞

【答案】D

4. 下列有关预产期的计算正确的是

- A. 以末次月经结束后的第一天起计算
- B. 以末次月经的最后一天起计算
- C. 以尿检阳性的第一天起计算
- D. 以末次月经的第一天起计算
- E. 月数加9（或减3） 日数加14

【答案】D

5. 下列哪项不是月经先期气虚证的主证

- A. 月经量多
- B. 色淡质稀
- C. 神疲肢软
- D. 小腹疼痛拒按
- E. 纳少便溏

【答案】D

6. 下列哪项不是月经先期肝郁化热证的主症

- A. 经量或多或少
- B. 色鲜红或紫红
- C. 胸闷，乳胀
- D. 小腹疼痛拒按
- E. 精神抑郁

【答案】E

7. 月经先后无定期的主要发病机理是

- A. 肝郁气滞，疏泄失调
- B. 肾气不足，封藏失职
- C. 脾气虚弱，统摄无权
- D. 湿热下注，任带不固
- E. 气血失调，血海蓄溢失常

【答案】E

8. 治疗月经后期虚寒证，应首选

- A. 温经汤（《妇人大全良方》）
- B. 桂枝茯苓丸
- C. 艾附暖宫丸
- D. 寿胎丸
- E. 归肾丸

【答案】C

9. 妊娠初期，每月仍有少量月经而无损于胎儿者，称为

- A. 暗经
- B. 居经
- C. 垢胎
- D. 胎漏
- E. 暗产

【答案】C

10. “治崩三法”是指

- A. 止血、固脱、调经
- B. 调经、固本、善后
- C. 补肾、扶脾、调肝
- D. 塞流、澄源、复旧
- E. 以上都不是

【答案】D

11. 下列哪项不是闭经的临床常见证型

- A. 湿热下注
- B. 痰湿阻滞
- C. 肝肾不足
- D. 气血虚弱
- E. 气滞血瘀

【答案】A

12. 治疗肾虚型子肿的代表方剂是

- A. 白术散
- B. 六味地黄丸
- C. 五苓散
- D. 真武汤
- E. 健固汤

【答案】D

13. 治疗血瘀不孕症偏于寒，应首选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 开郁种玉汤

【答案】C

14. 阴痒的病机是

- A. 肾阴虚损，阴虚燥热
- B. 肝经湿热，肝肾阴虚
- C. 肝郁血虚，血虚生风
- D. 会阴损伤，湿热虫蚀
- E. 痰湿瘀结，郁而化热

【答案】B

15. 治疗痛经湿热瘀阻证，应首选

- A. 清热调血汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 知柏地黄汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 加味逍遥散

【答案】A

16. 温经汤（《妇人大全良方》）适用于月经后期的哪种证型

- A. 实寒
- B. 虚寒
- C. 血瘀
- D. 血虚
- E. 气滞

【答案】A

17. 阴虚血燥型闭经首选为

- A. 两地汤
- B. 知柏地黄丸
- C. 左归丸
- D. 加减一阴煎
- E. 保阴煎

【答案】D

18. 下列除哪一脏腑外，其他脏腑都是中医“经行吐衄”的病位

- A. 肝
- B. 心
- C. 胃
- D. 肺
- E. 肾

【答案】C

19. 妊娠恶阻的主要病机是

- A. 胃气亏虚，和降失司
- B. 冲脉之气上逆，胃失和降
- C. 肝郁化热，气逆犯胃
- D. 痰湿内蕴，胃失和降
- E. 气血逆乱，冲气上逆

【答案】B

20. 治疗肝郁不孕症，应首选

- A. 柴胡疏肝散
- B. 加味逍遥散
- C. 开郁种玉汤
- D. 桃红四物汤
- E. 少腹逐瘀汤

【答案】C

21. 治疗阴痒肝肾阴虚证，应首选

- A. 左归丸
- B. 归肾丸
- C. 保阴煎
- D. 固阴煎
- E. 知柏地黄汤

【答案】E

22. 患者，22岁。月经提前8天，量多、色淡、质稀，神疲，肢软，少腹空坠，纳少便溏，舌淡苔薄，脉缓弱。其诊断是

- A. 月经过多气虚证
- B. 月经先期气虚证
- C. 崩漏脾虚证
- D. 经行泄泻脾虚证
- E. 以上均非

【答案】B

23. 月经先期阴虚血热证的发病机理是

- A. 阴虚失守，冲任不固
- B. 肝郁气滞，疏泄失常
- C. 肾阴不足，封藏失职
- D. 阴虚阳盛，热扰冲任
- E. 湿热下注，血热妄行

【答案】D

24. 月经先期脾气虚证，治疗应首选

- A. 补中益气汤
- B. 固阴煎
- C. 清经散
- D. 两地汤
- E. 丹栀逍遥散

【答案】A

25. 经血非时暴下不止或淋漓不尽，最恰当的称谓是

- A. 经崩
- B. 经漏
- C. 崩漏
- D. 漏下
- E. 崩中

【答案】C

26. 气滞血瘀型痛经的特点是

- A. 经前、经期小腹冷痛
- B. 经前、经期小腹胀痛
- C. 经前、经期小腹坠痛
- D. 经期、经后小腹隐痛
- E. 经期、经后小腹灼痛

【答案】B

27. 女子受孕与哪一组脏器、经脉气血关系最密切

- A. 心和冲任二脉
- B. 肝和冲任二脉
- C. 脾和冲任二脉
- D. 肺和冲任二脉
- E. 肾和冲任二脉

【答案】E

28. 妊娠初期，恶心呕吐，呕吐酸苦水，胸胁满闷，口苦咽干，舌红苔黄，脉弦滑。应治以

- A. 调气和中、降逆止呕
- B. 抑肝和胃、降逆止呕
- C. 益气养阴、和胃止呕
- D. 健脾和胃、降逆止呕
- E. 养阴清热、和胃止呕

【答案】B

29. 产后血瘀发热最佳选方

- A. 解毒活血汤
- B. 生化汤
- C. 桃红四物汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 失笑散

【答案】B

30. 治疗肾阴虚不孕症，应首选

- A. 毓麟珠
- B. 右归丸
- C. 养精种玉汤
- D. 开郁种玉汤
- E. 苍附导痰丸

【答案】C

31. 哪种情况可以放置宫内节育器

- A. 顺产3月后
- B. 剖宫产3月后
- C. 顺产1月后
- D. 剖宫产1月后
- E. 剖宫产半年后

【答案】E

32. 患者，女，19岁。经期前后不定，经量或多或少，经行不畅，有血块，胸胁、乳房、少腹胀痛，精神抑郁，舌苔薄白，脉弦。治疗应首选

- A. 香棱丸
- B. 丹栀逍遥散
- C. 逍遥散
- D. 乌药汤
- E. 柴胡疏肝散

【答案】C

33. 患者，女，34岁，已婚。阴道出血40天不止，量多，色淡，质稀，神倦乏力，面浮肢肿，不思饮食，手足不温，舌淡苔白，脉沉弱。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 补中益气汤
- C. 固本止崩汤
- D. 举元煎
- E. 大补元煎

【答案】C

34. 患者，女，19岁。月经尚未初潮，头晕耳鸣，腰酸腿软，倦怠乏力，舌淡少苔，脉沉细。治疗应首选

- A. 大营煎
- B. 调肝汤
- C. 归肾丸
- D. 固阴煎
- E. 大补元煎

【答案】C

35. 患者，女，26岁，已婚。近半年来经行第1天少腹胀痛明显，拒按，伴乳房胀痛，月经量少，色暗有血块，血块排出后痛减。舌紫苔白，脉弦。其治法是

- A. 温经暖宫止痛
- B. 除湿散寒止痛
- C. 补气活血止痛
- D. 益肾养肝止痛
- E. 理气化瘀止痛

【答案】E

36. 患者，女，40岁，已婚。每值经前1天出现大便泄泻，脘腹胀满，面浮肢肿，神疲肢软，经净渐止，舌淡红，苔白，脉濡缓。治疗应首选

- A. 人参健脾丸
- B. 香砂六君子汤
- C. 补中益气汤
- D. 痛泻要方
- E. 参苓白术散

【答案】E

37. 患者，女，35岁，已婚。患带下病3年，带下清冷、量多、质稀，腰酸腿软，少腹发凉，大便溏，舌淡苔薄白，脉沉迟。其证候是

- A. 肾阳虚
- B. 肾阴虚
- C. 湿热
- D. 脾虚
- E. 热毒

【答案】A

38. 患者，女，35岁，素体见神疲，腰膝酸软，白带清稀，怀孕8周后，胎动不安，舌淡苔白，脉沉弱。其证候是

- A. 肾虚不固之胎动不安
- B. 肾阳虚之胎动不安
- C. 肾阴虚之胎动不安
- D. 肾精不足之胎动不安
- E. 肾不纳气之胎动不安

【答案】 A

39. 患者，女，33岁，已婚。孕5个月，面浮肢肿，肿处皮薄而光亮，按之凹陷不起，腰酸无力，下肢逆冷，舌淡苔白润，脉沉迟。诊为子肿，其证候是

- A. 脾虚
- B. 肾虚
- C. 气滞
- D. 血瘀
- E. 脾虚气滞

【答案】B

40. 患者，女，34岁，已婚。月经50多天一行，量少，色暗，少腹胀闷，胸胁乳房作胀，舌苔薄白，脉弦。治疗应首选

- A. 逍遥散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 乌药汤
- D. 香棱丸
- E. 小柴胡汤

【答案】C

41. 患者，女，27岁，已婚。经来量多半年，周期23天，经期7天，妇科检查示子宫前位，如鸡蛋大小，质中，双侧附件(一)。应首先考虑的是

- A. 血崩
- B. 经乱
- C. 月经先期
- D. 瘀血出血
- E. 月经过多

【答案】E

42. 患者，女，19岁，未婚。月事非时而下，量多如崩，色深红，质稠，伴心烦，口渴欲饮，便干溲黄，面部痤疮，舌红，苔薄黄，脉数。其治法是

- A. 滋阴清热，止血调经
- B. 清热凉血，止血调经
- C. 滋水益阴，止血调经
- D. 活血化瘀，止血调经
- E. 益气摄血，止血调经

【答案】B

43. 患者，女，20岁。经来量少，1天即净，现已停经半年，平时带下量多，色白，形体肥胖，胸脘满闷，时欲呕恶，舌苔腻，脉滑。治疗应首选

- A. 苍附导痰丸
- B. 芎归二陈汤
- C. 启宫丸
- D. 归肾丸
- E. 温胆汤

【答案】A

44. 患者，女，29岁，已婚。每于经前和经期少腹灼痛，拒按，痛连腰骶，经量多、色暗红，伴低热，带下量多、黄稠、臭秽，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 解毒活血汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 清热固经汤
- E. 清热调血汤

【答案】E

45. 患者，女，40岁，已婚。每值经前1天出现大便溏泻。脘腹胀满，面浮肢肿，神疲肢软，经净渐止，舌淡红苔白，脉濡缓。治疗应首选

- A. 健固汤
- B. 香砂六君子汤
- C. 补中益气汤
- D. 白术散
- E. 参苓白术散

【答案】E

46. 患者，女，49岁，已婚。月经紊乱1年，烘热汗出，头晕耳鸣，失眠多梦，腰膝酸软，烦躁起急，舌红，少苔，脉细数。治疗应首选

- A. 二至丸
- B. 左归饮
- C. 知柏地黄汤
- D. 甘麦大枣汤
- E. 固阴煎

【答案】B

47. 患者，女，36岁，已婚。带下量多，色白，质黏，无味，纳少便溏，神疲肢倦，舌淡苔白腻，脉缓弱。治疗应首选

- A. 完带汤
- B. 止带方
- C. 革薢渗湿汤
- D. 参苓白术散
- E. 香砂六君子汤

【答案】A

48. 患者，女，28岁，已婚。孕50天。腰酸腹痛，阴道少量出血，色淡暗，头晕耳鸣，小便清长，舌淡苔白，脉细缓滑。治疗应首选

- A. 寿胎丸
- B. 圣愈汤
- C. 胎元饮
- D. 举元煎
- E. 保阴煎

【答案】A

49. 下列哪项不是直接导致冲任损伤的因素

- A. 邪毒感染
- B. 郁怒悲伤
- C. 房劳多产
- D. 跌仆闪挫
- E. 寒湿之邪

【答案】B

50. 经期延长阴虚血热证的发病机制是

- A. 阴虚失守，冲任不固
- B. 肝郁气滞，疏泄失常
- C. 肾阴不足，封藏失职
- D. 阴虚内热，热扰冲任
- E. 湿热下注，血热妄行

【答案】D

51. 产后发热感染邪毒证的临床特点是

- A. 高热寒战
- B. 恶寒发热
- C. 寒热时作
- D. 低热不退
- E. 午后潮热

【答案】A

52. 产后三急是指

- A. 呕吐、泄泻、盗汗
- B. 高热、昏迷、自汗
- C. 心悸、气短、抽搐
- D. 尿闭、便难、冷汗
- E. 下血、腹痛、心悸

【答案】A

53. 妇人癥瘕的主症是

- A. 下腹部胀满
- B. 下腹部疼痛
- C. 腰腹部疼痛
- D. 下腹部结块
- E. 月经过多

【答案】D

54. 宫内节育器放置禁忌证，不包括

- A. 滴虫阴道炎
- B. 月经过多
- C. 重度痛经
- D. 宫颈口松弛
- E. 足月产后3个月

【答案】E

55. 下列不属于雌激素作用的是

- A. 促进卵泡发育
- B. 使阴道上皮细胞脱落加快
- C. 促使乳腺管增生
- D. 促进第二性征发育
- E. 促进骨中钙的沉积

【答案】B

56. 围生期是指

- A. 孕期28周到生后1周
- B. 孕期29周到生后4周
- C. 孕期38周到生后2周
- D. 孕期38周到生后4周
- E. 孕期40周到生后4周

【答案】A

57. 宫颈锥形切除术的适应证，不包括

- A. 宫颈轻、中度不典型增生
- B. 疑有宫颈管内癌变
- C. 宫颈刮片多次异常而活检未发现病变
- D. 宫颈重度糜烂
- E. 宫颈息肉

【答案】E

58. 止带方适用于带下病的哪种证候

- A. 肾阳虚
- B. 肾阴虚
- C. 脾虚
- D. 湿热
- E. 湿毒

【答案】D

59. 带下病的主要发病机制是

- A. 外感湿邪，损及任、带，约固无力
- B. 肾气不足，封藏失职，阴液滑脱而下
- C. 湿邪影响任、带，任脉不固，带脉失约
- D. 脾虚生湿，流注下焦，伤及任、带
- E. 肝经湿热，流注下焦，伤及任、带

【答案】C

60. 下列哪项不是寿胎丸的组成药物

- A. 菟丝子
- B. 杜仲
- C. 桑寄生
- D. 川断
- E. 阿胶

【答案】B

61. 胎动不安和异位妊娠的鉴别要点，不包括

- A. 阴道出血
- B. 腹痛程度、性质
- C. B超检测孕囊着床部位
- D. 妇检宫颈举痛
- E. 妇检附件包块

【答案】D

62. 女子婚后未避孕，有正常性生活，丈夫查精液常规正常，同居2年未受孕者，称为

- A. 断绪
- B. 不育
- C. 全不产
- D. 绝对不孕
- E. 五不女

【答案】C

63. 下列易导致妇产科疾病发生的是

- A. 风、寒、湿
- B. 风、湿、热
- C. 寒、热、湿
- D. 寒、暑、热
- E. 寒、湿、燥

【答案】C

64. 痛经寒湿凝滞证的治法是

- A. 理气化瘀止痛
- B. 温经暖宫止痛
- C. 温经活血，调经止痛
- D. 温经除湿，化瘀止痛
- E. 温经化痰，利湿止痛

【答案】D

65. 治疗月经先期阳盛血热证，应首选

- A. 清经散
- B. 逍遥散
- C. 当归芍药散
- D. 导赤散
- E. 柴胡疏肝散

【答案】A

66. 异位妊娠手术的适应证，不包括

- A. 输卵管间质部妊娠
- B. 残角子宫妊娠
- C. 妊娠试验持续阳性，包块继续长大
- D. 输卵管破损时间较长，形成血肿包块
- E. 愿意同时施行绝育术者

【答案】D

67. 下列疾病，不会出现妇科血崩证的是

- A. 堕胎
- B. 崩漏
- C. 经行吐衄
- D. 晚期产后出血
- E. 小产

【答案】C

68. 患者，女，27岁，已婚。近几个月来带下量多、黏稠、色黄，胸闷心烦，纳少便溏，舌淡红苔黄略腻，脉细。其治法是

- A. 清热利湿止带
- B. 健脾利湿止带
- C. 健脾益气止带
- D. 清热解毒止带
- E. 补肾健脾止带

【答案】A

69. 患者，女，22岁，未婚。经期延后，量少、色暗、有血块，腹痛喜热，畏寒，舌暗苔白，脉沉紧。其治法是

- A. 暖宫止痛调经
- B. 理气止痛调经
- C. 活血行气调经
- D. 扶阳祛寒调经
- E. 温经散寒调经

【答案】E

70. 患者，女，26岁，已婚。月经35d一行，量少、色淡、质稀；每于行经出现大便泄泻，腰酸畏寒，四肢不温，带下清稀如水，舌淡苔白，脉沉迟。其证型是

- A. 脾虚
- B. 肾虚
- C. 湿热
- D. 寒湿
- E. 肝木乘脾

【答案】B

71. 患者，女，32岁，已婚。妊娠2个月，近日因恶阻而恶心呕吐，呕吐酸苦水，不能进食，胸满胁痛，舌红苔黄，脉弦滑。其证型是

- A. 肝胃不和
- B. 胃虚
- C. 胃热
- D. 痰滞
- E. 气滞

【答案】A

72. 患者，女，24岁，已婚。停经38d，突然下腹部疼痛剧烈，呈持续性，伴头晕乏力，甚则晕厥，尿妊娠试验(+)。首选的检查方法是

- A. 腹腔穿刺
- B. 诊断性刮宫
- C. 经阴道后穹穿刺
- D. 二合诊检查
- E. 腹腔镜检查

【答案】C

73. 患者，女，32岁，已婚。孕后腰酸腹痛，胎动下坠，伴阴道少量出血，头晕耳鸣，小便频数，舌淡苔白，脉沉细滑。治疗应首选

- A. 加味圣愈汤
- B. 胎元饮
- C. 举元煎
- D. 补肾安胎饮
- E. 寿胎丸

【答案】E

74. 患者，女，24岁，已婚。产后10d，高热3d，下腹疼痛拒按，恶露量少、色紫暗，有臭味，烦热渴饮，尿黄便结，舌红苔黄厚，脉滑数。其辨证是

- A. 外感风热
- B. 阴虚内热
- C. 血热
- D. 血瘀
- E. 感染邪毒

【答案】E

75. 患者，女，28岁，已婚。产时失血较多，产后小腹隐隐作痛，喜按，恶露量少、色淡，头晕耳鸣，大便干燥，舌淡苔薄，脉虚细。治疗应首选

- A. 肠宁汤
- B. 生化汤
- C. 十全大补汤
- D. 人参养荣汤
- E. 八珍汤

【答案】A

76. 患者，女，27岁，已婚。产后恶露35d不止，色深红、质稠黏、有臭气，口燥咽干，舌红，脉虚细而数。治疗应首选

- A. 清热固经汤
- B. 保阴煎
- C. 清热调血汤
- D. 清经散
- E. 牡丹散

【答案】B

77. 患者，女，30岁。发现下腹包块1个月余，小腹胀痛，痛无定处，舌苔薄润，脉沉弦。其证型是

- A. 血瘀
- B. 寒凝
- C. 气滞
- D. 痰湿
- E. 湿郁

【答案】C

78. 患者，女，30岁，已婚。2个月前曾做人工流产术，术后即时觉下腹疼痛，伴腰痛，活动后明显，月经22~25d一行，带下量稍多。其诊断是

- A. 痛经
- B. 带下病
- C. 月经先期
- D. 妇人腹痛
- E. 妊娠病

【答案】D

79. 患者，女，51岁，已婚。阴部干涩，灼热瘙痒，带下量少色黄，五心烦热，烘热汗出，口干不欲饮，舌红少苔，脉细数无力。其治法是

- A. 清热利湿，杀虫止痒
- B. 清肝利湿，杀虫止痒
- C. 滋肾降火，调补肝肾
- D. 滋肾养阴，除湿止带
- E. 养阴清热，燥湿止痒

【答案】C

80. 胞宫的主要生理功能是

- A. 主月经
- B. 主带下
- C. 主孕育胎儿
- D. 主月经和孕育胎儿
- E. 主经、带、胎、产

【答案】E

81. 女子受孕与哪一组脏器、经脉气血冲盛关系最密切

- A. 心和冲任二脉
- B. 肝和冲任二脉
- C. 脾和冲任二脉
- D. 肺和冲任二脉
- E. 肾和冲任二脉

【答案】E

82. 下列哪一项的病机与肝郁气滞无关

- A. 月经先后无定期
- B. 经行鼻衄
- C. 绝经前后诸证
- D. 产后缺乳
- E. 不孕症

【答案】C

83. 与月经后期和月经过少的发病均有关

- A. 血热
- B. 血虚
- C. 血瘀
- D. 血寒
- E. 湿热

【答案】B

84. 下列不属于崩漏的证型是

- A. 血虚
- B. 血热
- C. 血瘀
- D. 肾虚
- E. 脾虚

【答案】A

85. 闭经虚证的发病机理是

- A. 多产房劳或久病伤肾
- B. 血海空虚，无血可下
- C. 脾胃虚弱，化源不足
- D. 思虑过度，损伤心脾
- E. 素体阴虚或久病伤血

【答案】B

86. 经行头痛以头痛伴随月经周期性发作为辨证要点，其治疗大法为

- A. 滋阴潜阳，疏风止痛
- B. 调理气血，通络止痛
- C. 温经养血，疏络止痛
- D. 活血化瘀，温经止痛
- E. 益气养血，活络止痛

【答案】B

87. 绝经前后诸证的产生机理主要是

- A. 肝血不足，冲任亏虚
- B. 脾气虚弱，冲任失养
- C. 肾气虚衰，天癸渐竭
- D. 心肾不交，冲任失调
- E. 心脾血虚，冲任俱虚

【答案】C

88. 带下病的主要发病机理是
- A. 外感湿邪，损及任、带，约固无力
 - B. 肾气不足，封藏失职，阴液滑脱而下
 - C. 湿邪影响任、带，任脉不固，带脉失约
 - D. 脾虚生湿，流注下焦，伤及任、带
 - E. 肝经湿热，流注下焦，伤及任、带

【答案】C

89. 妊娠恶阻的主要发病机理是

- A. 脾胃虚弱，化源不足
- B. 肝郁气滞，失于条达
- C. 痰湿内停，中焦受阻
- D. 重伤津液，胃阴不足
- E. 冲气上逆，胃失和降

【答案】E

90. 下列各项，不属宫外孕手术适应证的是

- A. 输卵管间质部妊娠
- B. 残角子宫妊娠
- C. 妊娠试验持续阳性，包块继续长大
- D. 输卵管破损时间较长，形成血肿包块
- E. 愿意同时施行绝育术者

【答案】D

91. 产后三病是指

- A. 呕吐、泄泻、盗汗
- B. 尿失禁、缺乳、大便难
- C. 血晕、发热、痉证
- D. 病痉、病郁冒、大便难
- E. 腹痛、恶露不下、发热

【答案】D

92. 下列各项，不属产后发热病因的是

- A. 感染邪毒
- B. 外感
- C. 血瘀
- D. 血虚
- E. 阳盛血热

【答案】E

93. 生化汤治疗血被寒凝，瘀阻胞宫而致的产后恶露淋漓不爽，常加用的药物是

- A. 桃仁、赤芍
- B. 红花、赤芍
- C. 蒲黄、五灵脂
- D. 蒲黄、益母草
- E. 黑荆芥、茜草

【答案】D

94. 下列各项，不属雌激素作用的是

- A. 促进卵泡发育
- B. 使阴道上皮细胞脱落加快
- C. 促使乳腺管增生
- D. 促进第二性征发育
- E. 促进骨中钙的沉积

【答案】B

95. 产后恶露不尽，月余未净，量多，色紫红，质粘稠，盗汗，口干咽燥，舌红，少苔，脉细数，方剂宜选：

- A. 生化汤
- B. 清经散
- C. 保阴煎
- D. 两地汤
- E. 左归丸

【答案】C

96. 妊娠肿胀是指：

- A. 妊娠期间出现肢体肿胀者
- B. 妊娠期间出现下肢浮肿者
- C. 妊娠期间出现体重增加者
- D. 妊娠中晚期，肢体、面目发生肿胀者
- E. 以上都不是

【答案】D

97. 产后的病理特点是：

- A. 多虚多瘀
- B. 虚中夹瘀
- C. 虚寒夹瘀
- D. 肝脾失调
- E. 亡血伤津

【答案】A

98. 经后小腹隐隐作痛，月经量少，色淡，腰膝酸楚，头晕
耳鸣，舌淡，苔薄，脉沉细。治宜：

- A. 补肾养血，调经止痛
- B. 补气养血，调经止痛
- C. 温经养血，调经止痛
- D. 行气活血，调经止痛
- E. 温经扶阳，养血调经

【答案】A

99. 治疗癥瘕的代表方剂是

- A. 香棱丸
- B. 桂枝茯苓丸
- C. 桃红四物汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 通窍活血汤

【答案】B

100. 久婚不孕，月经先后无定期，经前乳胀，胸胁不舒，精神抑郁，或烦躁易怒，舌红，脉弦。应诊断为

- A 肾虚不孕
- B 肝郁不孕
- C 血瘀不孕
- D 痰湿不孕
- E 宫寒不孕

【答案】B