基础精讲班

中 药 专 业 知 识 （ 二 ）

国 家 执 业 药 师 资 格 考 试

主讲老师：林老师

2019

第一章　内科常用中成药

一、辛温解表剂

桂枝合剂

表实感冒颗粒

感冒清热颗粒

正柴胡饮颗粒

2019

第一章　内科常用中成药

1. 桂枝合剂

【药物组成】桂枝、白芍、生姜、大枣、甘草。

【功能】解肌发表，调和营卫。

【主治】感冒风寒表虚证，症见头痛发热、汗出恶风、鼻塞干呕。

【用法用量】口服。一次 10～15ml，一日 3 次。

【注意事项】表实无汗或温病内热口渴者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻之物。服药后多饮热开水或热粥，覆被保暖，取微汗为度。

2019

2. 表实感冒颗粒

【药物组成】麻黄、桂枝、防风、白芷、紫苏叶、葛根、生姜、陈皮、桔梗、 苦杏仁（炒）、甘草。

【功能】发汗解表，祛风散寒。

【主治】感冒风寒表实证，症见恶寒重、发热轻、无汗、头项强痛、鼻流清涕、咳嗽、痰白稀。

【用法用量】口服。一次 10～20g，一日 2～3 次；小儿酌减。

【注意事项】风热感冒及寒郁化热明显者忌用。服药期间，忌食辛辣、油腻。

可食热粥助汗出。含麻黄，高血压、心脏病者慎用。

2019

第一节　解表剂

第一节　解表剂

北京同仁堂
科技发展股份有限公司制药厂
感冒清热颗粒
Ganmao Qingre Keli
OTC
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
【成份】荆芥穗、薄荷、防风、柴胡、紫苏叶、葛根、桔梗、苦杏仁、白芷、苦地丁、芦根。辅料为蔗糖、糊精。
【性状】本品为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。
【功能主治】疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热、恶寒身痛、鼻流清涕，咳嗽喉干。
【规格】每袋装12克
每袋装12克
每盒装10袋

2019

3. 感冒清热颗粒（口服液）

【药物组成】荆芥穗、防风、紫苏叶、白芷、柴胡、薄荷、葛根、芦根、苦地丁、桔梗、苦杏仁。

【功能】疏风散寒，解表清热。

【主治】风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干。

【用法用量】口服。颗粒剂：一次 1 袋，开水冲化，一日 2 次。口服液：一次10ml，一日 2 次。

【注意事项】服药期间，忌食辛辣、油腻食物。与环孢素 A 同用，可能引起环孢素 A 血药浓度升高。

2019

第一节　解表剂

宁宁®
正柴胡饮颗
3克 x 10袋
精华制药集团股
OTC
正柴胡饮颗粒
请仔细阅读说明书并按说明使用
或在药师指导下购买和使用。
每袋装3克
（无蔗糖）
产品批号：
有效期至
41130517
2015.04
精华制药集团股份有限公司

4. 正柴胡饮颗粒

【药物组成】柴胡、防风、生姜、赤芍、陈皮、甘草。

【功能】发散风寒，解热止痛。

【主治】外感风寒所致的感冒，症见发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢痠痛；流感初起、轻度上呼吸道感染见上述证候者。

【用法用量】口服。含蔗糖者一次 10g，不含蔗糖者一次 3g，开水冲化，一日3 次。小儿酌减或遵医嘱。

【注意事项】风热感冒慎用。服药期间，忌辛辣、油腻食物。

2019

第一章　内科常用中成药

一、辛温解表剂

桂枝合剂

表实感冒颗粒

感冒清热颗粒

正柴胡饮颗粒

2019

第一节　解表剂

二、辛凉解表剂

银翘解毒丸

桑菊感冒片

双黄连口服液

羚羊感冒胶囊

连花清瘟胶囊

2019

第一节　解表剂

批准文号：国药准字Z43020147
OTC
九芝堂
银翘解毒丸
3克×10丸
九芝堂股份有限公司

太极
OTC
桑菊感冒片
批准文号：国药准字Z50020244
疏风清热，宣肺止咳。
用于风热感冒初起，头痛，
咳嗽，口干，咽痛。
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司

第一节　解表剂

1. 银翘解毒丸（颗粒、片、胶囊）

【药物组成】金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、牛蒡子（炒）、淡竹叶、桔梗、甘草。

【功能】疏风解表，清热解毒。

【主治】风热感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及风寒感冒者慎用。

2019

第一节　解表剂

2. 桑菊感冒片（颗粒、合剂）

【药物组成】桑叶、菊花、薄荷素油、苦杏仁、桔梗、连翘、芦根、甘草。

【功能】疏风清热，宣肺止咳。

【主治】风热感冒初起，头痛，咳嗽，口干，咽痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】风寒外感者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

第一节　解表剂

金银花

连翘

桑叶

菊花

2019

第一节　解表剂

3. 双黄连口服液（颗粒、片、糖浆、合剂、胶囊）

【药物组成】金银花、黄芩、连翘。

【功能】疏风解表，清热解毒。

【主治】外感风热所致的感冒，症见发热、咳嗽、咽痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】风寒感冒慎用。服药期间，忌服滋补性中药，饮食宜清淡，忌食辛辣食物。

2019

第一节　解表剂

第一节　解表剂

羚羊感冒胶囊
OTC
LINGYANG GANMAO JIAONANG
24粒装
功能主治

以岭
OTC
连花清瘟胶囊
LIANHUA QINGWEN JIAONANG
24粒
石家庄以岭药业股份有限公司
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL INC.

4. 羚羊感冒胶囊（片）

【药物组成】金银花、连翘、羚羊角、牛蒡子、荆芥、淡豆豉、桔梗、淡竹叶、薄荷素油、甘草。

【功能】清热解表。

【主治】流行性感冒属风热证，症见发热恶风、头痛头晕、咳嗽、胸闷、咽喉肿痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】风寒外感者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

5. 连花清瘟胶囊

【药物组成】连翘、金银花、炙麻黄、炒苦杏仁、石膏、板蓝根、绵马贯众、鱼腥草、薄荷脑、广藿香、大黄、红景天、甘草。

【功能】清瘟解毒，宣肺泄热。

【主治】流行性感冒属热毒滞肺证，症见发热、恶寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、头痛、咽干咽痛、舌偏红、苔黄或黄腻。

【用法用量】口服。一次 4 粒，一日三次。

【注意事项】风寒感冒者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

第一节　解表剂

二、辛凉解表剂

银翘解毒丸

桑菊感冒片

双黄连口服液

羚羊感冒胶囊

连花清瘟胶囊

2019

第一节　解表剂

三、解表胜湿剂

九味羌活丸

荆防颗粒

午时茶颗粒

2019

第一节　解表剂

第一节　解表剂

1. 九味羌活丸（颗粒、口服液）

【药物组成】羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、黄芩、甘草、地黄。

【功能】疏风解表，散寒除湿。

【主治】外感风寒夹湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】风热感冒或湿热证慎用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第一节　解表剂

2. 荆防颗粒（合剂）

【药物组成】荆芥、防风、羌活、独活、川芎、柴胡、前胡、桔梗、茯苓、枳壳、甘草。

【功能】解表散寒，祛风胜湿。

【主治】外感风寒挟湿所致的感冒，症见头身疼痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽。

【用法用量】口服。

【注意事项】风热感冒或湿热证慎用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第一节　解表剂

羌活

荆芥

防风

2019

3. 午时茶颗粒

【药物组成】广藿香、紫苏叶、苍术、陈皮、厚朴、白芷、川芎、羌活、防风、山楂、炒麦芽、六神曲（炒）、枳实、柴胡、连翘、桔梗、前胡、红茶、甘草。

【功能】祛风解表，化湿和中。

【主治】外感风寒、内伤食积证，症见恶寒发热、头痛身楚、胸脘满闷、恶心呕吐、腹痛腹泻。

【用法用量】口服。开水冲化，一次 6g，一日 1～2 次。

【注意事项】孕妇及风热感冒者慎用。服药期间，忌烟酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第一节　解表剂

第一节　解表剂

四、祛暑解表剂

藿香正气水

保济丸

2019

第一节　解表剂

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
OTC
国药准字Z41020868
藿香正气水
HUOXIANG ZHENGQI SHUI
功能主治
解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。
10毫升×6支
河南天地药业股份有限公司
10毫升×6支

第一节　解表剂

1. 藿香正气水（片、颗粒、滴丸、口服液、软胶囊）

【药物组成】广藿香油、苍术、陈皮、厚朴（姜制）、白芷、茯苓、大腹皮、生半夏、甘草浸膏、紫苏叶油。藿香正气水又含乙醇。

【功能】解表化湿，理气和中。

【主治】外感风寒，内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。

【用法用量】口服。

2019

第一节　解表剂

【注意事项】孕妇及风热感冒者慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌服滋补性中药。服藿香正气水后不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。对藿香正气水及乙醇过敏者禁用，过敏体质者慎用。

2019

2. 保济丸

【药物组成】广藿香、苍术、白芷、化橘红、厚朴、菊花、蒺藜、钩藤、薄荷、茯苓、薏苡仁、广东神曲、稻芽、木香、葛根、天花粉。

【功能】解表，祛湿，和中。

【主治】暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船。

【用法用量】口服。一次 1.85～3.7g，一日 3 次。

【注意事项】孕妇禁用。外感燥热者不宜服用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

第一节　解表剂

第一节　解表剂

五、扶正解表剂

参苏丸（胶囊）



第一节　解表剂

参苏丸（胶囊）

【药物组成】紫苏叶、葛根、前胡、半夏（制）、桔梗、陈皮、枳壳（炒）、党参、茯苓、木香、甘草、生姜（在制法项）、大枣（在制法项）。

【功能】益气解表，疏风散寒，祛痰止咳。

【主治】身体虚弱，感受风寒所致的感冒，症见恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短。

【用法用量】口服。

【注意事项】风热感冒者及孕妇慎用。服药期间忌烟酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第一节　解表剂

虚体感冒

第一节　解表剂

A. 疏风解表

B. 解表清热

C. 宣肺止咳

D. 益气解表

E. 解肌清热

1. 银翘解毒丸既能清热解毒，又能

2. 感冒清热颗粒疏风解表，又能

3. 参苏丸既能疏风散寒、祛痰止咳，又能

2019

4. 具益气解表，疏风散寒，祛痰止咳功效的常用中成药是

A. 感冒清热颗粒

B. 参苏丸

C. 双黄连口服液

D. 正柴胡饮颗粒

E. 荆防颗粒

2019

第一节　解表剂

5. 风寒感冒患者宜选用的中成药是

A. 连花清瘟胶囊

B. 双黄连颗粒

C. 银翘解毒颗粒

D. 桑菊感冒颗粒

E. 感冒清热颗粒

2019

6. 藿香正气水的功能是

A. 清热解暑，祛湿生津

B. 解表化湿，理气和中

C. 解表散寒，宣肺止嗽

D. 祛暑除湿，和胃消食

E. 清肺止咳，化痰通便

2019

6. 藿香正气水的功能是

A. 清热解暑，祛湿生津

B. 解表化湿，理气和中

C. 解表散寒，宣肺止嗽

D. 祛暑除湿，和胃消食

E. 清肺止咳，化痰通便

2019

7. 可用于晕车晕船，具有解表祛湿和中功能的是

A. 参苏丸

B. 九味羌活丸

C. 午时茶颗粒

D. 藿香正气水

E. 保济丸

2019

第一节　解表剂

A. 感冒风寒表实证

B. 风热感冒

C. 外感内热，表里俱实

D. 外感风寒挟湿

E. 感冒风寒表虚证

8. 荆防颗粒适用于

9. 银翘解毒丸适用于

10. 桂枝合剂适用于

2019

第一节　解表剂

A. 感冒风寒表实证

B. 风热感冒

C. 外感内热，表里俱实

D. 外感风寒挟湿

E. 感冒风寒表虚证

8. 荆防颗粒适用于

9. 银翘解毒丸适用于

10. 桂枝合剂适用于

2019

（X型题）11.风热感冒时可以选用

A.羚羊感冒片

B.桑菊感冒片

C.午时茶颗粒

D.荆防颗粒

E.葛根芩连丸

2019

第一节　解表剂

（X型题）12. 用来治疗风寒感冒的中成药有

A. 双黄连口服液

B. 感冒清热颗粒

C. 羚羊感冒片

D. 正柴胡饮颗粒

E. 荆防颗粒

2019

第二节　祛暑剂

一、祛暑除湿剂

六一散、甘露消毒丸

二、祛暑辟秽剂

紫金锭

三、祛暑和中剂

六合定中丸、十滴水软胶囊

四、清暑益气剂

清暑益气丸

2019

第二节　祛暑剂

一、祛暑除湿剂

第二节　祛暑剂

1. 六一散

【药物组成】滑石粉、甘草。

【功能】清暑利湿。

【主治】感受暑湿所致的暑湿证，症见发热身倦、口渴、泄泻、小便黄少；外用治痱子。

【用法用量】调服或包煎服。一次 6～9g，一日 1～2 次。外用，扑撒患处。

【注意事项】孕妇及小便清长者慎用。服药期间忌食辛辣食物。

2019

2. 甘露消毒丸

【药物组成】滑石、茵陈、黄芩、石菖蒲、豆蔻、藿香、薄荷、射干、川贝母、木通、连翘。

【功能】芳香化湿，清热解毒。

【主治】暑湿蕴结所致的湿温，症见身热肢痠、胸闷腹胀、尿赤黄疸。

【用法用量】口服。一次 6～9g，一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。寒湿内阻者慎用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第二节　祛暑剂

第二节　祛暑剂

二、祛暑辟秽剂

第二节　祛暑剂

紫金锭（散）

【药物组成】人工麝香、山慈菇、雄黄、红大戟、千金子霜、五倍子、朱砂。

【功能】辟瘟解毒，消肿止痛。

【主治】中暑，脘腹胀痛，恶心呕吐，痢疾泄泻，小儿痰厥；外治疔疮疖肿，痄腮，丹毒，喉风。

【用法用量】锭剂：口服，一次 0.6～1.5g，一日 2 次；外用，醋磨调敷患处。散剂：口服，一次 1.5g，一日 2 次；外用，醋调敷患处。

【注意事项】因其含雄黄、朱砂等峻烈有毒之品，故不宜过量、久用，孕妇忌用，气血虚弱及肝肾功能不全者慎用。

2019

第二节　祛暑剂

三、祛暑和中剂

第二节　祛暑剂

1. 六合定中丸

【药物组成】广藿香、香薷、陈皮、姜厚朴、枳壳（炒）、木香、檀香、炒山楂、

六神曲（炒）、炒麦芽、炒稻芽、茯苓、木瓜、炒白扁豆、紫苏叶、桔梗、甘草。

【功能】祛暑除湿，和中消食。

【主治】夏伤暑湿，宿食停滞，寒热头痛，胸闷恶心，吐泻腹痛。

【用法用量】口服。一次 3～6g，一日 2～3 次。

【注意事项】湿热泄泻、实热积滞胃痛者慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣油腻食物。肠炎脱水严重者应配合适当补液。

2019

第二节　祛暑剂

2. 十滴水（软胶囊）

【药物组成】樟脑、干姜、桉油、小茴香、肉桂、辣椒、大黄。

【功能】健胃，祛暑。

【主治】中暑，症见头晕、恶心、腹痛、胃肠不适。

【用法用量】口服。十滴水：一次 2～5ml；儿童酌减。

软胶囊剂：一次 1～2粒；儿童酌减。

【注意事项】孕妇禁用。驾驶员及高空作业者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

第二节　祛暑剂

四、清暑益气剂

清暑益气丸

第二节　祛暑剂

清暑益气丸

【药物组成】黄芪（蜜炙）、人参、炒白术、葛根、苍术（米泔炙）、升麻、麦冬、醋五味子、泽泻、黄柏、陈皮、醋青皮、六神曲（麸炒）、当归、甘草。

【功能】祛暑利湿，补气生津。

【主治】中暑受热，气津两伤，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。

【用法用量】姜汤或温开水送服。一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】孕妇慎用。服药期间，忌食辛辣油腻食物。

2019

第二节　祛暑剂

一、祛暑除湿剂

六一散、甘露消毒丸

二、祛暑辟秽剂

紫金锭

三、祛暑和中剂

六合定中丸、十滴水软胶囊

四、清暑益气剂

清暑益气丸

2019

第二节　祛暑剂

A. 祛暑利湿，补气生津

B. 祛暑除湿，和胃消食

C. 祛暑解表，清热生津

D. 解表化湿，理气和中

E. 清热解毒，利湿化浊

1. 六合定中丸的功能是

2. 藿香正气水的功能是

2019

第二节　祛暑剂

3. 具有清暑利湿的功效，常用于治疗感受暑湿所致的暑湿证的中成药是

A. 甘露消毒丸

B. 六一散

C. 紫金锭（散）

D. 六合定中丸

E. 桑菊感冒颗粒

2019

第二节　祛暑剂

4. 下列中成药中孕妇禁用，尤其驾驶员及高空作业者慎用的是

A. 甘露消毒丸

B. 六一散

C. 清暑益气丸

D. 十滴水（软胶囊）

E. 桑菊感冒颗粒

2019

第二节　祛暑剂

5. 主治中暑发热，气津两伤，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴的中成药是

A. 六合定中丸

B. 六一散

C. 清暑益气丸

D. 紫金锭（散）

E. 桑菊感冒颗粒

2019

第二节　祛暑剂

A. 六一散

B. 紫金锭（散）

C. 六合定中丸

D. 清暑益气丸

E. 甘露消毒丸

6. 具有清暑利湿的功能的是

7. 具有祛暑利湿，补气生津的功能的是

8. 具有辟瘟解毒，消肿止痛的功能的是

9. 具有祛暑除湿，和中消食的功能的是

2019

第二节　祛暑剂

A. 十滴水

B. 六一散

C. 六合定中丸

D. 清暑益气丸

E. 紫金锭（散）

10. 主治夏伤暑湿，宿食停滞证的是

11. 主治中暑受热，气津两伤证的是

12. 主治感受暑湿所致的暑湿证的是

2019

第三节　表里双解剂

一、解表清里剂

葛根芩连丸（微丸）

双清口服液

二、解表攻里剂

防风通圣丸

2019

第三节　表里双解剂

一、解表清里剂

第三节　表里双解剂

一、解表清里剂

1. 葛根芩连丸（微丸）

【药物组成】葛根、黄芩、黄连、炙甘草。

【功能】解肌透表，清热解毒，利湿止泻。

【主治】湿热蕴结所致的泄泻腹痛、便黄而黏、肛门灼热；以及风热感冒所致的发热恶风、头痛身痛。

【用法用量】口服。一次 3g；小儿一次 1g，一日 3 次；或遵医嘱。

【注意事项】脾胃虚寒腹泻、慢性虚寒性痢疾慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。不可过量，久用。严重脱水者，应采取相应的治疗措施。

2019

2. 双清口服液

【药物组成】金银花、连翘、郁金、大青叶、石膏、广藿香、知母、地黄、桔梗、甘草、蜂蜜。

【功能】疏透表邪，清热解毒。

【主治】风温肺热，卫气同病，症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头痛、口渴、舌红苔黄或黄白苔相兼，脉浮滑或浮数；急性支气管炎见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 20ml，一日 3 次。

【注意事项】孕妇及风寒感冒、脾胃虚寒者慎用。服药期间，忌烟酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第三节　表里双解剂

二、解表攻里剂

第三节　表里双解剂

防风通圣丸

【药物组成】麻黄、荆芥穗、防风、薄荷、大黄、芒硝、滑石、栀子、石膏、黄芩、连翘、桔梗、当归、白芍、川芎、白术（炒）、甘草。

【功能】解表通里，清热解毒。

【主治】外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，瘰疬初起，风疹湿疮。

【用法用量】口服。水丸一次 6g，一日 2 次；浓缩丸一次 8 丸，一日 2 次。

【注意事项】孕妇及虚寒证者慎用。服药期间，忌烟酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第三节　表里双解剂

1. 用于治疗风温肺热，卫气同病，症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头痛、口渴的中成药是

A. 感冒清热颗粒

B. 双清口服液

C. 葛根芩连丸

D. 正柴胡饮颗粒

E. 防风通圣丸

2019

第三节　表里双解剂

A. 双清口服液

B. 葛根芩连丸

C. 正柴胡饮颗粒

D. 桂枝合剂

E. 防风通圣丸

2. 湿热蕴结所致的泄泻腹痛、便黄而黏、肛门灼热的病人可选用

3. 具有风温肺热，卫气同病证，症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头痛、口渴的病人可选用

2019

第四节　泻下剂

一、寒下剂

二、润下剂

三、峻下剂

四、通腑降浊剂

2019

第四节　泻下剂

一、寒下剂

通便宁片

当归龙荟丸

九制大黄丸

2019

第四节　泻下剂

第四节　泻下剂

1. 通便宁片

【药物组成】番泻叶干膏粉、牵牛子、砂仁、白豆蔻。

【功能】宽中理气，泻下通便。

【主治】肠胃实热积滞所致的便秘，症见大便秘结、腹痛拒按、腹胀纳呆、口干苦、小便短赤、舌红苔黄、脉弦滑数。

【用法用量】口服。一次 4 片，一日 1 次；如服药 8 小时后不排便再服一次，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇、哺乳期、月经期妇女禁用。冷秘者慎用。体虚者不宜长期服用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

第四节　泻下剂

2. 当归龙荟丸

【药物组成】龙胆（酒炙）、酒大黄、芦荟、酒黄连、酒黄芩、盐黄柏、栀子、青黛、酒当归、木香、人工麝香。

【功能】泻火通便。

【主治】肝胆火旺所致的心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、胁肋疼痛、脘腹胀痛、大便秘结。

【用法用量】口服。一次 6g，一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。冷积、冷秘、素体脾虚及年迈体弱者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

第四节　泻下剂

国药准字Z62020863
OTC
九制大黄丸
Jiuzhi Dahuang Wan
功能主治：
泻下导滞。用于胃肠积滞所致的便秘、
湿热下痢、口渴不休、停食停水、胸
热心烦、小便赤黄。
甘肃岷海制药有限责任公司

第四节　泻下剂

3. 九制大黄丸

【药物组成】大黄。

【功能】泻下导滞。

【主治】胃肠积滞所致的便秘、湿热下痢、口渴不休、停食停水、胸热心烦、小便赤黄。

【用法用量】口服。一次 6g，一日 1 次。

【注意事项】孕妇禁服。冷积、冷秘久病、体弱者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物。

2019

第四节　泻下剂

一、寒下剂

通便宁片

当归龙荟丸

九制大黄丸

2019

第四节　泻下剂

二、润下剂

麻仁胶囊

增液口服液

通便灵胶囊

苁蓉通便口服液

2019

第四节　泻下剂

第四节　泻下剂

1. 麻仁胶囊（软胶囊、丸）

【药物组成】火麻仁、大黄、苦杏仁、炒白芍、枳实（炒）、姜厚朴。

【功能】润肠通便。

【主治】肠热津亏所致的便秘，症见大便干结难下、腹部胀满不舒；习惯性便秘见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及虚寒性便秘慎用。忌食辛辣香燥刺激性食物。

2019

第四节　泻下剂

《增液汤》

清 吴鞠通

玄参 麦冬 生地

水煎服

滋阴 增液润燥

2. 增液口服液

【药物组成】玄参、生地黄、山麦冬。

【功能】养阴生津，增液润燥。

【主治】高热后，阴津亏损所致的便秘，症见大便秘结，兼见口渴咽干、口唇干燥、小便短赤、舌红少津。

【用法用量】口服。一次 20ml，一日 3 次，或遵医嘱。

【注意事项】服药期间，忌食辛辣刺激性食物。

2019

第四节　泻下剂

吉药
批准文号：国药准字Z20055234
OTC
通便灵胶囊
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
【功能主治】
泻热导滞，润肠通便。
用于热结便秘，长期卧床便秘，
一时性腹胀便秘，老年习惯性便秘。
24粒
四平市吉特药业有限公司
SIPING CITY JITE PHARMACEUTICAL CO.,LTD

3. 通便灵胶囊

【药物组成】番泻叶、当归、肉苁蓉。

【功能】泻热导滞，润肠通便。

【主治】热结便秘，长期卧床便秘，一时性腹胀便秘，老年习惯性便秘。

【用法用量】口服。一次 5～6 粒，一日 1 次。

【注意事项】孕妇及哺乳期、月经期妇女禁用。脾胃虚寒者慎用。忌食辛辣、油腻食物。

2019

第四节　泻下剂

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
OTC
苁蓉通便口服液
Congrongtongbiankoufuye
批准文号：国药准字Z10910032
10毫升X6支
甘肃天水岐黄药业有限责任公司

4. 苁蓉通便口服液

【药物组成】何首乌、肉苁蓉、枳实（麸炒）、蜂蜜。

【功能】滋阴补肾，润肠通便。

【主治】中老年人、病后产后等虚性便秘及习惯性便秘。

【用法用量】口服。一次 10～20ml，一日 1 次。睡前或清晨服用。

【注意事项】孕妇及实热积滞致大便燥结者慎用。

2019

第四节　泻下剂

二、润下剂

麻仁胶囊

增液口服液

通便灵胶囊

苁蓉通便口服液

2019

第四节　泻下剂

三、峻下剂

舟车丸

第四节　泻下剂

舟车丸

【药物组成】甘遂（醋制）、红大戟（醋制）、芫花（醋制）、牵牛子（炒）、大黄、青皮（醋制）、陈皮、木香、轻粉。

【功能】行气逐水。

【主治】水停气滞所致的水肿，症见蓄水腹胀、四肢浮肿、胸腹胀满、停饮喘急、大便秘结、小便短少。

【用法用量】口服。一次 3g，一日 1 次。

【注意事项】孕妇及水肿属阴水者禁用。所含甘遂、大戟、芫花及轻粉均有毒，故不可过量、久服。服药期间饮食宜清淡、低盐。服药应从小剂量开始，逐渐加量。

2019

第四节　泻下剂

甘遂

大戟

芫花

牵牛子

2019

第四节　泻下剂

四、通腑降浊剂

第四节　泻下剂

尿毒清颗粒

【药物组成】大黄、黄芪、丹参、川芎、何首乌（制）、党参、白术、茯苓、桑白皮、苦参、车前草、半夏（姜制）、柴胡、菊花、白芍、甘草。

【功能】通腑降浊，健脾利湿，活血化瘀。

【主治】脾肾亏损，湿浊内停，瘀血阻滞所致的少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄；以及慢性肾衰竭（氮质血症期或尿毒症早期）见上述证候者。

2019

第四节　泻下剂

【用法用量】温开水冲服。

【注意事项】肝肾阴虚证慎用。因服药每日大便超过 2 次，可酌情减量，避免营养吸收不良和脱水。对 24 小时尿量 <1500ml 患者，服药时应监测血钾。慢性肾衰竭尿毒症晚期非本品所宜。避免与肠道吸附剂同时服用。忌食肥肉、动物内脏、豆类及坚果果实等高蛋白食物。应低盐饮食，并严格控制入水量。

2019

第四节　泻下剂

1. 由于水停气滞所致水肿，症见蓄水腹胀，四肢浮肿，胸腹胀满，停饮喘急，大便秘结，小便短少时应选用

A. 通便宁片

B. 九制大黄丸

C. 麻仁胶囊

D. 舟车丸

E. 尿毒清颗粒

2019

第四节　泻下剂

2. 可治疗中老年人、病后、产后虚性便秘的通便类药物是

A. 当归龙荟丸

B. 通便灵胶囊

C. 苁蓉通便口服液

D. 九制大黄丸

E. 麻仁胶囊

2019

第四节　泻下剂

A. 通便宁片

B. 通便灵胶囊

C. 麻仁胶囊

D. 九制大黄丸

E. 苁蓉通便口服液

3. 除润肠通便作用外，还具有泻热导滞作用的是

4. 肠热津亏所致的便秘应选用

5. 中老年人、病后产后等虚性便秘及习惯性便秘

6. 热结便秘和长期卧床引起的便秘可推荐服用

2019

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

第五节　清热剂

一、清热泻火解毒剂

二、解毒消瘿剂

2019

第五节　清热剂

一、清热泻火解毒剂

龙胆泻肝丸

清胃黄连丸

导赤丸

黄连上清丸

牛黄上清丸

牛黄解毒丸

牛黄至宝丸

黛蛤散

2019

第五节　清热剂

一、清热泻火解毒剂

一清胶囊

新雪颗粒

芩连片

板蓝根颗粒

清热解毒口服液

2019

第五节　清热剂



第五节　清热剂

1. 龙胆泻肝（颗粒、口服液）

【药物组成】龙胆草、黄芩、栀子（炒）、盐车前子、泽泻、木通、酒当归、地黄、柴胡、炙甘草。

【功能】清肝胆，利湿热。

【主治】肝胆湿热所致的头晕目赤、耳鸣耳聋、耳肿疼痛、胁痛口苦、尿赤涩痛、湿热带下。

2019

第五节　清热剂

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、脾胃虚寒及体弱年老者慎用。服药期间，忌食辛辣油腻食物。对于体质壮实者，应中病即止，不可久用。高血压剧烈头痛，服药后头痛不见减轻，伴有呕吐、神志不清，或口眼□斜、瞳仁不等高血压危象者，应立即停药并采取相应急救措施。以其治疗急性结膜炎时，可配合使用外滴眼药；治疗化脓性中耳炎时，服药期间宜配合清洗耳道；治疗阴道炎时，亦可使用清洗剂冲洗阴道。

2019

第五节　清热剂



2. 清胃黄连丸（片）

【药物组成】黄连、石膏、黄芩、栀子、连翘、知母、黄柏、玄参、地黄、牡丹皮、赤芍、天花粉、桔梗、甘草。

【功能】清胃泻火，解毒消肿。

【主治】肺胃火盛所致的口舌生疮，齿龈、咽喉肿痛。

【用法用量】口服。丸剂：大蜜丸一次 1～2 丸，一日 2 次；水丸一次 9g，一日 2 次。片剂：一次 8 片，一日 2 次。

【注意事项】孕妇、体弱、年迈及阴虚火旺者慎用。不可过量或久用。

2019

第五节　清热剂

3. 导赤丸

【药物组成】黄连、栀子（姜炒）、黄芩、连翘、木通、大黄、玄参、赤芍、滑石、天花粉

【功能】清热泻火，利尿通便。

【主治】火热内盛所致的口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。

【用法用量】口服。一次 1 丸，一日 2 次；周岁以内小儿酌减。

【注意事项】孕妇禁用。脾虚便溏及体弱年迈者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。治疗口腔炎、口腔溃疡时，可配合使用外用药。

2019

第五节　清热剂

龙胆泻肝丸

清胃黄连丸

导赤丸

2019

第五节　清热剂

黄连上清丸

牛黄上清丸

芎菊上清丸

明目上清丸

4. 黄连上清片（丸）

【药物组成】黄连、黄芩、黄柏（酒炒）、石膏、栀子（姜制）、酒大黄、连翘、菊花、荆芥穗、白芷、炒蔓荆子、川芎、防风、薄荷、旋覆花、桔梗、甘草。

【功能】散风清热，泻火止痛。

【主治】风热上攻、肺胃热盛所致的头晕目眩、暴发火眼、牙齿疼痛、口舌生疮、咽喉肿痛、耳痛耳鸣、大便秘结、小便短赤。

【用法用量】口服。片剂一次 6 片，一日 2 次。丸剂：水丸或水蜜丸一次3～6g，大蜜丸一次 1～2 丸，一日 2 次。

【注意事项】脾胃虚寒者禁用。孕妇、老人、儿童、阴虚火旺者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

5. 牛黄上清胶囊（片、丸）

【药物组成】人工牛黄、黄芩、黄连、黄柏、大黄、栀子、石膏、菊花、连翘、荆芥穗、白芷、薄荷、赤芍、地黄、当归、川芎、冰片、桔梗、甘草。

【功能】清热泻火，散风止痛。

【主治】热毒内盛、风火上攻所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、咽喉肿痛、口舌肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛、大便燥结。

【用法用量】口服。胶囊剂：一次 3 粒，一日 2 次。片剂：一次 4 片，一日 2次。丸剂：水丸一次 3g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】阴虚火旺所致的头痛、眩晕、牙痛、咽痛忌用。孕妇、老人、儿童及素体脾胃虚弱者慎服。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。治疗喉痹、口疮、口糜、牙宣、牙痛时，可配合使用外用药物，以增强疗效。

第五节　清热剂

第五节　清热剂

樂仁堂
OTC
明目上清丸
MINGMU SHANGQING WAN
批准文号：国药准字Z12020353
规格：1X6

第五节　清热剂

黄连上清丸

牛黄上清丸

芎菊上清丸

明目上清丸

2019

第五节　清热剂

黄芩

黄连

黄柏

大黄

栀子

2019

第五节　清热剂

牛黄上清丸

牛黄解毒丸

牛黄至宝丸

6. 牛黄解毒胶囊（片、丸、软胶囊）

【药物组成】人工牛黄、石膏、黄芩、大黄、雄黄、冰片、桔梗、甘草。

【功能】清热解毒。

【主治】火热内盛所致的咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮、目赤肿痛。

【注意事项】孕妇禁用。虚火上炎所致的口疮、牙痛、喉痹慎服。脾胃虚弱者慎用。因其含有雄黄，故不宜过量、久服。

【用法用量】口服。

2019

7. 牛黄至宝丸

【药物组成】人工牛黄、大黄、芒硝、冰片、石膏、栀子、连翘、青蒿、木香、广藿香、陈皮、雄黄。

【功能】清热解毒，泻火通便。

【主治】胃肠积热所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便燥结。

【用法用量】口服。一次 1～2 丸，一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。冷秘者慎用。不宜久服。服药期间，忌食辛辣香燥刺激性食物。

2019

第五节　清热剂

安宫牛黄丸
Angong Niuhuang Wan
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
【规格】每丸重 3g
北京同仁堂
科技发展股份有限公司制药厂

第五节　清热剂

第五节　清热剂

第五节　清热剂

牛黄上清丸
牛黄解毒丸
牛黄至宝丸
安宫牛黄丸
牛黄清心丸
牛黄抱龙丸

2019

第五节　清热剂

黛蛤散

左金丸

郁怒伤肝 肝经邪热 气郁化火 上犯于肺	肝火犯肺	肝气失柔	胸胁灼痛，急躁易怒
		肺失清肃	咳嗽阵作，痰黄，痰血
		肝火内炽	面红目赤，头晕口苦 舌红苔黄，脉弦而数

2019

8. 黛蛤散

【药物组成】青黛、蛤壳。

【功能】清肝利肺，降逆除烦。

【主治】肝火犯肺所致的头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦。

【用法用量】口服。一次 6g，一日 1 次，随处方入煎剂。

【注意事项】孕妇及阳气虚弱者慎用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第五节　清热剂


请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
OTC
泻火，疏肝，和胃，止痛。用于肝火犯胃，脘胁疼痛，口苦嗜酸，呕吐酸水，不喜热饮。
左金丸
18克/瓶
ZUOJIN WAN
湖北诺得胜制药有限公司

第五节　清热剂

龙胆泻肝丸
清胃黄连丸
导赤丸

黄连上清丸
牛黄上清丸

牛黄解毒丸
牛黄至宝丸

黛蛤散

2019

第五节　清热剂

一清胶囊

新雪颗粒

芩连片

板蓝根颗粒

清热解毒口服液

2019

第五节　清热剂

舍济
一清软胶囊
Yi Qing Ruan Jiao Nang
【功能主治】
清热燥湿，泻火解毒，化瘀止血。
24粒/盒
海神集团
海南海神同洲制药有限公司

9. 一清颗粒（胶囊）

【药物组成】大黄、黄芩、黄连。

【功能】清热泻火解毒，化瘀凉血止血。

【主治】火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、咽喉及牙龈肿痛、大便秘结、吐血、咯血、衄血、痔血；咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述证候者。

【用法用量】口服。颗粒剂：开水冲服。一次 7.5g，一日 3～4 次。胶囊剂：一次 2 粒，一日 3 次。

【注意事项】阴虚火旺、体弱年迈者慎用。中病即止，不可过量、久用。出现腹泻时可酌情减量。出血量多者，应采取综合急救措施。服药期间，忌食辛辣油腻之品，并戒烟酒。

2019

第五节　清热剂

第五节　清热剂

奇星®
新雪颗粒
XINXUE KELI（薄膜衣颗粒）
1.53克x6袋/盒
清热解毒。用于外感热病、热毒壅盛证，症见高热、烦躁；
扁桃体炎、上呼吸道感染、气管炎、感冒见上述症候者。
广州白云山奇星药业有限公司
GUANGZHOU BAIYUNSHAN QIXING PHARMACEUTICAL CO., LTD.
广药集团

9. 新雪颗粒

【药物组成】南寒水石、滑石、石膏、人工牛黄、栀子、竹心、广升麻、穿心莲、珍珠层粉、磁石、沉香、芒硝、硝石、冰片。

【功能】清热解毒。

【主治】外感热病，热毒壅盛证，症见高热、烦躁；扁桃体炎、上呼吸道感染、气管炎、感冒见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 1 袋（瓶），一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。外感风寒证慎用。

2019

第五节　清热剂

国药准字Z23021298
芩连片
QIN LIAN PIAN
【功能主治】
清热解毒，消肿止痛。
用于脏腑蕴热，头痛目赤，口鼻生疮，热痢腹痛，湿热带下，疮疖肿痛。
0.55g
12片×2板
哈尔滨三木制药厂
HAERBINSANMUZHIYAOCHANG
12片×3板

10. 芩连片

【药物组成】黄芩、黄连、黄柏、连翘、赤芍、甘草。

【功能】清热解毒，消肿止痛。

【主治】脏腑蕴热，头痛目赤，口鼻生疮，热痢腹痛，湿热带下，疮疖肿痛。

【用法用量】口服。一次 4 片，一日 2～3 次。

【注意事项】孕妇、中焦虚寒、阴虚者及素体虚弱者慎用。

2019

第五节　清热剂

11. 板蓝根颗粒（茶、糖浆）

【药物组成】板蓝根。

【功能】清热解毒，凉血利咽。

【主治】肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥、腮部肿胀；急性扁桃体炎、腮腺炎见上述证候者。

【注意事项】阴虚火旺者、老人及素体脾胃虚弱者慎用。服药期间，忌食辛辣，油腻食物。

2019

第五节　清热剂

批准文号：国药准字Z34020076
OTC
清热解毒口服液
【功能主治】
清热解毒。
用于热毒壅盛所致的发热
烦躁口渴、
咽喉肿痛；
流感、上呼吸道感染见上
安徽九方
ANHUI JOYFAR

12. 清热解毒口服液

【药物组成】金银花、连翘、知母、石膏、黄芩、栀子、甜地丁、龙胆、板蓝根、麦冬、地黄、玄参。

【功能】清热解毒。

【主治】热毒壅盛所致的发热面赤、烦躁口渴、咽喉肿痛；流感、上呼吸道感染见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 10～20ml，一日 3 次，小儿酌减；或遵医嘱。

【注意事项】风寒感冒者慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌辛辣食物；忌烟酒。

2019

第五节　清热剂

一清胶囊

新雪颗粒

芩连片

板蓝根颗粒

清热解毒口服液

2019

第五节　清热剂

二、解毒消癥剂

抗癌平丸

西黄丸

2019

第五节　清热剂

第五节　清热剂

1. 抗癌平丸

【药物组成】半枝莲、珍珠菜、香茶菜、藤梨根、肿节风、蛇莓、白花蛇舌草、石上柏、兰香草、蟾酥。

【功能】清热解毒，散瘀止痛。

【主治】热毒瘀血壅滞所致的胃癌、食道癌、贲门癌、直肠癌等消化道肿瘤。

【用法用量】口服。一次 0.5～1g，一日 3 次。饭后半小时服，或遵医嘱。

【注意事项】孕妇禁用。脾胃虚寒者慎用。服药期间忌食辛辣、油腻、生冷食物。因其含有毒的蟾酥等，故不可过量、久服。

2019

第五节　清热剂

半枝莲

白花蛇舌草

蟾酥

2019

第五节　清热剂

西黄丸
振东　安特
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
西黄丸
Xihuang Wan
国药准字Z14020894
清热解毒
消肿散结
10袋
山西振东安特生物制药有限公司
Shanxi Zhendong Ante Biological Pharmaceutical Co.,Ltd.
【功能主治】清热解毒，消肿散结。
用于热毒壅结所致的痈疽疔毒，
瘰疬，流注，癌肿。

2. 西黄丸

【药物组成】牛黄、乳香（醋制）、没药（醋制）、麝香。

【功能】清热解毒，消肿散结。

【主治】热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰疬、流注、癌肿。

【用法用量】口服。一次 3g，一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。脾胃虚寒者慎用。服药期间，忌食辛辣刺激食物。

2019

第五节　清热剂

抗癌平丸

西黄丸

乳香

没药

2019

题目

1、能清肝利肺，降逆除烦的药是

A. 黛蛤散

B. 一清颗粒

C. 玄麦甘桔颗粒

D. 桂林西瓜霜

E. 板蓝根颗粒

2019

题目

2、具有清肝胆，利湿热功能的中成药是

A. 龙胆泻肝丸

B. 黄连上清片（丸）

C. 一清颗粒（胶囊）

D. 黛蛤散

E. 牛黄上清胶囊

2019

题目

A. 清肝胆，利湿热

B. 散风清热，泻火止痛

C. 化瘀凉血止血

D. 清热解毒，凉血利咽

E. 散风止痛

3、龙胆泻肝丸的功能是

4、黄连上清片的功能是

5、板蓝根颗粒的功能是

2019

题目

（X型题）6、以下哪些中成药属于清热剂中的解毒消癥剂

A 板蓝根颗粒

B 抗癌平丸

C 西黄丸

D 新雪颗粒

E 一清颗粒

2019

题目

（X型题）7、常用内科中成药中清热剂的分类有

A 清热泻火解毒剂

B 清暑益气剂

C 祛暑除湿剂

D 辛凉解表剂

E 解毒消瘿剂

2019

第六节　温里剂

一、温中散寒剂

理中丸（党参理中丸）

小建中合剂

附子理中丸

良附丸

香砂养胃丸

香砂平胃丸

二、回阳救逆剂

四逆汤

2019

第六节　温里剂

第六节　温里剂

1. 理中丸（党参理中丸）

【药物组成】炮姜、党参、土白术、炙甘草。

【功能】温中散寒，健胃。

【主治】脾胃虚寒，呕吐泄泻，胸满腹痛，消化不良。

【用法用量】口服。大蜜丸：一次 1 丸，一日 2 次，小儿酌减。浓缩丸：一次8 丸，一日 3 次。

【注意事项】湿热中阻所致胃痛、呕吐、泄泻者忌用。忌食生冷油腻，不宜消化食物。

2019

第六节　温里剂

2. 小建中合剂

【药物组成】饴糖、桂枝、白芍、生姜、大枣、炙甘草。

【功能】温中补虚，缓急止痛。

【主治】脾胃虚寒所致的脘腹疼痛、喜温喜按、嘈杂吞酸、食少；胃及十二指肠溃疡见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 20～30ml，一日 3 次，用时摇匀。

【注意事项】阴虚内热胃痛者忌用。

2019

第六节　温里剂

国药准字Z34020117
OTC
张恒春
附子理中丸
浓缩丸
200丸装
芜湖张恒春药业有限公司
请按药品说明书服用
OTC
张恒春
附子理中丸
浓缩丸
200丸装
芜湖张恒春药业有限公司

3. 附子理中丸

【药物组成】附子（制）、干姜、党参、炒白术、甘草。

【功能】温中健脾。

【主治】脾胃虚寒所致的脘腹冷痛、呕吐泄泻、手足不温。

【用法用量】口服。水蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2～3 次。

【注意事项】所含附子有毒，故不宜过量与久服，孕妇慎用。湿热泄泻者忌用。

2019

第六节　温里剂

4. 良附丸

【药物组成】高良姜、醋香附。

【功能】温胃理气。

【主治】寒凝气滞，脘痛吐酸，胸腹胀满。

【用法用量】口服。一次 3～6g，一日 2 次。

【注意事项】胃热及湿热中阻胃痛者慎用。

2019

第六节　温里剂

生姜

干姜

高良姜

炮姜

2019

第六节　温里剂

OTC
香砂养胃丸
NONGSUOYWAN Xiangsha Yangwei Wan
(浓缩丸) 360丸
产品批号: 131013
生产日期: 2013.10.26
有效期至: 2018.10.25
河南省宛西制药股份有限公司

OTC
香砂平胃丸
Xiangsha Pingwei Wan
苍术
60克×1瓶
香砂平胃丸
Xiangsha Pingwei Wan
李时珍医药集团有限公司

5. 香砂养胃颗粒（丸）

【药物组成】白术、木香、砂仁、豆蔻（去壳）、广藿香、陈皮、姜厚朴、醋香附、茯苓、枳实（炒）、姜半夏、甘草、生姜、大枣。

【功能】温中和胃。

【主治】胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满，症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。

【用法用量】口服。颗粒剂：开水冲化，一次 5g，一日 2 次。丸剂：一次 9g，一日 2 次。

【注意事项】胃阴不足或湿热中阻所致痞满、胃痛、呕吐者忌用。忌食生冷、油腻及酸性食物。

2019

6. 香砂平胃丸（颗粒）

【药物组成】苍术、厚朴（姜制）、木香、砂仁、陈皮、甘草。

【功能】理气化湿，和胃止痛。

【主治】湿浊中阻、脾胃不和所致的胃脘疼痛、胸膈满闷、恶心呕吐、纳呆食少。

【用法用量】口服。丸剂一次 6g，一日 1～2 次。颗粒剂：开水冲服，一次10g，一日 2 次。

【注意事项】脾胃阴虚者忌用。服药期间，饮食宜清淡，忌生冷、油腻、煎炸食物和海鲜发物。

2019

第六节　温里剂

木香

砂仁

2019

第六节　温里剂

二、回阳救逆剂



第六节　温里剂

四逆汤

【药物组成】淡附片、干姜、炙甘草。

【功能】温中祛寒，回阳救逆。

【主治】阳虚欲脱，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝。

【用法用量】口服。一次 10～20ml，一日 3 次，或遵医嘱。

【注意事项】所含附子有毒，故不宜过量久服，孕妇禁用。湿热、阴虚、实热所致腹痛、泄泻者忌用。冠心病心绞痛病情急重者应配合抢救措施。不宜单独用于休克，应结合其他抢救措施。

2019

第六节　温里剂

福霖®
四逆散
SINI SAN
【用法用量】开水冲泡或炖服，一次9克，一日2次。
【包　　装】复合袋包装，4袋/盒。
福州海王金象中药制药有限公司
四逆散
SINI SAN

第六节　温里剂

附子

干姜

2019

第六节　温里剂

一、温中散寒剂

理中丸（党参理中丸）

小建中合剂

附子理中丸

良附丸

香砂养胃丸

香砂平胃丸

二、回阳救逆剂

四逆汤

2019

第六节　温里剂

1、主治湿浊中阻、脾胃不和所致的胃脘疼痛、胸膈满闷、恶心呕吐、纳呆食少的中成药是

A. 良附丸

B. 香砂平胃丸（颗粒）

C. 小建中合剂

D. 香砂养胃颗粒（丸）

E. 四逆汤

2019

第六节　温里剂

2、四逆汤除了回阳救逆还有的功能是

A. 温中补虚

B. 温胃理气

C. 温中祛寒

D. 理气化湿

E. 和胃止痛

2019

第六节　温里剂

A. 温中补虚、缓急止痛

B. 理气化湿、和胃止痛

C. 温中祛寒、回阳救逆

D. 温中散寒、健胃

E. 温中健脾

3、附子理中丸的功能是

4、小建中合剂的功能是

2019

第六节　温里剂

A. 健胃

B. 和胃止痛

C. 缓急止痛

D. 健脾

E. 理气

5、理中丸除了温中散寒外，还具有的功能是

6、良附丸除了温胃外还具有的功能是

2019

第六节　温里剂

综合分析选择题

患者，女，40岁。二月初，病伤寒八九日，四肢逆冷，自利腹痛，目不欲开，神衰欲寐，冷汗自出，脉微细欲绝。断证为心肾阳衰之寒厥证，处方四逆汤。

7、四逆汤的功能为

A. 温中祛寒，回阳救逆

B. 温中祛寒，补气健脾

C. 温中补虚，和里缓急

D. 温中补虚，降逆止呕

E. 益气，回阳，固脱

2019

第六节　温里剂

8、四逆汤中的君药是

A. 附子

B. 干姜

C. 附子、干姜

D. 附子、甘草

E. 干姜、大枣

2019

第六节　温里剂

9、下列对四逆汤叙述错误的是

A. 孕妇禁用

B. 回阳救逆代表药

C. 全方合用，辛热峻补

D. 君药为炮姜

E. 本品含附子，不宜过量、久用

2019

第七节　祛痰剂

一、燥湿化痰剂

二陈丸

橘贝半夏颗粒

二、清化热痰剂

礞石滚痰丸

清气化痰丸

复方鲜竹沥液

三、化痰息风剂

半夏天麻丸

四、化痰散结剂

消瘿丸

2019

第七节　祛痰剂

一、燥湿化痰剂

第七节　祛痰剂

一、燥湿化痰剂

第七节　祛痰剂

1. 二陈丸

【药物组成】半夏（制）、陈皮、茯苓、甘草。

【功能】燥湿化痰，理气和胃。

【主治】痰湿停滞导致的咳嗽痰多、胸脘胀闷、恶心呕吐。

【用法用量】口服。一次 9～15g，一日 2 次。

【注意事项】本品辛香温燥易伤阴津，故不宜长期服用。肺阴虚所致的燥咳、咯血忌用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

2. 橘贝半夏颗粒

【药物组成】橘红、半夏（制）、川贝母、枇杷叶、桔梗、远志（制）、紫菀、款冬花（炒）、前胡、苦杏仁霜、麻黄、紫苏子（炒）、木香、肉桂、天花粉、甘草。

【功能】化痰止咳，宽中下气。

【主治】痰气阻肺，咳嗽痰多、胸闷气急。

【用法用量】口服。一次 3～6g，一日 2 次。

【注意事项】本品含有麻黄，故孕妇及心脏病、高血压病患者慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌食生冷、辛辣、燥热食物，忌烟酒。

2019

第七节　祛痰剂

陈皮

半夏

橘红

贝母

2019

第七节　祛痰剂

二、清热化痰剂

礞石滚痰丸

清气化痰丸

复方鲜竹沥液

2019

第七节　祛痰剂

礞石滚痰丸
每盒装10袋
逐痰降火。用于痰火
扰心所致的癫狂惊悸，
或咳喘痰稠、大便秘结。
佛山
盈天医药
WINTEAM
佛山冯了性药业有限公司
FOSHAN FENGLIAOXING PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

第七节　祛痰剂

1. 礞石滚痰丸

【药物组成】金礞石（煅）、黄芩、熟大黄、沉香。

【功能】逐痰降火。

【主治】痰火扰心所致的癫狂惊悸，或喘咳痰稠、大便秘结。

【用法用量】口服。一次 6～12g，一日 1 次。

【注意事项】孕妇忌服。非痰热实证、体虚及小儿虚寒成惊者慎用。癫狂重症者，需在专业医生指导下配合其他治疗方法。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。药性峻猛，易耗损气血，须病除即止，切勿过量久用。

2019

第七节　祛痰剂

清气化痰丸
【功能主治】清肺化痰。用于痰热阻肺所致的咳嗽痰多、痰黄
稠黏、胸胁满闷。
6克×10袋
国药准字Z41021649

2. 清气化痰丸

【药物组成】胆南里、酒黄芩、瓜蒌仁霜、苦杏仁、陈皮、枳实、茯苓、半夏（制）。

【功能】清肺化痰。

【主治】痰热阻肺所致的咳嗽痰多、痰黄黏稠、胸腹满闷。

【用法用量】口服。一次 6～9g，一日 2 次，小儿酌减。

【注意事项】孕妇、风寒咳嗽、痰湿阻肺者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣、燥热食物，忌烟酒。

2019

第七节　祛痰剂

复方鲜竹沥液
FUFANG XIANZHULI YE
【批准文号】国药准字Z36021759
10支装
江西药都樟树制药有限公司

3. 复方鲜竹沥液

【药物组成】鲜竹沥、鱼腥草、枇杷叶、桔梗、生半夏、生姜、薄荷素油。

【功能】清热化痰，止咳。

【主治】痰热咳嗽，痰黄黏稠。

【用法用量】口服。一次 20ml，一日 2～3 次。

【注意事项】孕妇、寒嗽及脾虚便溏者慎用。服药期间，忌烟、酒，忌食辛辣刺激和油腻食物。

2019

第七节　祛痰剂

二、清热化痰剂

礞石滚痰丸

清气化痰丸

复方鲜竹沥液

2019

第七节　祛痰剂

三、化痰息风剂

第七节　祛痰剂

半夏天麻丸

【药物组成】法半夏、天麻、人参、炙黄芪、炒白术、苍术（米泔炙）、陈皮、茯苓、泽泻、六神曲（麸炒）、炒麦芽、黄柏。

【功能】健脾祛湿，化痰息风。

【主治】脾虚湿盛、风痰上扰所致的眩晕、头痛、如蒙如裹、胸脘满闷。

【用法用量】口服。一次 6g，一日 2～3 次。

【注意事项】孕妇禁用。肝肾阴虚、肝阳上亢所致的头痛、眩晕慎用。平素大便干燥者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻及海鲜类食物。

2019

第七节　祛痰剂

四、化痰散结剂

四、化痰散结剂

消瘿丸

【药物组成】昆布、海藻、蛤壳、浙贝母、夏枯草、陈皮、槟榔、桔梗。

【功能】散结消瘿。

【主治】痰火郁结所致的瘿瘤初起；单纯型地方性甲状腺肿见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 1 丸，一日 3 次，饭前服用，小儿酌减。

【注意事项】孕妇慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣食物。

2019

第七节　祛痰剂

一、燥湿化痰剂

二陈丸

橘贝半夏颗粒

二、清化热痰剂

礞石滚痰丸

清气化痰丸

复方鲜竹沥液

三、化痰息风剂

半夏天麻丸

四、化痰散结剂

消瘿丸

2019

第七节　祛痰剂

1、二陈丸的功效是

A. 燥湿化痰，理气和胃

B. 化痰止咳，宽中下气

C. 清热化痰，止咳

D. 逐痰降火

E. 健脾祛湿，化痰息风

2019

第七节　祛痰剂

A. 燥湿化痰，理气和胃

B. 健脾祛湿，化痰息风

C. 散结消瘿

D. 宽中下气

E. 清肺化痰

2、半夏天麻丸的功能是

3、橘贝半夏颗粒除了化痰止咳还具有的功能是

2019

第七节　祛痰剂

A. 痰火扰心

B. 痰热阻肺

C. 痰火郁结所致的瘿瘤初起

D. 风痰上扰

E. 痰湿停滞

4、消瘿丸的主治是

5、清气化痰丸的主治是

2019

第七节　祛痰剂

患者，男，47岁。患湿痰证，咳嗽，痰多色白，易咳出，胸脘胀满，恶心呕吐，肢体困倦，舌苔白滑，脉滑，处方二陈丸。

6、二陈丸的功能为

A. 燥湿化痰，理气和胃

B. 祛痰，止咳，平喘

C. 清热解毒，化痰止咳

D. 清肺润燥

E. 理气化痰，和胃利胆

2019

第七节　祛痰剂

7、二陈丸配伍意义解释错误的是

A. 半夏善温化燥，散中焦寒湿痰饮，为君药

B. 茯苓渗湿健脾，助君臣药利湿化痰

C. 生姜为臣药

D. 甘草润肺和中，调和诸药

E. 全方配伍，温燥兼淡渗辛散

2019

第七节　祛痰剂

8、关于二陈丸的说法错误的是

A. 服药期间忌食辛辣、生冷、油腻食物

B. 方中只含两味药

C. 方中半夏为制半夏

D. 二陈指陈皮、半夏

E. 肺阴虚所致燥咳、咯血忌用

2019

第八节　止咳平喘剂

一、散寒止咳剂

二、清肺止咳剂

三、润肺止咳剂

四、发表化饮平喘剂

五、泄热平喘剂

六、化痰平喘剂

七、补肺平喘剂

八、纳气平喘剂

2019

第八节　止咳平喘剂

一、散寒止咳剂

通宣理肺丸

杏苏止咳颗粒

2019

第八节　止咳平喘剂

通宣理肺丸
Tongxuan Lifei Wan
警示语：运动员慎用
北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂
OTC
通宣理肺丸
解表散寒
宣肺止嗽

第八节　止咳平喘剂

1. 通宣理肺丸

【药物组成】紫苏叶、前胡、桔梗、 苦杏仁、麻黄、甘草、陈皮、半夏（制）、茯苓、枳壳（炒）、 黄芩。

【功能】解表散寒，宣肺止嗽。

【主治】用于感冒咳嗽，发热恶寒，鼻塞流涕，头痛无汗，肢体酸痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、风热或痰热咳嗽、阴虚干咳者慎用。服药期间，忌烟、酒及辛辣食物。因其含有麻黄，故心脏病、高血压病患者慎用。

2019

第八节　止咳平喘剂

2. 杏苏止咳颗粒（糖浆、口服液）

【药物组成】苦杏仁、前胡、紫苏叶、桔梗、陈皮、甘草。

【功能】宣肺散寒，止咳祛痰。

【主治】风寒感冒咳嗽、气逆。

【用法用量】口服。颗粒剂：开水冲化，一次 12g，一日 3 次，小儿酌减。糖浆剂一次 10～15ml，一日 3 次，小儿酌减。口服液：一次 10ml，一日 3 次。

【注意事项】风热、燥热及阴虚干咳者慎用。服药期间，宜食清淡易消化食物，忌食辛辣食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

二、清肺止咳剂

清肺抑火丸

蛇胆川贝液

橘红丸

急支糖浆

强力枇杷露

川贝止咳露

2019

第八节　止咳平喘剂

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
国药准字Z62021002
OTC
WUDU
清肺抑火丸
功能主治：清肺止咳，化痰通便。用于痰热阻肺所致的咳嗽、痰黄稠黏、口干咽痛、大便干燥。
中华老字号
10袋
甘肃佛仁制药科技有限公司

第八节　止咳平喘剂

1. 清肺抑火丸

【药物组成】黄芩、栀子、黄柏、浙贝母、桔梗、前胡、苦参、知母、天花粉、大黄。

【功能】清肺止咳，化痰通便。

【主治】痰热阻肺所致的咳嗽，症见咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便干燥。

【用法用量】口服。水丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2～3 次。

【注意事项】孕妇、风寒咳嗽、脾胃虚弱者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣、燥热食物，忌烟酒。

2019

第八节　止咳平喘剂

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。
OTC
佛山
蛇胆川贝散
每盒装5袋
盈天医药
WINTEAM

2. 蛇胆川贝散（胶囊、软胶囊）

【药物组成】蛇胆汁、川贝母。

【功能】清肺，止咳，祛痰。

【主治】肺热咳嗽，痰多。

【用法用量】口服。散剂：一次 0.3～0.6g，一日 2～3 次。

胶囊剂：一次 1～2粒，一日 2～3 次。

软胶囊剂：一次 2～4 粒，一日 2～3 次。

【注意事项】孕妇、痰湿犯肺或久咳不止者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物，忌吸烟、饮酒。

2019

第八节　止咳平喘剂

3. 橘红丸（片、颗粒、胶囊）

【药物组成】化橘红、浙贝母、陈皮、半夏（制）、茯苓、苦杏仁、炒紫苏子、桔梗、紫菀、款冬花、瓜蒌皮、石膏、地黄、麦冬、甘草。

【功能】清肺，化痰，止咳。

【主治】痰热咳嗽，痰多，色黄黏稠，胸闷口干。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、气虚咳喘及阴虚燥咳者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

太极
OTC
200ml
急支糖浆
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
TAIJI GROUP CHONGQING FULING PHARMACEUTICAL FACTORY CO.,LTD

4. 急支糖浆

【药物组成】鱼腥草、金荞麦、四季青、麻黄、前胡、紫菀、枳壳、甘草。

【功能】清热化痰，宣肺止咳。

【主治】外感风热所致的咳嗽，症见发热、恶寒、胸膈满闷、咳嗽咽痛；急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及寒证者慎用。因其含麻黄，故运动员、心脏病、高血压病者慎用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物，忌吸烟饮酒。

2019

第八节　止咳平喘剂

999
OTC
强力枇杷露
养阴敛肺止咳祛痰
999 QIANG LI PI PA LU ZHI KE QU TAN
225毫升

5. 强力枇杷露

【药物组成】枇杷叶、罂粟壳、百部、桑白皮、白前、桔梗、薄荷脑。

【功能】清热化痰，敛肺止咳。

【主治】痰热伤肺所致的咳嗽经久不愈、痰少而黄或干咳无痰；急、慢性支气管炎见上述证候者。

【用法用量】口服。露剂：一次 15ml，一日 3 次，小儿酌减。

胶囊剂：口服一次 2 粒，一日 2 次。

【注意事项】因其含有毒的罂粟壳，故孕妇禁用，不可过量或久用。外感咳嗽及痰浊壅盛者慎用。服药期间，忌食辛辣厚味食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

6. 川贝止咳露

【药物组成】川贝母、枇杷叶、前胡、百部、桔梗、桑白皮、薄荷脑。

【功能】止嗽祛痰。

【主治】风热咳嗽，痰多上气或燥咳。

【用法用量】口服。一次 15ml，一日 3 次。

【注意事项】风寒咳嗽者慎用。服药期间，忌烟、酒及辛辣食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

二、清肺止咳剂

清肺抑火丸

蛇胆川贝液

橘红丸

急支糖浆

强力枇杷露

川贝止咳露

2019

第八节　止咳平喘剂

三、润肺止咳剂

养阴清肺膏

二母宁嗽丸

蜜炼川贝枇杷膏

2019

第八节　止咳平喘剂

养阴清肺膏
Yangyin Qingfei Gao
每瓶装100毫升
广州市花城制药厂
生产地址:广州市萝岗区九龙镇
OTC
养阴清肺膏
Yangyin Qingfei Gao
每瓶装100毫升
广州市花城制药厂
GUANGZHOU HUACHENG PHARMACEUTICS
批准文号：国药准字Z44020158

第八节　止咳平喘剂

1. 养阴清肺膏（糖浆、口服液、丸）

【药物组成】地黄、玄参、麦冬、白芍、牡丹皮、川贝母、薄荷、甘草。

【功能】养阴润燥，清肺利咽。

【主治】阴虚燥咳，咽喉干痛，干咳少痰，或痰中带血。

【用法用量】口服。

【注意事项】脾虚便溏、痰多湿盛咳嗽者慎用。孕妇慎用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

2. 二母宁嗽丸

【药物组成】知母、川贝母、石膏、炒栀子、黄芩、炒瓜蒌子、蜜桑白皮、茯苓、陈皮、麸炒枳实、五味子（蒸）、炙甘草。

【功能】清肺润燥，化痰止咳。

【主治】燥热蕴肺所致的咳嗽，症见痰黄而黏不易咳出、胸闷气促、久咳不止、声哑喉痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】风寒咳嗽者慎用。服药期间，忌食辛辣以及牛肉、羊肉、鱼等食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

3. 蜜炼川贝枇杷膏

【药物组成】川贝母、枇杷叶、桔梗、陈皮、水半夏、北沙参、五味子、款冬花、杏仁、薄荷脑。

【功能】清热润肺，化痰止咳。

【主治】肺燥咳嗽，痰黄而黏，胸闷，咽喉疼痛或痒，声音嘶哑。

【用法用量】口服，一次 15ml，一日 3 次，小儿酌减。

【注意事项】外感风寒咳嗽者慎用。服药期间忌食辛辣食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

三、润肺止咳剂

养阴清肺膏

二母宁嗽丸

蜜炼川贝枇杷膏

2019

第八节　止咳平喘剂

四、发表化饮平喘剂

小青龙胶囊（合剂、颗粒、糖浆）

桂龙咳喘宁胶囊

2019

第八节　止咳平喘剂

第八节　止咳平喘剂

1. 小青龙胶囊（合剂、颗粒、糖浆）

【药物组成】麻黄、桂枝、干姜、细辛、五味子、白芍、法半夏、炙甘草。

【功能】解表化饮，止咳平喘。

【主治】风寒水饮，恶寒发热、无汗、喘咳痰稀。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、内热咳喘及虚喘者慎用。因其含麻黄，故高血压、青光眼者慎用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

2. 桂龙咳喘宁胶囊

【药物组成】桂枝、龙骨、白芍、炒苦杏仁、瓜蒌皮、法半夏、牡蛎、生姜、大枣、黄连、炙甘草。

【功能】止咳化痰，降气平喘。

【主治】外感风寒，痰湿内阻引起的咳嗽、气喘、痰涎壅盛；急慢性支气管炎见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 3 粒，一日 3 次。

【注意事项】孕妇、外感风热者慎用。服药期间，戒烟忌酒，忌食油腻、生冷食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

五、泄热平喘剂

第八节　止咳平喘剂

止嗽定喘口服液

【药物组成】麻黄、石膏、苦杏仁、甘草。

【功能】辛凉宣泄，清肺平喘。

【主治】表寒里热，身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷；急性支气管炎见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 10ml，一日 2～3 次，儿童酌减。

【注意事项】孕妇、阴虚久咳者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。因其含麻黄，故青光眼、高血压病、心脏病者慎用。

2019

第八节　止咳平喘剂

六、化痰平喘剂

降气定喘丸

蠲哮片

2019

第八节　止咳平喘剂

1. 降气定喘丸

【药物组成】麻黄、葶苈子、桑白皮、紫苏子、白芥子、陈皮。

【功能】降气定喘，祛痰止咳。

【主治】痰浊阻肺所致的咳嗽痰多，气逆喘促；慢性支气管炎、支气管哮喘见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 7g，一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。虚喘、年老体弱者慎用。因其含麻黄，故高血压病、心脏病、青光眼者慎用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

2. 蠲哮片

【药物组成】葶苈子、黄荆子、青皮、陈皮、大黄、槟榔、生姜。

【功能】泻肺除壅，涤痰祛瘀，利气平喘。

【主治】支气管哮喘急性发作期痰瘀伏肺证，症见气粗痰涌、痰鸣如吼、咳呛阵作、痰黄稠厚。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及久病体虚、脾胃虚弱便溏者禁用。服药后如出现大便稀溏、

轻度腹痛，属正常现象，可继续用药或减少用量。服药期间忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第八节　止咳平喘剂

七、补肺平喘剂

第八节　止咳平喘剂

人参保肺丸

【药物组成】人参、五味子（醋炙）、罂粟壳、川贝母、苦杏仁（去皮炒）、麻黄、石膏、玄参、枳实、砂仁、陈皮、甘草。

【功能】益气补肺，止嗽定喘。

【主治】肺气亏虚，肺失宣降所致的虚劳久嗽、气短喘促。

【用法用量】口服。一次 2 丸，一日 2～3 次。

【注意事项】外感或实热咳嗽、高血压病和心脏病者慎用。因其含罂粟壳与麻黄，故不宜过量、久用，高血压病、心脏病、青光眼者慎用。

2019

第八节　止咳平喘剂

八、纳气平喘剂

苏子降气丸

七味都气丸

固本咳喘片

蛤蚧定喘丸

2019

第八节　止咳平喘剂

紫鑫
国药准字Z20063628
OTC
【功能主治】
降气化痰，温肾纳气。
用于上盛下虚，气逆痰
壅所致的咳嗽喘息，胸
膈痞塞。
苏子降气丸
SU ZI JIANG QI WAN
6 931421 500937
吉林紫鑫药业股份有限公司
JILIN ZIXIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO.,LTD

第八节　止咳平喘剂

一、苏子降气丸

【药物组成】炒紫苏子、姜半夏、厚朴、前胡、陈皮、沉香、当归、甘草

【功能】降气化痰，温肾纳气。

【主治】上盛下虚、气逆痰壅所致的咳嗽喘息、胸膈满闷。

【用法用量】口服。一次 6g，一日 1～2 次。

【注意事项】阴虚、舌红无苔者忌服。外感痰热咳喘及孕妇慎用。服药期间，忌食生冷、油腻食物，忌烟酒。

2019

2. 七味都气丸

【药物组成】熟地黄、醋五味子、山茱萸（制）、山药、茯苓、泽泻、牡丹皮。

【功能】补肾纳气，涩精止遗。

【主治】肾不纳气所致的喘促、胸闷、久咳、气短、咽干、遗精、盗汗、小便频数。

【用法用量】口服，一次 9g，一日 2 次。

【注意事项】外感咳喘者忌用。服药期间，宜食清淡易消化食物，忌食辛辣食物。

2019

3. 固本咳喘片

【药物组成】党参、白术（麸炒）、茯苓、盐补骨脂、麦冬、醋五味子、炙甘草。

【功能】益气固表，健脾补肾。

【主治】脾虚痰盛、肾气不固所致的咳嗽、痰多、喘息气促、动则喘剧；慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 3 片，一日 3 次。

【注意事项】外感咳嗽慎用。慢性支气管炎和支气管哮喘急性发作期慎用。服药期间，忌食辛辣食物。

2019

4. 蛤蚧定喘丸

【药物组成】蛤蚧、百合、炒紫苏子、炒苦杏仁、紫菀、瓜蒌子、麻黄、黄芩、黄连、煅石膏、醋鳖甲、麦冬、甘草、石膏。

【功能】滋阴清肺，止咳平喘。

【主治】肺肾两虚、阴虚肺热所致的虚劳久咳、年老哮喘、气短烦热、胸满郁闷、自汗盗汗。

【用法用量】口服。【注意事项】孕妇及咳嗽新发者慎用。服药期间忌食辛辣、生冷、油腻食物。本品含麻黄，故高血压病、心脏病、青光眼者慎用。

2019

第八节　止咳平喘剂

橘贝半夏颗粒
川贝止咳露
蜜炼川贝枇杷膏
蛇胆川贝液

小青龙胶囊
桂龙咳喘宁胶囊

急支糖浆
强力枇杷露

止嗽定喘口服液
蛤蚧定喘丸
降气定喘丸

2019

第八节　止咳平喘剂

通宣理肺丸

杏苏止咳颗粒

蠲哮片

清肺止咳剂

清肺抑火丸

橘红丸

止嗽定喘口服液

七味都气丸

固本咳喘片

人参补肺丸

2019

第八节　止咳平喘剂

养阴清肺膏

二母宁嗽丸

2019

题目

1. 急支糖浆的功能是

A. 清肺止咳，化痰通便

B. 清热化痰，宣肺止咳

C. 清热化痰，敛肺止咳

D. 养阴润燥，清肺利咽

E. 清热润肺，化痰止咳

2019

题目

A. 上盛下虚，气逆痰壅

B. 肾不纳气所致的喘促

C. 肺肾两虚，阴虚肺热

D. 肺气亏虚，肺失宣降

E. 痰浊阻肺

2. 人参保肺丸的主治是

3. 苏子降气丸的主治是

2019

题目

A. 涩精止遗

B. 益气固表

C. 滋阴清肺

D. 温肾纳气

E. 清肺化痰

4. 固本咳喘片除了健脾补肾，还具有的功能是

5. 蛤蚧定喘胶囊（丸）除了止咳平喘，还具有的功能是

2019

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

第九节　开窍剂

第九节　开窍剂

一、凉开剂

1. 安宫牛黄丸（胶囊、散）
2. 紫雪散
3. 局方至宝散（丸）
4. 万氏牛黄清心丸

二、温开剂

苏合香丸

2019

一、凉开剂

安宫牛黄丸
Angong Niuhuang Wan
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
【规格】每丸重 3g
北京同仁堂
科技发展股份有限公司制药厂

一、凉开剂

1. 安宫牛黄丸（胶囊、散）

【药物组成】牛黄或人工牛黄、麝香或人工麝香、水牛角浓缩粉、黄连、黄芩、栀子、冰片、郁金、朱砂、珍珠、雄黄。

【功能】清热解毒，镇惊开窍。

【主治】热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。

【注意事项】孕妇禁用。寒闭神昏者不宜使用。因其含有毒的朱砂、雄黄，故不宜过量或久服，肝肾功能不全者慎用。在治疗过程中如出现肢寒畏冷、面色苍白、冷汗不止、脉微欲绝，由闭证变为脱证者应立即停药。高热神昏、中风昏迷等口服本品困难者，当鼻饲给药。

【用法用量】口服。

2019

一、凉开剂

国药准字Z45021911
紫雪散(紫雪)
Zixue San
1.5gx10瓶
150701
2017.06
广西梧州制药(集团)
2016-10-31 315jiage.cn

一、凉开剂

2. 紫雪散

【药物组成】水牛角浓缩粉、羚羊角、人工麝香、石膏、北寒水石、滑石、玄参、升麻、朱砂、磁石、木香、沉香、丁香、玄明粉、硝石（精制）、甘草。

【功能】清热开窍，止痉安神。

【主治】热入心包、热动肝风证，症见高热烦躁、神昏谵语、惊风抽搐、斑疹吐衄、尿赤便秘。

【注意事项】孕妇禁用。虚风内动者不宜使用。因其含有毒的朱砂，故不宜过量或久服，肝肾功能不全者慎用。高热神昏口服本品困难者，可鼻饲给药，并采用综合疗法。

2019

一、凉开剂

同仁堂
局方至宝散
清热解毒 开窍镇惊
1x10
北京同仁堂制药厂
同仁堂
局方至宝散
清热解毒 开窍镇惊
1x10
北京同仁堂制药厂

一、凉开剂

3. 局方至宝散（丸）

【药物组成】牛黄、人工麝香、水牛角浓缩粉、玳瑁、冰片、安息香、朱砂、琥珀、雄黄。

【功能】清热解毒，开窍镇惊。

【主治】热病属热入心包、热盛动风证，症见高热惊厥、烦躁不安、神昏谵语及小儿急热惊风。

【注意事项】孕妇禁用。寒闭神昏者不宜使用。服药期间忌食辛辣食物。因其含有毒的朱砂、雄黄，故不宜过量或久服，肝肾功能不全者慎用。在治疗过程中如出现肢寒畏冷，面色苍白，冷汗不止，脉微欲绝，由闭证变为脱证时，应立即停药。高热神昏、小儿急惊风等口服本品困难者，可鼻饲给药。

【用法用量】口服。

2019

一、凉开剂

一、凉开剂

4. 万氏牛黄清心丸

【药物组成】牛黄、黄连、黄芩、栀子、朱砂、郁金。

【功能】清热解毒，镇惊安神。

【主治】热入心包、热盛动风证，症见高热烦躁、神昏谵语及小儿高热惊厥。

【注意事项】孕妇慎用。虚风内动、脱证神昏者不宜使用。外感热病表证未解时慎用。因其含朱砂，故不宜过量或长期服用。肝肾功能不全或造血系统疾病患者慎用。高热急症者，应采取综合治疗。

2019

一、凉开剂

福乐
国药准字 Z13020487
OTC
清开灵口服液
【功能主治】
清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致发热、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性咽炎、急性气管炎等病症属上述证候者。
福乐药业
FULE PHARMACEUTICAL
10ml×6支

5. 清开灵口服液　（胶囊、软胶囊、颗粒、滴丸、片、泡腾片）

【药物组成】胆酸、猪去氧胆酸、黄芩苷、水牛角、金银花、栀子、板蓝根、珍珠母。

【功能】清热解毒，镇静安神。

【主治】外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述症候者。

【注意事项】孕妇禁用。

【用法用量】口服。

2019

二、温开剂

二、温开剂

苏合香丸

【药物组成】苏合香、安息香、人工麝香、冰片、沉香、檀香、木香、香附、乳香（制）、丁香、荜茇、白术、诃子肉、朱砂、水牛角浓缩粉。

【功能】芳香开窍，行气止痛。

【主治】痰迷心窍所致的痰厥昏迷、中风偏瘫、肢体不利，以及中暑、心胃气痛。

【注意事项】孕妇禁用。热病、阳闭、脱证不宜使用。中风病正气不足者慎用，或配合扶正中药服用。因其含朱砂，且易耗伤正气，故不宜过量或长期服用，肝肾功能不全者慎用。急性脑血管病服用本品，应结合其他抢救措施；对中风昏迷者宜鼻饲给药。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

【用法用量】口服。

二、温开剂

一、凉开剂

1. 安宫牛黄丸（胶囊、散）
2. 紫雪散
3. 局方至宝散（丸）
4. 万氏牛黄清心丸

二、温开剂

苏合香丸

2019

题目

安宫牛黄丸（胶囊、散）的功能是

A. 清热解毒，镇惊开窍

B. 清热开窍，止痉安神

C. 清热解毒，镇静安神

D. 芳香开窍，行气止痛

E. 开窍醒神，凉血止血

2019

题目

A. 止痉安神

B. 镇惊开窍

C. 镇惊祛风

D. 平肝潜阳

E. 开窍醒神

1. 紫雪散既能清热开窍，又能

2. 安宫牛黄丸既能清热解毒，又能

3. 牛黄清心丸既能清心化痰，又能

2019

第十节　固涩剂

益气固表剂

玉屏风胶囊（颗粒、口服液）

固脬缩尿剂

缩泉丸

固精止遗剂

金锁固精丸

涩肠止泻剂

四神丸（片）

固本益肠片

2019

一、益气固表剂

玉屏风胶囊（颗粒、口服液）

【药物组成】黄芪、白术（炒）、防风。

【功能】益气，固表，止汗。

【主治】表虚不固所致的自汗，症见自汗恶风、面色㿠白，或体虚易感风邪者。

【用法用量】口服。

【注意事项】热病汗出、阴虚盗汗者慎用。服药期间饮食宜清淡。

二、固脬缩尿剂

缩泉丸

【药物组成】益智仁（盐炒）、乌药、山药。

【功能】补肾缩尿。

【主治】肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。

【用法用量】口服。

【注意事项】肝经湿热所致的遗尿与膀胱湿热所致的小便频数忌用。服药期间，饮食宜清淡，忌饮酒，忌食辛辣、生冷及冰镇食物。

三、固精止遗剂

金锁固精丸

【药物组成】沙苑子（炒）、芡实（蒸）、莲子、莲须、龙骨（煅）、牡蛎（煅）。

【功能】固肾涩精。

【主治】肾虚不固所致的遗精滑泄、神疲乏力、四肢痿软、腰痿耳鸣。

【用法用量】口服。淡盐水送服，一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】湿热下注扰动精室所致遗精、早泄者不宜用。服药期间，不宜食辛辣、油腻食物及饮酒。慎房事。

四、涩肠止泻剂

四神丸
SI SHEN WAN
TONG REN TANG
NATURE PHARM
北京同仁堂

国药准字Z10940035
固本益肠片
GUBEN YICHANG PIAN
12片×3板
沈阳绿洲制药有限责任公司

四、涩肠止泻剂

1. 四神丸（片）

【药物组成】补骨脂（盐炒）、肉豆蔻（煨）、吴茱萸（制）、五味子（醋制）、

大枣（去核）、生姜（未列于处方中，制法中有生姜）。

【功能】温肾散寒，涩肠止泻。

【主治】肾阳不足所致的泄泻，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。

【用法用量】口服。

【注意事项】湿热痢疾、湿热泄泻者忌用。忌食生冷、油腻食物。

2019

四、涩肠止泻剂

2. 固本益肠片

【药物组成】党参、黄芪、补骨脂、炒白术、麸炒山药、炮姜、酒当归、炒白芍、醋延胡索、煨木香、地榆炭、煅赤石脂、儿茶、炙甘草。

【功能】健脾温肾，涩肠止泻。

【主治】脾肾阳虚所致的泄泻，症见腹痛绵绵、大便清稀或有黏液及黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷、舌淡苔白、脉虚；慢性肠炎见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】湿热痢疾、泄泻者忌服。忌食生冷、辛辣油腻食物。

2019

第十节　固涩剂

玉屏风胶囊（颗粒、口服液）

缩泉丸

固精止遗剂

金锁固精丸

四神丸（片）

固本益肠片

2019

题目

玉屏风颗粒（胶囊、口服液）除了固表、止汗，还具有的功能是

A. 化湿

B. 理气

C. 益气

D. 补血

E. 涩精止遗

2019

题目

服用时，应该用淡盐水送服的常用中成药是

A. 缩泉丸

B. 金锁固精丸

C. 固本益肠片

D. 四神丸（片）

E. 玉屏风胶囊

2019

题目

四神丸（片）的功能是

A. 健脾温肾，涩肠止泻

B. 补肾缩尿

C. 固肾涩精

D. 温肾散寒，涩肠止泻

E. 温肾散寒，固肾涩精

2019

题目

肾虚所致的小便频数、夜间遗尿应该选用的是

A. 缩泉丸

B. 金锁固精丸

C. 四神丸（片）

D. 固本益肠片

E. 玉屏风颗粒（胶囊、口服液）

2019

第十一节　补虚剂

补气剂

助阳剂

养血剂

滋阴剂

补气养血剂

补气养阴剂

阴阳双补剂

补精养血剂

2019

一、补气剂

四君子丸
六君子丸
香砂六君子丸

补中益气丸
参苓白术散
启脾丸
薯蓣丸

一、补气剂

【四君子汤】
白术、炙甘草、白茯苓
党参……
上工心典

庐山圣宝
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
批准文号：国药准字Z36020750
OTC
六君子丸
【功能主治】补脾益气，燥湿化痰。用于脾胃虚弱，食量不多，气虚痰多，腹胀便溏。
9克X15袋
江西庐山制药有限公司

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
OTC
同仁堂制药
香砂六君丸
Xiangsha Liujun Wan
6克×12袋
北京同仁堂制药有限公司
益气健脾和胃
香砂六君丸

一、补气剂

1. 四君子丸（合剂）

【药物组成】党参、炒白术、茯苓、大枣、生姜、炙甘草。

【功能】益气健脾。

【主治】脾胃气虚，胃纳不佳，食少便溏。

【用法用量】口服。水丸剂：一次 3～6g，一日 3 次。合剂：一次 15～20ml，一日 3 次，用时摇匀。

【注意事项】阴虚或实热证慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻、生冷食物。

2019

一、补气剂

2. 六君子丸

【药物组成】党参、白术（麸炒）、茯苓、半夏（制）、陈皮、炙甘草。

【功能】补脾益气，燥湿化痰。

【主治】脾胃虚弱，食量不多，气虚痰多，腹胀便溏。

【用法用量】口服。

【注意事项】脾胃阴虚胃痛痞满、湿热泄泻及痰热咳嗽者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻等不易消化食物。

2019

一、补气剂

3. 香砂六君丸（片）

【药物组成】党参、炒白术、茯苓、陈皮、木香、砂仁、姜半夏、炙甘草。

【功能】益气健脾，和胃。

【主治】脾虚气滞，消化不良，嗳气食少，脘腹胀满，大便溏泄。

【用法用量】口服。

【注意事项】阴虚内热胃痛及湿热痞满泄泻者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻、不易消化及刺激性食物，戒烟酒。

2019

一、补气剂

一、补气剂

4. 补中益气丸（口服液、合剂）

【药物组成】炙黄芪、党参、炒白术、炙甘草、当归、陈皮、升麻、柴胡、大枣、生姜。

【功能】补中益气，升阳举陷。

【主治】脾胃虚弱、中气下陷所致的泄泻、脱肛、阴挺，症见体倦乏力，食少腹胀、便溏久泻、肛门下坠或脱肛、子宫脱垂。

【用法用量】口服。

【注意事项】阴虚内热者慎用。不宜与感冒药同时使用。服药期间，忌食生冷、油腻、不易消化食物。

2019

一、补气剂

一、补气剂

5. 参苓白术散（水丸、颗粒）

【药物组成】人参、白术（炒）、茯苓、山药、莲子、白扁豆（炒）、薏苡仁（炒）、砂仁、桔梗、甘草。

【功能】补脾胃，益肺气。

【主治】脾胃虚弱，食少便溏，气短咳嗽，肢倦乏力。

【用法用量】口服。

【注意事项】湿热内蕴所致泄泻、厌食、水肿及痰火咳嗽者不宜使用。宜饭前服用。服药期间，忌食荤腥油腻等不易消化食物。忌恼怒、忧郁、劳累过度，保持心情舒畅。

2019

一、补气剂

一、补气剂

6. 启脾丸

【药物组成】人参、炒白术、茯苓、山药、莲子（炒）、陈皮、炒山楂、六神曲（炒）、炒麦芽、泽泻、甘草。

【功能】健脾和胃。

【主治】脾胃虚弱，消化不良，腹胀便溏。

【用法用量】口服。一次 1 丸，一日 2～3 次；三岁以内小儿酌减。

【注意事项】湿热泄泻不宜使用。伴感冒发热、表证未解者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻、不易消化食物。建立良好饮食习惯，防止偏食。

2019

一、补气剂

一、补气剂

7. 薯蓣丸

【药物组成】山药、人参、地黄、白术（麸炒）、茯苓、甘草、大枣（去核）、当归、白芍、阿胶、麦冬、川芎、六神曲（麸炒）、干姜、苦杏仁（去皮、炒）、桔梗、桂枝、柴胡、防风、白蔹、大豆黄卷。

【功能】调理脾胃，益气和营。

【主治】气血两虚，脾肺不足所致的虚劳、胃脘痛、痹病、闭经、月经不调。

【用法用量】口服。

【注意事项】服药期间，忌食生冷、油腻食物。

2019

一、补气剂

四君子丸

六君子丸

香砂六君子丸

补中益气丸

参苓白术散

启脾丸

薯蓣丸

2019

题目

具补中益气，升阳举陷的常用中成药是

A. 补中益气丸

B. 人参归脾丸

C. 参苓白术散

D. 桂附地黄丸

E. 人参养荣丸

2019

题目

启脾丸的功能是

A. 健脾清热

B. 健脾疏肝

C. 健脾养心

D. 健脾和胃

E. 健脾益肾

2019

题目

黄芪在补中益气丸中的配伍意义是

A. 补气利水

B. 补气摄血

C. 补气升阳

D. 补气行血

E. 益气生血

2019

二、助阳剂

桂附地黄丸

右归丸

五子衍宗丸

济生肾气丸

青蛾丸

二、助阳剂

仲景
OTC
桂附地黄丸
NONGSUOWAN GUIFU DIHUANGWAN 浓缩丸
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
批准文号：国药准字 Z41021898

二、助阳剂

1. 桂附地黄丸（胶囊）

【药物组成】肉桂、附子（制）、熟地黄、酒萸肉、山药、茯苓、泽泻、牡丹皮。

【功能】温补肾阳。

【主治】肾阳不足，腰膝痿冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、肺热津伤、胃热炽盛、阴虚内热消渴者慎用。治疗期间宜节制房事。因其含大热有毒的附子，故中病即止，不可过量或久服。服药期间，忌食生冷、油腻食物。

2019

二、助阳剂

二、助阳剂

2. 右归丸（胶囊）

【药物组成】肉桂、炮附片、鹿角胶、盐杜仲、菟丝子、酒萸肉、熟地黄、枸杞子、当归、山药。

【功能】温补肾阳，填精止遗。

【主治】肾阳不足，命门火衰，腰膝痿冷，精神不振，怯寒畏冷，阳痿遗精，大便溏薄，尿频而清。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇慎用。

因其含大热有毒的附子，故中病即止，不可过量或久服。服药期间，忌生冷饮食，慎房事。

2019

二、助阳剂

二、助阳剂

3. 五子衍宗丸（片、口服液） 笔记区

【药物组成】枸杞子、菟丝子（炒）、覆盆子、五味子（蒸）、盐车前子。

【功能】补肾益精。

【主治】肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余沥。

【用法用量】口服。【注意事项】感冒者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣食物，节制房事。

2019

二、助阳剂

普济堂
批准文号：国药准字Z13021064
济生肾气丸
Ji Sheng Shen Qi Wan
（小蜜丸）
药都制药集团股份有限公司
药都制药
济生肾气丸
（小蜜丸）
151201
2020.12.06
药都制药集团股份有限公司

二、助阳剂

4. 济生肾气丸（片）

【药物组成】肉桂、附子（制）、牛膝、熟地黄、山茱萸（制）、山药、茯苓、泽泻、车前子、牡丹皮。

【功能】温肾化气，利水消肿。

【主治】肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿、腰膝痠重、小便不利、痰饮咳喘。

【注意事项】孕妇、湿热壅盛、风水泛溢水肿者慎用。因其所含附子大热有毒，故不可过量或久服。服药期间，饮食宜清淡，宜低盐饮食。又因其含钾量高，与保钾利尿药安体舒通、氨苯蝶啶合用时，应防止高血钾症。避免与磺胺类药物同时使用。

【用法用量】口服。。

2019

二、助阳剂

OTC
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
加味青娥丸
9g×10丸
北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

二、助阳剂

5. 青娥丸

【药物组成】盐杜仲、盐补骨脂、核桃仁（炒）、大蒜。

【功能】补肾强腰。

【主治】肾虚腰痛，起坐不利，膝软乏力。

【用法用量】口服。

【注意事项】湿热或寒湿痹阻及外伤腰痛者慎用。治疗期间宜节制房事。

2019

二、助阳剂

桂附地黄丸

右归丸

五子衍宗丸

济生肾气丸

青蛾丸

2019

题目

下列选项中是济生肾气丸的功能的是

A. 温补气血

B. 滋阴补肾

C. 养阴生津

D. 温肾化气

E. 健脾益气

2019

题目

桂附地黄丸的功能是

A. 滋肾养肝

B. 温补肾阳

C. 滋肾养肺

D. 滋阴降火

E. 滋阴清热

2019

题目

青娥丸的主治是

A. 阳虚泄泻

B. 阴虚潮热

C. 血虚失眠

D. 肺虚久咳

E. 肾虚腰痛

2019

三、养血剂

当归补血口服液

四物合剂

三、养血剂

1. 当归补血口服液（丸、胶囊）

【药物组成】黄芪、当归。

【功能】补养气血。

【主治】气血两虚证。

【用法用量】口服。

【注意事项】感冒、阴虚火旺者慎用。服药期间，宜食清淡易消化食物，忌食辛辣、油腻、生冷食物。

2019

三、养血剂

2. 四物合剂

【药物组成】熟地黄、当归、白芍、川芎。

【功能】补血调经。

【主治】血虚所致的面色萎黄、头晕眼花、心悸气短及月经不调。

【用法用量】口服。一次 10～15ml，一日 3 次。

【注意事项】阴虚发热、血崩气脱之证不宜服用。

2019

三、养血剂


和美
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
批准文号：国药准字Z10970001
OTC
当归补血口服液
补养气血 适用于气血两虚证
产品批号：
生产日期：
有效期至：
郑州市协和制药厂
ZHENGZHOU UNION PHARMACEUTICAL FACTORY
10毫升x20支

OTC
红霖 HONGLIN
四物
红霖 HONGLIN
四物合剂

题目

用于血虚所致的面色萎黄，头晕眼花，月经不调的常用中成药是

A. 当归补血口服液
B. 四物合剂
C. 人参归脾丸
D. 八珍颗粒
E. 十全大补丸

2019

四、滋阴剂

六味地黄丸
知柏地黄丸
麦味地黄丸
杞菊地黄丸

左归丸
大补阴丸
河车大造丸
玉泉丸

四、滋阴剂

OTC
六味地黄丸
Liuwei Dihuang Wan
水蜜丸
每瓶装360粒
北京同仁堂

九芝堂
OTC
知柏地黄丸
小蜜丸
120克装
九芝堂股份有限公司

OTC
麦味地黄丸
Maiwei Dihuang Wan
水蜜丸
每瓶装60克
北京同仁堂
科技发展股份有限公司

OTC
九芝堂
杞菊地黄丸
浓缩丸
360丸装
九芝堂股份有限公司

四、滋阴剂

1. 六味地黄丸（胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊）

【药物组成】熟地黄、酒萸肉、山药、泽泻、茯苓、牡丹皮。

【功能】滋阴补肾。

【主治】肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。

【用法用量】口服。

【注意事项】体实、阳虚、感冒、脾虚、气滞、食少纳呆者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

四、滋阴剂

2. 知柏地黄丸

【药物组成】熟地黄、山茱萸（制）、山药、知母、黄柏、茯苓、泽泻、牡丹皮。

【功能】滋阴降火。

【主治】阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。

【用法用量】口服。

【注意事项】感冒、气虚发热、实热、脾虚便溏、气滞中满者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

四、滋阴剂

3. 麦味地黄丸（口服液）

【药物组成】熟地黄、酒萸肉、山药、麦冬、牡丹皮、茯苓、泽泻、五味子。

【功能】滋肾养肺。

【主治】肺肾阴亏，潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝痿软，消渴。

【用法用量】口服。

【注意事项】感冒患者慎用。服药期间，忌食辛辣食物。

2019

四、滋阴剂

4. 杞菊地黄丸（浓缩丸、片、口服液、胶囊）

【药物组成】熟地黄、酒萸肉、山药、枸杞子、菊花、茯苓、泽泻、牡丹皮。

【功能】滋肾养肝。

【主治】肝肾阴亏，眩晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花。

【用法用量】口服。

【注意事项】实火亢盛所致头晕、耳鸣，以及脾虚便溏者慎用。服药期间，忌酸冷食物。

2019

四、滋阴剂

六味地黄丸
知柏地黄丸
麦味地黄丸
杞菊地黄丸

桂附地黄丸
济生肾气丸
七味都气丸

2019

四、滋阴剂

5. 左归丸

【药物组成】熟地黄、龟甲胶、鹿角胶、枸杞子、菟丝子、山茱萸、山药、牛膝。

【功能】滋肾补阴。

【主治】真阴不足，腰痠膝软，盗汗遗精，神疲口燥。

【用法用量】口服。一次 9g，一日 2 次。

【注意事项】肾阳亏虚、命门火衰、阳虚腰痛者慎用。外感寒湿、跌扑外伤、气滞血瘀所致腰痛者慎用。孕妇慎用。治疗期间，不宜食用辛辣、油腻食物。

2019

四、滋阴剂

四、滋阴剂

6. 大补阴丸

【药物组成】熟地黄、醋龟甲、盐知母、盐黄柏、猪脊髓。

【功能】滋阴降火。

【主治】阴虚火旺，潮热盗汗，咳嗽咯血，耳鸣遗精。

【用法用量】口服。

【注意事项】感冒、气虚发热、火热实证、脾胃虚弱、痰湿内阻、脘腹胀满、食少便溏者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

四、滋阴剂

大补阴丸
DABUYIN WAN
OTC
上海雷允上封浜制药有限公司

知柏地黄丸
OTC
九芝堂
浓缩丸
200丸装
九芝堂股份有限公司

四、滋阴剂

7. 河车大造丸

【药物组成】紫河车、熟地黄、醋龟甲、天冬、麦冬、盐杜仲、牛膝（盐炒）、

【功能】滋阴清热，补肾益肺。

【主治】肺肾两亏，虚劳咳嗽，骨蒸潮热，盗汗遗精，腰膝痿软。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及气虚发热汗出者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻、生冷食物。

2019

四、滋阴剂

河车大造丸
Heche Dazao Wan
OTC

麦味地黄丸
Maiwei Dihuang Wan
北京同仁堂
科技发展股份有限公司制药厂
合格
OTC
每袋装6克
每盒装10袋

四、滋阴剂

8. 玉泉丸

【药物组成】葛根、天花粉、地黄、麦冬、五味子、甘草。

【功能】清热养阴，生津止渴。

【主治】阴虚内热所致的消渴，症见多饮、多食、多尿；2 型糖尿病见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及阴阳两虚消渴者慎用。服药期间，忌食肥甘、辛辣食物，控制饮食，注意合理的饮食结构。忌烟酒。避免长期紧张，适当进行体育活动。重症糖尿病病例应合用其他降糖药物治疗。注意早期防治各种并发症，以防止病情的恶化。

2019

四、滋阴剂

九芝堂
玉泉丸
Yu quan wan
浓缩丸
【批准文号】国药准字Z51021085
九芝堂金鼎药业有限公司

缩泉丸
Suoquan Wan
45克
[批准文号]
国药准字Z44023146
广东益和堂制药有限公司
GUANGDONG YIHETANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
OTC

四、滋阴剂

六味地黄丸
知柏地黄丸
麦味地黄丸
杞菊地黄丸

左归丸
大补阴丸
河车大造丸
玉泉丸

2019

五、补气养血剂

八珍颗粒

人参归脾丸

人参养荣丸

健脾生血颗粒

五、补气养血剂

1. 八珍颗粒（丸）

【药物组成】熟地黄、党参、当归、白芍（炒）、炒白术、茯苓、川芎、炙甘草。

【功能】补气益血。

【主治】气血两虚，面色萎黄，食欲不振，四肢乏力，月经过多。

【用法用量】口服。

【注意事项】感冒及体实有热者慎用。忌食辛辣、油腻、生冷食物。

2019

五、补气养血剂

五、补气养血剂

五、补气养血剂

2. 人参归脾丸

【药物组成】人参、炙黄芪、当归、龙眼肉、白术（麸炒）、茯苓、远志（去心、甘草炙）、酸枣仁（炒）、木香、炙甘草。

【功能】益气补血，健脾宁心。

【主治】心脾两虚、气血不足所致的心悸、怔忡、失眠健忘、食少体倦、面色萎黄，以及脾不统血所致的便血、崩漏、带下。

【用法用量】口服。

【注意事项】热邪内伏、阴虚脉数以及痰湿壅盛者慎用。

2019

五、补气养血剂

3. 人参养荣丸

【药物组成】人参、熟地黄、土白术、茯苓、炙黄芪、五味子（酒蒸）、当归、白芍（麸炒）、肉桂、制远志、陈皮、炙甘草。

【功能】温补气血。

【主治】心脾不足，气血两亏，形瘦神疲，食少便溏，病后虚弱。

【注意事项】阴虚、热盛者慎用；孕妇慎用；服药期间饮食宜选清淡食物。

2019

五、补气养血剂

十全大补丸
OTC
每盒装10丸
佛山冯了性药业有限公司
FOSHAN FENGLIAOXING PHARMACEUTICAL CO.,LTD

五、补气养血剂

4. 十全大补丸（口服液）

【药物组成】熟地黄、党参、炒白术、茯苓、炙黄芪、当归、酒白芍、肉桂、川芎、炙甘草。

【功能】温补气血。

【主治】气血两虚，面色苍白，气短心悸，头晕自汗，体倦乏力，四肢不温，月经量多。

【用法用量】口服。

【注意事项】体实有热、感冒、孕妇慎用。服药期间饮食宜选清淡易消化食物，忌食辛辣、油腻、生冷食物。

2019

五、补气养血剂

维畅舒
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
国药准字 Z20013127
健脾补血颗粒
Jianpi Buxue Keli
义乌天汇商业有限公司

五、补气养血剂

5. 健脾生血颗粒（片）

【药物组成】党参、黄芪、茯苓、炒白术、山药、醋南五味子、山麦冬、醋龟甲、大枣、炒鸡内金、龙骨、煅牡蛎、甘草、硫酸亚铁。

【功能】健脾和胃，养血安神。

【主治】脾胃虚弱及心脾两虚所致的血虚证，症见面色萎黄或㿠白、食少纳呆、脘腹胀闷、大便不调、烦躁多汗、倦怠乏力、舌胖色淡、苔薄白、脉细弱。缺铁性贫血见上述证候者。

2019

五、补气养血剂

【用法用量】口服。

【注意事项】本品含有硫酸亚铁，对胃有刺激性，故宜在饭后服用。

服药期间，忌饮茶，勿与含鞣酸类药物合用；部分患儿可出现牙齿颜色变黑，停药后可逐渐消失。

少数患儿服药后，可见短暂性食欲下降、恶心、呕吐、轻度腹泻，多可自行缓解。

饮食宜清淡，忌食油腻、辛辣食物，要改善饮食，加强营养，合理添加蛋黄、瘦肉、肝、肾、豆类、绿色蔬菜及水果等。

若以本品治疗小儿缺铁性贫血应结合病因治疗。

2019

五、补气养血剂

八珍颗粒

人参归脾丸

人参养荣丸

健脾生血颗粒

2019

六、补气养阴剂

生脉饮

人参固本丸

消渴丸

参芪降糖胶囊

养胃舒胶囊

六、补气养阴剂

1. 生脉饮（胶囊）

【药物组成】红参、麦冬、五味子。

【功能】益气复脉，养阴生津。

【主治】气阴两亏，心悸气短，脉微自汗。

【用法用量】口服。

【注意事项】里实证及表证未解者慎用。忌食辛辣、油腻食物。在治疗期间，心绞痛持续发作者，宜加用硝酸酯类药，若出现剧烈心绞痛、心肌梗死，见气促、汗出、面色苍白者，应及时救治。

2019

六、补气养阴剂

六、补气养阴剂

2. 人参固本丸

【药物组成】人参、熟地黄、地黄、山茱萸（酒炙）、山药、麦冬、天冬、泽泻、牡丹皮、茯苓。

【功能】滋阴益气，固本培元。

【主治】阴虚气弱，虚劳咳嗽，心悸气短，骨蒸潮热，腰痠耳鸣，遗精盗汗，大便干燥。

【用法用量】口服。

【注意事项】外感咳嗽忌用。服药期间，忌辛辣刺激、油腻食物。

2019

六、补气养阴剂

3. 消渴丸

【药物组成】地黄、葛根、黄芪、天花粉、南五味子、山药、玉米须、格列本脲。

【功能】滋肾养阴，益气生津。

【主治】气阴两虚所致的消渴病，症见多饮、多尿、多食、消瘦、体倦乏力、睡眠差、腰痛；2 型糖尿病见上述证候者。

【用法用量】口服。

2019

六、补气养阴剂

【注意事项】阴阳两虚消渴者慎用。体质虚弱、高热、老年患者、有肾上腺皮质功能减退或垂体前叶功能减退者慎用。服药期间，忌食肥甘、辛辣食物，控制饮食，注意合理的饮食结构，忌烟酒。服用本品时禁止加服磺酰脲类抗糖尿病药。服药期间应定期测定血糖、尿糖、尿酮体、尿蛋白、肝肾功能和血象，并进行眼科检查。

【规格】每 10 丸重 2.5g（含格列本脲 5mg）。

六、补气养阴剂

4. 参芪降糖胶囊（颗粒、片）

【药物组成】人参茎叶皂苷、黄芪、山药、麦冬、五味子、枸杞子、覆盆子、地黄、天花粉、茯苓、泽泻。

【功能】益气养阴，健脾补肾。

【主治】气阴两虚所致的消渴病，症见咽干口燥、倦怠乏力、口渴多饮、多食多尿、消瘦；2 型糖尿病见上述证候者。

【注意事项】孕妇禁用。阴阳两虚消渴者慎用。

2019

六、补气养阴剂

玉泉丸

消渴丸

参芪降糖颗粒

六、补气养阴剂

5. 养胃舒胶囊（颗粒）

【药物组成】黄精（蒸）、党参、白术（炒）、山药、菟丝子、北沙参、玄参、乌梅、陈皮、山楂、干姜。

【功能】益气养阴，健脾和胃，行气导滞。

【主治】脾胃气阴两虚所致的胃痛，症见胃脘灼热疼痛、痞胀不适、口干口苦、纳少消瘦、手足心热；慢性胃炎见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】肝胃火盛之吞酸嗳腐者慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣刺激性食物，戒烟酒。

2019

六、补气养阴剂

生脉饮

人参固本丸

消渴丸

参芪降糖胶囊

养胃舒胶囊

2019

七、阴阳双补剂

龟鹿二仙膏

【药物组成】龟甲、鹿角、党参、枸杞子。

【功能】温肾补精，补气养血。

【主治】肾虚精亏所致的腰膝痿软、遗精、阳痿。

【用法用量】口服。

【注意事项】感冒及脾胃虚弱者慎用，阴虚火旺者忌用。

八、补精养血剂

七宝美髯丸（颗粒、口服液）

【药物组成】制何首乌、枸杞子（酒蒸）、菟丝子（炒）、补骨脂（黑芝麻炒）、当归、牛膝（酒蒸）、茯苓。

【功能】滋补肝肾。

【主治】肝肾不足所致的须发早白、遗精早泄、头眩耳鸣、腰痠背痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、脾胃虚弱及感冒者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

第十二节　安神剂

补虚安神剂
天王补心丸
柏子养心丸
枣仁安神液

解郁安神剂
解郁安神颗粒

清火安神剂
朱砂安神丸

一、补虚安神剂

1. 天王补心丸

【药物组成】地黄、天冬、麦冬、玄参、当归、丹参、炒酸枣仁、柏子仁、党参、五味子、茯苓、制远志、石菖蒲、朱砂、桔梗、甘草。

【功能】滋阴养血，补心安神。

【主治】心阴不足，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。

【注意事项】肝肾功能不全者禁用。因其含朱砂，故不宜过量或久服，不可与溴化物、碘化物同服。服药期间，不宜饮用浓茶、咖啡等刺激性饮品。严重心律失常者，需急诊观察治疗。

【用法用量】口服。

2019

一、补虚安神剂

2. 柏子养心丸（片）

【药物组成】炙黄芪、党参、当归、川芎、柏子仁、酸枣仁、制远志、醋五味子、肉桂、茯苓、半夏曲、朱砂、炙甘草。

【功能】补气、养血、安神。

【主治】心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘。

【注意事项】肝肾功能不全者禁用。肝阳上亢及阴虚内热者不宜服。服药期间，应保持精神舒畅，劳逸适度，不宜饮用浓茶、咖啡等兴奋性饮品。因其含朱砂，故不可过量、久用，不可与溴化物、碘化物同服。

【用法用量】口服。

2019

一、补虚安神剂

3. 养血安神丸（片、糖浆）

【药物组成】熟地黄、首乌藤、墨旱莲、合欢皮、仙鹤草、地黄、鸡血藤。

【功能】滋阴养血，宁心安神。

【主治】阴虚血少所致的头眩心悸、失眠健忘。

【用法用量】口服。

【注意事项】脾胃虚弱者慎用。服药期间，不宜饮用浓茶、咖啡等兴奋性饮品，宜保持心情舒畅，劳逸适度。糖尿病患者不宜服用糖浆剂。

2019

一、补虚安神剂

4. 枣仁安神液（颗粒、胶囊）

【药物组成】炒酸枣仁、醋五味子、丹参。

【功能】养血安神。

【主治】心血不足所致的失眠、健忘、心烦、头晕；神经衰弱症见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及胃酸过多者慎用。服药期间，不宜服用咖啡、浓茶等兴奋性饮品。

2019

二、解郁安神剂

解郁安神颗粒

【药物组成】柴胡、郁金、龙齿、炒酸枣仁、制远志、百合、炒白术、茯苓、炒栀子、石菖蒲、胆南星、姜半夏、当归、炙甘草、大枣、浮小麦。

【功能】疏肝解郁，安神定志。

【主治】情志不畅、肝郁气滞所致的失眠、心烦、焦虑、健忘；神经官能症、更年期综合征见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】睡前不宜饮用咖啡、浓茶等兴奋性饮品。须保持心情舒畅。

2019

三、清火安神剂

朱砂安神丸

【药物组成】朱砂、黄连、地黄、当归、甘草。

【功能】清心养血，镇惊安神。

【主治】心火亢盛、阴血不足证，症见心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁、舌尖红、脉细数。

【注意事项】孕妇忌服。心气不足、脾胃虚弱者忌服。因其含朱砂，故不宜过量或久服，以防引起中毒。不宜与碘、溴化物并用，以防产生毒副作用。

【用法用量】口服。丸剂：水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸；片剂：一次 4～5 片；一日 1～2 次。

2019

第十二节　安神剂

补虚安神剂
天王补心丸
柏子养心丸
枣仁安神液

解郁安神剂
解郁安神颗粒

清火安神剂
朱砂安神丸

2019

题目

天王补心丸的功能是补心安神和

A. 补气

B. 疏肝解郁

C. 滋阴养血

D. 清心养血

E. 清热燥湿

2019

题目

心火亢盛、阴血不足之心烦、心悸、失眠者宜用

A. 天王补心丸

B. 养血安神丸

C. 朱砂安神丸

D. 解郁安神颗粒

E. 枣仁安神液

2019

题目

A. 心阴不足，心悸健忘

B. 气滞血瘀所致的胸痹

C. 心火尤盛、阴血不足证

D. 心气虚寒，心悸易惊

E. 阴虚血少所致的头眩心悸

1、柏子养心丸的主治为

2、天王补心丸的主治为

3、朱砂安神丸的主治为

4、血府逐瘀口服液的主治为

2019

第十三节　和解剂

和解少阳剂

小柴胡颗粒（片）

调和肝脾剂

逍遥颗粒

2019

一、和解少阳剂

小柴胡颗粒（片）

【药物组成】柴胡、黄芩、党参、大枣、生姜、姜半夏、甘草。

【功能】解表散热，疏肝和胃。

【主治】外感病邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、 口苦咽干。

【用法用量】口服。

【注意事项】风寒感冒者慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣食物。过敏体质者慎用。

2019

二、调和肝脾剂

1. 逍遥颗粒（丸）

【药物组成】柴胡、当归、白芍、炒白术、茯苓、炙甘草、生姜（大蜜丸中无该药）、薄荷。

【功能】疏肝健脾，养血调经。

【主治】肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。

【用法用量】口服。

【注意事项】肝肾阴虚所致的胁肋胀痛、咽干口燥、舌红少津者慎用。忌辛辣生冷食物，饮食宜清淡。

2019

2. 加味逍遥丸（口服液）

【药物组成】柴胡、栀子（姜炙）、牡丹皮、薄荷、白芍、当归、白术（麸炒）、 茯苓、甘草、生姜。

【功能】疏肝清热，健脾养血。

【主治】肝郁血虚，肝脾不和，两胁胀痛，头晕目眩，倦怠食少，月经不调，脐腹胀痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】脾胃虚寒、脘腹冷痛、大便溏薄者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻食物，并注意调节情志，切忌气恼劳碌。

2019

第十三节　和解剂

德众
OTC
逍遥颗粒
XIAOYAO KELI
疏肝健脾
养血调经
每盒12袋
每袋装15克
盈天医药
WINTEAM
广东环球制药有限公司
GUANGDONG MEDI-WORLD PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

寶林可
BOLLINK
【批准文号】国药准字Z10960067
加味逍遥颗粒
JIAWEIXIAOYAO KELI
【功能主治】
舒肝清热，健脾养血，用于肝郁血虚、
肝脾不和所致的两胁胀痛、头晕目眩、
倦怠食少、月经不调、脐腹胀痛。
2g×8袋
四川宝兴制药有限公司

题目

治疗外感病邪犯少阳者，出现寒热往来，心烦喜呕，胸胁苦满等症的常用中成药是

A. 正柴胡饮颗粒

B. 小柴胡颗粒

C. 午时茶颗粒

D. 参苏丸

题目

以下常用中成药中功能为解表散热，疏肝和胃的是

A. 逍遥丸

B. 小柴胡颗粒

C. 左金丸

D. 加味逍遥丸

E. 正柴胡饮颗粒

2019

第十四节　理气剂

理气疏肝剂

四逆散

左金丸

柴胡舒肝丸

气滞胃痛颗粒

胃苏颗粒

理气和中剂

木香顺气丸

越鞠丸

一、理气疏肝剂

1. 四逆散

【药物组成】柴胡、白芍、枳壳（麸炒）、甘草。

【功能】透解郁热，疏肝理脾。

【主治】肝气郁结所致的胁痛、痢疾，症见脘腹胁痛、热厥手足不温、泻痢下重。

【用法用量】口服。【注意事项】孕妇、肝阴亏虚胁痛、寒厥所致四肢不温者慎用。服药期间，忌恼怒劳累，保持心情舒畅。

2019

一、理气疏肝剂

一、理气疏肝剂

2. 左金丸（胶囊）

【药物组成】黄连、吴茱萸。

【功能】泻火，疏肝，和胃，止痛。

【主治】肝火犯胃，脘胁疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮。

【用法用量】口服。丸剂：一次 3～6g，一日 2 次。胶囊剂：一次 2～4 粒，一日 2 次。饭后服用。15 日为一疗程。

【使用注意】脾胃虚寒胃痛及肝阴不足胁痛者慎用。服药期间，应保持心情舒畅。

2019

一、理气疏肝剂

3. 柴胡舒肝丸

【药物组成】柴胡、青皮（炒）、陈皮、防风、醋香附、麸炒枳壳、木香、乌药、姜半夏、茯苓、桔梗、姜厚朴、紫苏梗、豆蔻、甘草、炒山楂、炒槟榔、六神曲（炒）、酒大黄、酒白芍、当归、醋三棱、醋莪术、黄芩、薄荷。

【功能】疏肝理气，消胀止痛。

【主治】肝气不舒，症见胸胁痞闷、食滞不消、呕吐酸水。

【用法用量】口服。一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】肝胆湿热、脾胃虚弱证者慎用。服药期间，忌郁闷、恼怒，应保持心情舒畅。

2019

一、理气疏肝剂

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
批准文号：国药准字Z20054628
OTC
柴胡舒肝丸
Chai Hu Shu Gan Wan
(小蜜丸)
药都制药集团股份有限公司

逍 遥 丸
360丸
NONGSUOWAN
Xiaoyao
河南省宛西制药股份有限
逍 遥 丸
NONGSUOWAN Xiaoyao Wan
(浓缩丸) 360丸
OTC
产品批号：111101
生产日期：2011.11.09
有效期至：2016.11.08
河南省宛西制药股份有限公司

一、理气疏肝剂

4. 气滞胃痛颗粒（片）

【药物组成】柴胡、香附（炙）、白芍、延胡索（炙）、枳壳、炙甘草。

【功能】疏肝理气，和胃止痛。

【主治】肝郁气滞，胸痞胀满，胃脘疼痛。

【用法用量】口服。颗粒剂：开水冲化。一或 6 片（糖衣片），一日 3 次。

【注意事项】肝胃郁火、胃阴不足所致胃痛者及孕妇慎用。

2019

一、理气疏肝剂

5. 胃苏颗粒

【药物组成】紫苏梗、香附、陈皮、枳壳、槟榔、香橼、佛手、鸡内金（制）。

【功能】理气消胀，和胃止痛。

【主治】气滞型胃脘痛，症见胃脘胀痛、窜及两胁、得嗳气或矢气则舒、情绪郁怒则加重、胸闷食少、排便不畅、舌苔薄白、脉弦；慢性胃炎及消化性溃疡见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 1 袋，一日 3 次，开水冲化。15 天为一疗程，可服1～3 疗程或遵医嘱。

【注意事项】孕妇及脾胃阴虚或肝胃郁火胃痛者慎用。

2019

一、理气疏肝剂

999
批准文号:国药准字Z21021522
OTC
气滞胃痛颗粒
舒肝理气，和胃止痛。
用于肝郁气滞，胸痞胀满，胃脘疼痛。
9袋装

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。
OTC
胃苏颗粒
Weisu Keli
功能主治：
理气消胀，和胃止痛。主治气滞型胃脘痛，症见胃脘胀痛，窜及两胁，得嗳气或矢气则舒，情绪郁怒则加重，胸闷食少，排便不畅及慢性胃炎见上述证候者。
5克×3袋/盒
扬子江药业集团
江苏制药股份有限公司

二、理气和中剂

1. 木香顺气丸（颗粒）

【药物组成】木香、醋香附、厚朴、青皮、枳壳（炒）、槟榔、陈皮、砂仁、苍术（炒）、生姜、甘草。

【功能】行气化湿，健脾和胃。

【主治】湿阻中焦、脾胃不和所致的湿滞脾胃证，症见胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐恶心、嗳气纳呆。

【用法用量】口服。

【使用注意】孕妇及肝胃郁火胃痛、痞满者慎用。

2019

二、理气和中剂

2. 越鞠丸

【药物组成】醋香附、川芎、炒栀子、苍术（炒）、六神曲（炒）。

【功能】理气解郁，宽中除满。

【主治】瘀热痰湿内生所致的脾胃气郁，症见胸脘痞闷、腹中胀满、饮食停滞、嗳气吞酸。

【用法用量】口服。一次 6～9g，一日 2 次。

【注意事项】阴虚火旺者慎用。服药期间，忌忧思恼怒，避免情志刺激。

2019

第十四节　理气剂

理气疏肝剂

四逆散

左金丸

柴胡舒肝丸

气滞胃痛颗粒

胃苏颗粒

理气和中剂

木香顺气丸

越鞠丸

2019

题目

四逆散的功能是透解郁热和

A. 和胃止痛

B. 疏肝理气

C. 消胀止痛

D. 宽中除满

E. 疏肝理脾

2019

题目

肝火犯胃所致的脘胁疼痛宜用

A. 四逆散

B. 养血安神丸

C. 左金丸

D. 九气拈痛丸

E. 胃苏颗粒

2019

题目

具有泻火疏肝、和胃止痛功能的是

A. 左金丸

B. 胃苏颗粒

C. 九气拈痛丸

D. 越鞠丸

E. 木瓜丸

2019

第十五节　活血剂

活血化瘀剂
活血行气剂
益气活血剂
益气养阴活血剂
活血化瘀息剂

一、活血化瘀剂

复方丹参片

丹七片

血塞通颗粒

消栓通络胶囊

逐瘀通脉胶囊

2019

一、活血化瘀剂

1. 复方丹参片

【药物组成】丹参、三七、冰片。

【功能】活血化瘀，理气止痛。

【主治】气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。

【注意事项】孕妇慎用。寒凝血瘀胸痹心痛者不宜使用，脾胃虚寒者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌烟酒、浓茶。治疗期间，如心绞痛持续发作，宜加用硝酸酯类药。如果出现剧烈心绞痛、心肌梗死等，应及时送医院救治。个别人服药后胃脘不适，宜饭后服用。

【用法用量】口服。

2019

一、活血化瘀剂

2. 丹七片

【药物组成】丹参、三七。

【功能】活血化瘀，通脉止痛。

【主治】瘀血痹阻所致的胸痹心痛、眩晕头痛、经期腹痛。

【用法用量】口服。一次 3～5 片，一日 3 次。

【注意事项】孕妇、月经期及有出血倾向者慎用。在治疗期间，心绞痛持续发作，宜加用硝酸酯类药。若出现剧烈心绞痛，心肌梗死，应及时救治。

2019

一、活血化瘀剂

韧可
批准文号：国药准字Z43020014
丹七片
用于
血瘀气滞 心胸痹痛
眩晕头痛 经期腹痛
36片装
湖南德康制药股份有限公司
Hunan Dekang Pharmaceutical Co.,LTD.

日田
复方丹参片
60片装
广西日田药业集团有限责任公司
日田药业
复方丹参片
60

一、活血化瘀剂

3. 血塞通颗粒

【药物组成】三七总皂苷。

【功能】活血祛瘀，通脉活络。

【主治】瘀血阻络所致的中风偏瘫、肢体活动不利、口眼□斜、胸痹心痛、胸闷气憋；中风后遗症及冠心病心绞痛属上述证候者。

【用法用量】开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次。

【注意事项】孕妇慎用。阴虚阳亢或肝阳化风者不宜单用本品。心痛剧烈及持续时间长者，应作心电图及心肌酶学检查，并采取相应的医疗措施。

【规格】每袋 3g，含三七总皂苷 50mg。

2019

一、活血化瘀剂

4. 消栓通络胶囊

【药物组成】川芎、丹参、黄芪、三七、桂枝、郁金、木香、泽泻、槐花、山楂、冰片。

【功能】活血化瘀，温经通络。

【主治】瘀血阻络所致的中风，症见神情呆滞、言语謇涩、手足发凉、肢体疼痛；缺血性中风及高脂血症见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 6 粒，一日 3 次；或遵医嘱。

【注意事项】孕妇、月经期及有出血倾向者慎用。阴虚内热、风火、痰热证者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣、动物油脂食物。

2019

一、活血化瘀剂

5. 逐瘀通脉胶囊

【药物组成】水蛭、虻虫、桃仁、大黄。

【功能】破血逐瘀，通经活络。

【主治】血瘀所致的眩晕，症见头晕、头痛、耳鸣、舌质黯红、脉沉涩；高血压、脑梗死、脑动脉硬化等病见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 2 粒，一日 3 次。

【注意事项】脑出血患者禁用。孕妇、体虚、肝肾功能不全者忌用。脑梗死急性期应与一般综合治疗结合使用。

2019

一、活血化瘀剂

复方丹参片

丹七片

血塞通颗粒

消栓通络胶囊

逐瘀通脉胶囊

2019

二、活血行气剂

血府逐瘀口服液

速效救心丸

冠心苏合滴丸

心可舒胶囊

元胡止痛片

九气拈痛丸

2019

二、活血行气剂

二、活血行气剂

1. 血府逐瘀口服液（胶囊）

【药物组成】炒桃仁、红花、地黄、川芎、赤芍、当归、牛膝、柴胡、桔梗、麸炒枳壳、甘草。

【功能】活血祛瘀，行气止痛。

【主治】气滞血瘀所致的胸痹、头痛日久、痛如针刺而有定处、内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇忌用。气虚血瘀者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻食物。治疗期间，若心痛持续发作，宜加用硝酸酯类药。如出现剧烈心绞痛、心肌梗死，应及时救治。

2019

二、活血行气剂

二、活血行气剂

2. 速效救心丸

【药物组成】川芎、冰片。

【功能】行气活血，祛瘀止痛。增加冠脉血流量，缓解心绞痛。

【主治】气滞血瘀所致的冠心病、心绞痛。

【注意事项】孕妇禁用。气阴两虚、心肾阴虚之胸痹心痛者、有过敏史者及伴中重度心力衰竭的心肌缺血者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌吸烟饮酒、喝浓茶。治疗期间，心绞痛持续发作宜加用硝酸酯类药。如果出现剧烈心绞痛、心肌梗死等，应及时救治。据报道，有服用本品引起偶有引发口腔溃疡、口唇肿胀、急性荨麻疹及全身性皮疹的不良反应，使用时应注意。

【用法用量】含服。

2019

二、活血行气剂

二、活血行气剂

3. 冠心苏合滴丸（丸、软胶囊、胶囊）

【药物组成】苏合香、冰片、乳香（制）、檀香、土木香。

【功能】理气，宽胸，止痛。

【主治】寒凝气滞、心脉不通所致的胸痹，症见胸闷、心前区疼痛；冠心病心绞痛见上述证候者。

【注意事项】孕妇禁用。阴虚血瘀之胸痹忌用。

【用法用量】口服。

2019

二、活血行气剂

4. 心可舒胶囊（片）

【药物组成】丹参、葛根、三七、山楂、木香。

【功能】活血化瘀，行气止痛。

【主治】气滞血瘀引起的胸闷、心悸、头晕、头痛、颈项疼痛；冠心病心绞痛、高血脂、高血压、心律失常见上述证候者。

【注意事项】气虚血瘀、痰瘀互阻之胸痹、心悸者不宜单用。

【用法用量】口服。

2019

二、活血行气剂

太极 独圣
OTC
元胡止痛片
Yuanhu Zhitong Pian
√【功能主治】理气，活血，止痛。用于气滞血瘀所致的胃痛，胁痛，头痛及痛经。
√【批准文号】国药准字Z51020453
太极集团四川绵阳制药有限公司
4×15片/板/盒

九气拈痛丸
Jiuqi Niantong Wan
北京同仁堂 制药有限公司

二、活血行气剂

5. 元胡止痛片（颗粒、胶囊、口服液、滴丸）

【药物组成】醋延胡索、白芷。

【功能】理气，活血，止痛。

【主治】气滞血瘀所致的胃痛、胁痛、头痛及痛经。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及胃阴不足者慎用。

2019

二、活血行气剂

6. 九气拈痛丸

【药物组成】醋延胡索、醋香附、木香、陈皮、郁金、醋莪术、五灵脂（醋炒）、高良姜、槟榔、甘草。

【功能】理气，活血，止痛。

【主治】气滞血瘀所致的胸胁胀满疼痛、痛经。

【用法用量】口服。一次 6～9g，一日 2 次。 笔记区

【注意事项】孕妇禁用。胃热引起的胃痛慎用。服药期间忌食生冷、辛辣、油腻食物，戒烟酒。

2019

二、活血行气剂

血府逐瘀口服液

速效救心丸

冠心苏合滴丸

心可舒胶囊

元胡止痛片

九气拈痛丸

2019

三、益气活血剂

麝香保心丸

消栓胶囊

通心络胶囊

诺迪康胶囊

2019

三、益气活血剂

三、益气活血剂

1. 麝香保心丸

【药物组成】人工麝香、人参提取物、肉桂、苏合香、蟾酥、人工牛黄、冰片。

【功能】芳香温通，益气强心。

【主治】气滞血瘀所致的胸痹，症见心前区疼痛、固定不移；心肌缺血所致的心绞痛、心肌梗死见上述证候者。

【注意事项】孕妇忌用。不宜与洋地黄类药物同用。心绞痛持续发作，服药后不能缓解时应加用硝酸甘油等药物。如出现剧烈心绞痛、心肌梗死，应及时救治。

【用法用量】口服。一次 1～2 丸，一日 3 次。

2019

三、益气活血剂

2. 消栓胶囊（口服液）

【药物组成】黄芪、当归、赤芍，川芎、红花、桃仁、地龙。

【功能】补气活血通络。

【主治】中风气虚血瘀证，症见半身不遂、口舌□斜、言语謇涩、气短乏力、面色㿠白；缺血性中风见上述证候者。

【注意事项】孕妇禁服。

【用法用量】口服。

三、益气活血剂

以岭
通心络胶囊
TONGXINLUOJIAONANG
【功能主治】益气活血，通络止痛。用于冠心病心绞痛属心气虚乏、血瘀络阻证，症见胸部憋闷，刺痛、绞痛，固定不移，心悸自汗，气短乏力，舌质紫暗或有瘀斑，脉细涩或结代。亦用于气虚血瘀络阻型中风病，症见半身不遂或偏身麻木，口舌歪斜，言语不利。
石家庄以岭药业股份有限公司
通心络胶囊
石家庄以岭药业股份有限公司

三、益气活血剂

3. 通心络胶囊

【药物组成】人参、水蛭、土鳖虫、赤芍、乳香（制）、降香、全蝎、蜈蚣、檀香、冰片、蝉蜕、酸枣仁（炒）。

【功能】益气活血，通络止痛。

【主治】心气虚乏、血瘀络阻证所致的冠心病心绞痛，症见胸部憋闷、刺痛、绞痛、固定不移、心悸自汗、气短乏力、舌质紫黯或有瘀斑、脉细涩或结代。亦用于气虚血瘀络阻型中风病，症见半身不遂或偏身麻木、口舌□斜、言语不利。

【注意事项】孕妇忌用，不宜多服、久服。

【用法用量】口服。

2019

三、益气活血剂

诺迪康胶囊
功能主治：益气活血 通脉止痛
·用于气虚血瘀所致胸痹，症见胸闷、刺痛或隐痛、心悸气短、神疲乏力、少气懒言、头晕目眩；冠心病心绞痛见上述证候者。
委托单位：西藏诺迪康药业股份有限公司
注册地址：西藏拉萨市北京中路93号
受托单位：四川诺迪康威光制药有限公司
生产地址：四川省广汉市向阳镇
20粒/盒
诺迪康胶囊

三、益气活血剂

4. 诺迪康胶囊

【药物组成】圣地红景天。

【功能】益气活血，通脉止痛。

【主治】气虚血瘀所致胸痹，症见胸闷、刺痛或隐痛、心悸气短、神疲乏力、少气懒言、头晕目眩；冠心病心绞痛见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 1～2 粒，一日 3 次。

【注意事项】孕妇及月经期妇女慎用。治疗期间，心绞痛持续发作，宜加用硝酸酯类药。若出现剧烈心绞痛、心肌梗死，应及时救治。

2019

三、益气活血剂

麝香保心丸

消栓胶囊

通心络胶囊

诺迪康胶囊

2019

四、益气养阴活血剂

稳心颗粒

参松养心胶囊

益心舒胶囊

2019

四、益气养阴活血剂

1. 稳心颗粒

【药物组成】黄精、党参、三七、琥珀、甘松。

【功能】益气养阴，活血化瘀。

【主治】气阴两虚、心脉瘀阻所致的心悸，症见心悸不宁、气短乏力、胸闷胸痛；室性早搏、房性早搏见上述证候者。

【用法用量】开水冲服。

【注意事项】孕妇慎用。服药期间，忌食生冷食物，忌烟酒、浓茶。用药时应将药液充分搅匀，勿将杯底药粉丢弃。危重病人应采取综合治疗方法。

2019

四、益气养阴活血剂

2. 参松养心胶囊

【药物组成】人参、麦冬、南五味子、山茱萸、酸枣仁（炒）、桑寄生、丹参、

赤芍、土鳖虫、甘松、黄连、龙骨。

【功能】益气养阴，活血通络，清心安神。

【主治】治疗冠心病室性早搏属气阴两虚，心络瘀阻证，症见心悸不安、气短乏力、动则加剧、胸部闷痛、失眠多梦、盗汗、神倦、懒言。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇慎用。

2019

四、益气养阴活血剂

3. 益心舒胶囊

【药物组成】人参、黄芪、丹参、麦冬、五味子、川芎、山楂。

【功能】益气复脉，活血化瘀，养阴生津。

【主治】气阴两虚，瘀血阻脉所致的胸痹，症见胸痛胸闷、心悸气短、脉结代；冠心病心绞痛见上述证候者。

【注意事项】孕妇及月经期妇女慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。心绞痛持续发作及严重心律失常者，应及时救治。

2019

四、益气养阴活血剂

稳心颗粒

参松养心胶囊

益心舒胶囊

2019

五、活血化瘀息风剂

人参再造丸

华佗再造丸

抗栓再造丸

2019

五、活血化瘀息风剂

1. 人参再造丸

【功能】益气养血，祛风化痰，活血通络。

【主治】气虚血瘀、风痰阻络所致的中风，症见口眼□斜、半身不遂、手足麻木、疼痛、拘挛、言语不清。

【用法用量】口服。一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】本品所含朱砂有毒，故孕妇禁用，不宜过量或长期服用。肝阳上亢、肝风内动所致中风及风湿热痹者慎用。

2019

五、活血化瘀息风剂

2. 华佗再造丸

【药物组成】川芎、吴茱萸、冰片等。

【功能】活血化瘀，化痰通络，行气止痛。

【主治】痰瘀阻络之中风恢复期和后遗症，症见半身不遂、拘挛麻木、口眼□斜、言语不清。

2019

五、活血化瘀息风剂

3. 抗栓再造丸

【功能】活血化瘀，舒筋通络，息风镇痉。

【主治】瘀血阻窍、脉络失养所致的中风，症见手足麻木、步履艰难、瘫痪、口眼歪斜、言语不清；中风恢复及后遗症见上述证候者。

【注意事项】本品所含朱砂、土鳖虫、全蝎、水蛭等有毒，故孕妇禁用，不宜过量或久用。

2019

题目

血府逐瘀口服液的君药是红花和

A. 延胡索

B. 川芎

C. 丹参

D. 黄芪

E. 桃仁

2019

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

第十六节　止血剂

凉血止血剂

槐角丸

化瘀止血剂

三七片

止血定痛片

一、凉血止血剂

槐角丸

【药物组成】槐角（炒）、地榆炭、防风、黄芩、当归、枳壳（炒）。

【功能】清肠疏风，凉血止血。

【主治】血热所致的肠风便血、痔疮肿痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】虚寒性便血者、体弱年迈者、慎用。服药期间，忌食辛辣油腻食物。若痔疮便血，肿痛严重和便血呈喷射状者，应及时采取综合急救措施。

2019

二、化瘀止血剂

1. 三七片

【药物组成】三七。

【功能】散瘀止血，消肿止痛。

【主治】出血兼瘀血证，症见咯血、吐血、衄血、便血、崩漏、外伤出血、胸腹刺痛、跌仆肿痛。

【用法用量】口服。小片：一次 4～12 片，大片：一次 2～6 片，一日 3 次。

【注意事项】孕妇忌用。服药期间，忌食生冷、油腻、辛辣食物。出血量大者应立即采取综合急救措施。用本品治疗软组织损伤时，可配合外用正红花油等活血之品，以增疗效。

2019

二、化瘀止血剂

2. 止血定痛片

【药物组成】煅花蕊石、三七、海螵蛸、甘草。

【功能】散瘀，止血，止痛。

【主治】十二指肠溃疡疼痛、出血，胃酸过多。

【用法用量】口服。一次 6 片，一日 3 次。

【注意事项】孕妇慎用。服药期间，忌食生冷、油腻、辛辣食物。出血量大者应采取相应急救措施。

2019

二、化瘀止血剂

二、化瘀止血剂

槐角丸的功能是

A. 清肠疏风，凉血止血

B. 清热凉血，止血

C. 清肠疏风，化瘀止血

D. 散瘀止血，消肿止痛

E. 凉血止血，消肿止痛

2019

第十七节　消导剂

消积导滞剂

保和丸

枳实导滞丸

六味安消散

健脾消食剂

开胃健脾丸

2019

一、消积导滞剂

1. 保和丸

【药物组成】焦山楂、六神曲（炒）、炒莱菔子、炒麦芽、半夏（制）、陈皮、茯苓、连翘。

【功能】消食，导滞，和胃。

【主治】食积停滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不欲饮食。

【用法用量】口服。

【注意事项】服药期间，宜进清淡易消化饮食，忌暴饮暴食及食油腻食物。

2019

一、消积导滞剂

2. 枳实导滞丸

【药物组成】枳实（炒）、大黄、六神曲（炒）、黄芩、黄连（姜汁炒）、茯苓、白术（炒）、泽泻。

【功能】消积导滞，清利湿热。

【主治】饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结、痢疾里急后重。

【用法用量】口服。

【注意事项】虚寒痢疾者慎用。孕妇慎用。久病正虚、年老体弱宜慎用。饮食宜清淡，忌食辛辣刺激性食物，忌暴饮暴食及偏食。

2019

一、消积导滞剂

3. 六味安消散（胶囊）

【药物组成】藏木香、大黄、山柰、北寒水石（煅）、诃子、碱花。

【功能】和胃健脾，消积导滞，活血止痛。

【主治】脾胃不和、积滞内停所致的胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇忌服。脾胃虚寒的胃痛、便秘及热结血瘀痛经者慎用。妇女月经期、妊娠期慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣刺激性食物，戒烟酒。

2019

二、健脾消食剂

开胃健脾丸

【药物组成】白术、党参、茯苓、山药、炒六神曲、炒麦芽、山楂、木香、砂仁、陈皮、煨肉豆蔻、黄连、炙甘草。

【功能】健脾和胃。

【主治】脾胃虚弱、中气不和所致的泄泻、痞满，症见食欲不振、嗳气吞酸、腹胀泄泻；消化不良见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 6～9g，一日 2 次。

【注意事项】湿热痞满、泄泻者不宜使用。忌食生冷、油腻、不易消化食物。

2019

第十七节　消导剂

消积导滞剂

保和丸

枳实导滞丸

六味安消散

健脾消食剂

开胃健脾丸

2019

题目

食积停滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸应选用

A. 保和丸

B. 枳实导滞丸

C. 血府逐瘀口服液

D. 六味安消散

E. 抗栓再造丸

2019

题目

A. 中风气虚血瘀证

B. 食积停滞之脘腹胀满、嗳腐吞酸

C. 饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛

D. 血热所致的肠风便血宜用

E. 脾胃不和、积滞内停之胃痛胀满

1、保和丸的主治是

2、六味安消散的主治是

3、枳实导滞丸的主治是

2019

第十八节　治风剂

祛除外风剂

川芎茶调散

芎菊上清丸

平肝息风剂

天麻钩藤饮颗粒

脑立清丸

松龄血脉康胶囊

第十八节　治风剂

德众
DEZHONG
OTC
川芎茶调颗粒
每盒装6袋
功能主治
疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒、发热、鼻塞
国药集团德众（佛山）药业有限公司
Sinopharm Group Dezhong (Foshan) Pharmaceutical Co., Ltd.

一、祛除外风剂

1. 川芎茶调散（丸、颗粒、口服液、袋泡剂）

【药物组成】川芎、羌活、白芷、荆芥、薄荷、防风、细辛、甘草。

【功能】疏风止痛。

【主治】外感风邪所致的头痛，或有恶寒、发热、鼻塞。

【用法用量】口服。

【注意事项】久病气虚、血虚、肝肾不足、肝阳上亢头痛、孕妇均慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

一、祛除外风剂

2. 芎菊上清丸

【药物组成】菊花、川芎、连翘、薄荷、炒蔓荆子、黄芩、栀子、黄连、羌活、藁本、防风、白芷、荆芥穗、桔梗、甘草。

【功能】清热解表，散风止痛。

【主治】外感风邪引起的恶风身热、偏正头痛、鼻流清涕、牙疼喉痛。

【注意事项】肝火上攻、风阳上扰头痛者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

2019

一、祛除外风剂

一、祛除外风剂

3. 正天丸（胶囊）

【药物组成】川芎、当归、桃仁、红花、鸡血藤、附片、麻黄、白芷、防风、独活、羌活、细辛、钩藤、地黄、白芍。

【功能】疏风活血，养血平肝，通络止痛。

【主治】外感风邪、瘀血阻络、血虚失养、肝阳上亢引起的偏头痛、紧张性头痛、神经性头痛、颈椎病型头痛、经前头痛。

【注意事项】婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女、肾功能不全及对本品过敏者禁用。高血压、心脏病患者及过敏体质者慎用。不宜过量或长期服用。宜饭后服用。服药期间，忌烟酒及辛辣、油腻食物。

2019

二、平肝息风剂

天麻钩藤颗粒

脑立清丸

松龄血脉康胶囊

2019

二、平肝息风剂

1. 天麻钩藤颗粒

【药物组成】天麻、钩藤、石决明、栀子、黄芩、牛膝、盐杜仲、益母草、桑寄生、首乌藤、茯苓。

【功能】平肝息风，清热安神。

【主治】肝阳上亢所致的头痛、眩晕、耳鸣、眼花、震颤、失眠；高血压病见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】血虚头痛者、阴虚动风者忌用。服药期间，饮食宜清淡，戒恼怒，节房事。

2019

二、平肝息风剂

2. 脑立清丸（胶囊）

【药物组成】磁石、珍珠母、赭石、猪胆汁（或猪胆粉）、冰片、薄荷脑、清半夏、牛膝、熟酒曲、酒曲。

【功能】平肝潜阳，醒脑安神。

【主治】肝阳上亢所致的头晕目眩、耳鸣口苦、心烦难寐；高血压见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及体弱虚寒者忌用。肾精亏虚所致头晕、耳鸣者，体弱、虚寒者慎用。服药期间，忌食寒凉、油腻食物。

2019

二、平肝息风剂

3. 松龄血脉康胶囊

【药物组成】鲜松叶、葛根、珍珠层粉。

【功能】平肝潜阳，镇心安神。

【主治】肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压及原发性高脂血症见上述证候者。

【注意事项】气血不足证者慎用。服药期间忌食辛辣、油腻食物。戒烟酒。

2019

题目

肝阳上亢所致的头痛宜用

A. 脑立清丸

B. 天麻钩藤颗粒

C. 川芎茶调散

D. 芎菊上清丸

E. 正天丸

2019

题目

外感风邪所致的头痛，伴有恶寒、发热、鼻塞宜用

A. 四逆散

B. 正天丸

C. 川芎茶调散

D. 天麻钩藤饮

E. 脑立清丸

2019

第十九节　祛湿剂

清利消肿剂

利尿通淋剂

清利肝胆剂

清热燥湿止泻剂

温化水湿剂

2019

一、清利消肿剂

国药准字Z42021945
康复牌
肾炎四味片
Shenyan Siwei Pian
（薄膜衣片）
湖北亿雄祥瑞药业有限公司出品

TAIYANG
国药准字Z109400029
肾炎康复片
0.3g X72
天津同仁堂股份有限公司
TIAN JIN TONG REN TANG CO.,LTD.

一、清利消肿剂

1. 肾炎四味片

【药物组成】细梗胡枝子、石韦、黄芩、黄芪。

【功能】清热利尿，补气健脾。

【主治】湿热内蕴兼气虚所致的水肿，症见浮肿、腰痛、乏力、小便不利；慢性肾炎见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇禁用。脾肾阳虚或风水水肿者慎用。服药期间，宜低盐、低脂饮食，忌食辛辣食物。

2019

一、清利消肿剂

2. 肾炎康复片

【药物组成】人参、西洋参、山药、黑豆、地黄、杜仲（炒）、土茯苓、白花蛇舌草、泽泻、白茅根、丹参、益母草、桔梗。

【功能】益气养阴，健脾补肾，清解余毒。

【主治】气阴两虚，脾肾不足，水湿内停所致的体虚浮肿、症见神疲乏力、腰膝酸软、面目四肢浮肿、头晕耳鸣；慢性肾炎、蛋白尿、血尿见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及急性肾炎所致的水肿慎用。服药期间，宜低盐饮食，忌烟酒及辛辣油腻食物，禁房事。

2019

二、利尿通淋剂

八正合剂

癃闭舒胶囊

三金片

排石颗粒

癃清片

2019

二、利尿通淋剂



二、利尿通淋剂

1. 八正合剂

【药物组成】川木通、车前子（炒）、瞿麦、萹蓄、滑石、灯心草、栀子、大黄、甘草。

【功能】清热，利尿，通淋。

【主治】湿热下注所致的淋证，症见小便短赤、淋沥涩痛、口燥咽干等。

【用法用量】口服。一次 15～20ml，一日 3 次，用时摇匀。

【注意事项】孕妇禁用。

2019

二、利尿通淋剂

2. 癃闭舒胶囊

【药物组成】补骨脂、益母草、金钱草、海金沙、琥珀、山慈菇。

【功能】益肾活血，清热通淋。

【主治】肾气不足、湿热瘀阻所致的癃闭，症见腰膝酸软、尿频、尿急、尿痛、尿线细，伴小腹拘急疼痛；前列腺增生症见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、出血证、有肝肾功能损害者禁用。肺热壅盛、肝郁气滞、脾虚气陷所致的癃闭慎用。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物及饮酒。有慢性肝脏疾病者慎用。

2019

二、利尿通淋剂

3. 三金片（颗粒、胶囊）

【药物组成】菝葜、金沙藤、金樱根、羊开口、积雪草。

【功能】清热解毒，利湿通淋，益肾。

【主治】下焦湿热所致的热淋，症见小便短赤、淋沥涩痛、尿急频数；急慢性肾盂肾炎、膀胱炎、尿路感染见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】淋证属于肝郁气滞或脾肾两虚者慎用。服药期间，忌烟酒及辛辣、油腻食物，宜多饮水，避免劳累。

2019

二、利尿通淋剂

4. 排石颗粒

【药物组成】连钱草、盐车前子、苘麻子、木通、石韦、瞿麦、滑石、徐长卿、忍冬藤、甘草。

【功能】清热利水，通淋排石。

【主治】下焦湿热所致的石淋，症见腰腹疼痛、排尿不畅或伴有血尿；泌尿系统结石见上述证候者。

【用法用量】开水冲服。一次 1 袋，一日 3 次；或遵医嘱。

【注意事项】孕妇禁用。

2019

二、利尿通淋剂

5. 癃清片（胶囊）

【药物组成】泽泻、车前子、黄柏、黄连、败酱草、金银花、牡丹皮、白花蛇舌草、赤芍、仙鹤草。

【功能】清热解毒，凉血通淋。

【主治】下焦湿热所致的热淋，症见尿频、尿急、尿痛、腰痛、小腹坠胀。亦用于慢性前列腺炎之湿热蕴结兼瘀血证，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热，会阴少腹腰骶部疼痛或不适等。

【用法用量】口服。

【注意事项】体虚胃寒者不宜服用。淋证属于肝郁气滞或脾肾两虚，膀胱气化不行者不宜使用。肝郁气滞，脾虚气陷，肾阳衰惫，肾阴亏耗所致癃闭不宜。

2019

二、利尿通淋剂

八正合剂

癃闭舒胶囊

三金片

排石颗粒

癃清片

2019

三、清肝利胆剂

茵栀黄口服液

茵陈五苓丸

清炎利胆片

2019

三、清肝利胆剂

1. 茵栀黄口服液

【药物组成】茵陈提取物、栀子提取物、黄芩提取物（以黄芩苷计）、金银花提取物。

【功能】清热解毒，利湿退黄。

【主治】肝胆湿热所致的黄疸，症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤；急、慢性肝炎见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】阴黄者不宜使用。服药期间，忌饮酒，忌食辛辣油腻食物。

2019

三、清肝利胆剂

2. 茵陈五苓丸

【药物组成】茵陈、茯苓、白术（炒）、泽泻、猪苓、肉桂。

【功能】清湿热，利小便。

【主治】肝胆湿热、脾肺郁结所致的黄疸，症见身目发黄、脘腹胀满、小便不利。

【用法用量】口服。一次 6g，一日 2 次。

【注意事项】孕妇慎用。服药期间，忌饮酒，忌食辛辣、油腻食物。

2019

三、清肝利胆剂

三、清肝利胆剂

3. 消炎利胆片（胶囊、颗粒）

【药物组成】溪黄草、穿心莲、苦木。

【功能】清热，祛湿，利胆。

【主治】肝胆湿热所致的胁痛、口苦；急性胆囊炎、胆管炎见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇慎用。脾胃虚寒者慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣食物，并戒酒。用治急性胆囊炎感染时，应密切观察病情变化，若发热、黄疸、上腹痛等症加重则须及时请外科诊治。因所含苦木有一定毒性，故不宜久服。

2019

三、清肝利胆剂

茵栀黄口服液

茵陈五苓丸

清炎利胆片

2019

四、清热燥湿止泻剂

1. 香连丸（片）

【药物组成】萸黄连、木香。

【功能】清热化湿，行气止痛。

【主治】大肠湿热所致的痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛；肠炎、细菌性痢疾见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】寒湿及虚寒下痢者慎用。服药期间，忌食生冷油腻、辛辣刺激性食物。

2019

四、清热燥湿止泻剂

2. 香连化滞丸

【药物组成】黄连、黄芩、木香、枳实（麸炒）、陈皮、青皮（醋炙）、厚朴（姜炙）、槟榔（炒）、滑石、当归、白芍（炒）、甘草。

【功能】清热利湿，行血化滞。

【主治】大肠湿热所致的痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛。

【用法用量】口服。一次 2 丸，一日 2 次。

【注意事项】孕妇、寒湿或虚寒下痢者慎用。服药期间，忌食生冷油腻、辛辣刺激性食物。

2019

四、清热燥湿止泻剂

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
香连片
（薄膜衣片）
连乡
30片装
湖北香连药业有限责任公司

国药准字Z20025245
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
汉王
香连化滞丸
XIANGLIANHUAZHIWAN
清热利湿○行血化滞。
用于湿热凝滞引起的里急后重，
腹痛下痢。
6克/袋×10袋
PACKING
陕西天祥制药有限责任公司

五、温化水湿剂

1. 五苓散（片）

【药物组成】泽泻、茯苓、猪苓、炒白术、肉桂。

【功能】温阳化气，利湿行水。

【主治】阳不化气、水湿内停所致的水肿，症见小便不利、水肿腹胀、呕逆泄泻、渴不思饮。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇慎用。湿热下注，气滞水停，风水泛溢所致的水肿者慎用。因痰热犯肺、湿热下注或阴虚津少所致之喘咳、泄泻、小便不利不宜使用。服药期间，不宜进食辛辣、油腻和煎炸类食物。

2019

五、温化水湿剂

2. 萆薢分清丸

【药物组成】粉萆薢、盐益智仁、乌药、石菖蒲、甘草。

【功能】分清化浊，温肾利湿。

【主治】肾不化气、清浊不分所致的白浊、小便频数。

【用法用量】口服。一次 6～9g，一日 2 次。

【注意事项】膀胱湿热壅盛所致小便白浊及尿频、淋沥涩痛者忌用。服药期间，忌食油腻、茶、醋及辛辣刺激食物。

2019

题目

香连丸的功能是清热化湿和

A. 行血化滞

B. 行气止痛

C. 温阳化气

D. 分清化浊

E. 疏肝理气

2019

题目

湿热下注所致的淋证宜用

A. 八正合剂

B. 肾炎四味片

C. 九气拈痛丸

D. 癃闭舒胶囊

E. 三金片

2019

题目

A. 清热解毒、利湿通淋、益肾

B. 清热利尿、补气健脾

C. 清湿热、利小便

D. 温阳化气、利湿行水

E. 疏风散寒、解表清热

1、茵陈五苓丸的功能是

2、肾炎四味片的功能是

3、五苓散的功能是

4、三金片的功能是

2019

第二十节　蠲痹剂

祛寒通痹剂

清热通痹剂

活血通痹剂

补虚通痹剂

一、祛寒通痹剂

1. 小活络丸

【药物组成】制川乌、制草乌、乳香（制）、没药（制）、胆南星、地龙。

【功能】祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。

【主治】风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛、或冷痛、或刺痛、或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。

【用法用量】口服。

【注意事项】所含制川乌、制草乌有大毒，故孕妇禁用，不可过量或久服。湿热瘀阻或阴虚有热者、脾胃虚弱者慎用。据报道，有服用本品引起心律失常、药疹、急性胃黏膜出血的不良反应，使用时应引起注意。

2019

一、祛寒通痹剂

2. 木瓜丸

【药物组成】制川乌、制草乌、白芷、海风藤、威灵仙、木瓜、鸡血藤、川芎、当归、人参、狗脊（制）、牛膝。

【功能】祛风散寒，除湿通络。

【主治】风寒湿闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、肿胀、屈伸不利、局部恶风寒、肢体麻木、腰膝酸软。

【用法用量】口服。一次 30 丸，一日 2 次。

【注意事项】所含制川乌、制草乌有大毒，故孕妇禁用，不可过量或久服。风湿热痹者慎用。据报道，有服用本品引起致心律失常、紫癜性胃炎等不良反应，使用时应引起注意

2019

一、祛寒通痹剂

3. 风湿骨痛丸（胶囊）

【药物组成】制川乌、制草乌、麻黄、红花、木瓜、乌梅、甘草。

【功能】温经散寒，通络止痛。

【主治】寒湿闭阻经络所致的痹病，症见腰脊疼痛、四肢关节冷痛；风湿性关节炎见上述证候者。

【用法用量】口服。水丸：一次 10～15 粒，一日 2 次。胶囊剂：一次 2～4 粒，一日 2 次。

【注意事项】所含制川乌、制草乌有大毒，故孕妇禁用，不可过量或久服。阴虚火旺或湿热痹痛者慎用。

2019

一、祛寒通痹剂

小活络丸

木瓜丸

风湿骨痛丸

2019

二、清热通痹剂

1. 四妙丸

【药物组成】盐黄柏、苍术、薏苡仁、牛膝。

【功能】清热利湿。

【主治】湿热下注所致的痹病，症见足膝红肿、筋骨疼痛。

【用法用量】口服。一次 6g，一日 2 次。

【注意事项】风寒湿痹、虚寒痿证及孕妇慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌饮酒，忌食鱼腥、辛辣食物。

2019

二、清热通痹剂

2. 痛风定胶囊

【药物组成】秦艽、黄柏、川牛膝、延胡索、赤芍、泽泻、车前子、土茯苓。

【功能】清热祛湿，活血通络定痛。

【主治】湿热瘀阻所致的痹病，症见关节红肿热痛、伴有发热、汗出不解、口渴心烦、小便黄、舌红苔黄腻、脉滑数；痛风见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 4 粒，一日 3 次。

【注意事项】孕妇慎用。风寒湿痹者慎用。因含土茯苓，故服药后不宜立即饮茶。服药期间，宜食清淡食品，忌食肉类、鱼虾、豆类、辛辣之品，忌饮酒。

2019

三、活血通痹剂

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
OTC
颈复康颗粒
Jingfukang Keli
批准文号：国药准字Z13022204
功能主治：
活血通络，散风止痛，用于风湿痹阻所致的颈椎病，
症见头晕、颈项僵硬、肩背酸痛、手臂麻木。
JFKPG
颈复康药业集团有限公司

三、活血通痹剂

1. 颈复康颗粒

【药物组成】羌活、川芎、葛根、秦艽、威灵仙、苍术、丹参、白芍、地龙（酒炙）、红花、乳香（制）、黄芪、党参、地黄、石决明、花蕊石（煅）、黄柏、王不留行（炒）、桃仁（去皮）、没药（制）、土鳖虫（酒炙）。

【功能】活血通络，散风止痛。

【主治】风湿瘀阻所致的颈椎病，症见头晕、颈项僵硬、肩背酸痛、手臂麻木。

【用法用量】开水冲服。

【注意事项】孕妇忌服。消化道溃疡、肾性高血压患者慎服。服药期间，忌生冷、油腻食物。有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

2019

四、补虚通痹剂

独活寄生合剂

天麻丸

仙灵骨葆胶囊

尪痹颗粒

壮腰健肾丸

2019

四、补虚通痹剂

1. 独活寄生合剂

【药物组成】独活、桑寄生、防风、秦艽、桂枝、细辛、川牛膝、盐杜仲、当归、白芍、熟地黄、川芎、党参、茯苓、甘草。

【功能】养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾。

【主治】风寒湿闭阻、肝肾两亏、气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛、屈伸不利。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇慎用。热痹忌用。

2019

四、补虚通痹剂

2. 天麻丸（片）

【药物组成】天麻、羌活、独活、粉萆薢、盐杜仲、牛膝、附子（制）、当归、地黄、玄参。

【功能】祛风除湿，通络止痛，补益肝肾。

【主治】风湿痹阻、肝肾不足所致的痹病，症见肢体拘挛、手足麻木、腰腿酸痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】所含附子有毒，故孕妇慎用。湿热痹者慎用。服药期间，忌食生冷油腻食物。

2019

四、补虚通痹剂

四、补虚通痹剂

3. 仙灵骨葆胶囊

【药物组成】淫羊藿、续断、补骨脂、丹参、知母、地黄。

【功能】滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨。

【主治】肝肾不足，瘀血阻络所致的骨质疏松症，症见腰脊疼痛、足膝酸软、乏力。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及肝功能失代偿者禁用。对本品过敏者禁用。过敏体质、湿热痹者慎用。高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者慎用。感冒时不宜服用。服药期间，忌食生冷油腻食物。

2019

四、补虚通痹剂

4. 尪痹颗粒（片）

【药物组成】熟地黄、地黄、续断、淫羊藿、骨碎补、狗脊（制）、羊骨、附片（黑顺片）、独活、桂枝、防风、伸筋草、威灵仙、红花、皂角刺、知母、白芍。

【功能】补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络。

【主治】肝肾不足、风湿痹阻所致的尪痹，症见肌肉、关节疼痛、局部肿大、 僵硬畸形、屈伸不利、腰膝酸软、畏寒乏力；类风湿关节炎见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】本品温补行散，所含附子有毒，故孕妇禁用，湿热实证者慎用。服药期间，忌食生冷食物。

2019

四、补虚通痹剂

5. 壮腰健肾丸（口服液）

【药物组成】狗脊、桑寄生、黑老虎、牛大力、菟丝子（盐制）、千斤拔、女贞子、金樱子、鸡血藤。

【功能】壮腰健肾，祛风活络。

【主治】肾亏腰痛，风湿骨痛，症见膝软无力、小便频数。

【用法用量】口服。

【注意事项】风湿热痹者慎用。

2019

题目

痰瘀阻络所致的痹病宜选用

A. 小活络丸

B. 木瓜丸

C. 风湿骨痛丸

D. 四妙丸

E. 天麻丸

2019

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

第二章　外科、皮肤科常用中成药

第一节　治疮疡剂

解毒消肿剂

生肌敛疮剂

清热消痤剂

2019

一、解毒消肿剂

一、解毒消肿剂

1. 连翘败毒丸

【药物组成】金银花、连翘、蒲公英、紫花地丁、大黄、栀子、黄芩、黄连、黄柏、苦参、白鲜皮、木通、防风、白芷、蝉蜕、荆芥穗、羌活、麻黄、薄荷、柴胡、天花粉、玄参、浙贝母、桔梗、赤芍、当归、甘草。

【功能】清热解毒，消肿止痛。

【主治】热毒蕴结肌肤所致的疮疡，症见局部红肿热痛、未溃破者。

【用法用量】口服。水丸一次 6g，一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。疮疡属阴证者慎用。肝功能不良者须在医生指导下使用。忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

2019

一、解毒消肿剂

2. 牛黄醒消丸

【药物组成】牛黄、麝香、乳香（制）、没药（制）、雄黄。

【功能】清热解毒，活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】热毒郁滞、痰瘀互结所致的痈疽发背、瘰疬流注、乳痈乳岩、无名肿毒。

【用法用量】用黄酒或温开水送服。水丸一次 3g，一日 1～2 次。患在上部，临睡前服；患在下部，空腹时服。

【注意事项】孕妇禁用。疮疡阴证者禁用。脾胃虚弱、身体虚者慎用。不宜长期使用。若用药后出现皮肤过敏反应应及时停用。忌食辛辣、油腻、食物及海鲜等发物。

2019

3. 如意金黄散

【药物组成】黄柏、大黄、姜黄、白芷、天花粉、陈皮、厚朴，苍术、生天南星、甘草。

【功效】清热解毒，消肿止痛。

【主治】热毒瘀滞肌肤所致疮疡肿痛、丹毒流注，症见肌肤红、肿、热、痛，亦可用于跌打损伤。

【用法用量】外用。红肿，烦热，疼痛，用清茶调敷；漫肿无头，用醋或葱酒调敷；亦可用植物油或蜂蜜调敷。一日数次。

【注意事项】疮疡阴证者禁用。孕妇慎用。皮肤过敏者慎用。不可内服。忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

2019

第一节　治疮疡剂

连翘败毒丸

牛黄醒消丸

如意金黄散

2019

二、生肌敛疮剂

1. 生肌玉红膏

【药物组成】轻粉、紫草、白芷、当归、血竭、甘草、虫白蜡。

【功能】解毒，祛腐，生肌。

【主治】热毒壅盛所致的疮疡，症见疮面色鲜、脓腐将尽或久不收口；亦用于乳痈。

【用法用量】外用。疮面洗清后外涂本膏，一日 1 次。

【注意事项】孕妇慎用。溃疡脓腐未清者慎用。不可久用。不可内服。若用药后出现皮肤过敏反应需及时停用。忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

2019

二、生肌敛疮剂

2. 紫草膏

【药物组成】紫草、当归、地黄、白芷、防风、乳香、没药。

【功能】化腐生肌，解毒止痛。

【主治】热毒蕴结所致的溃疡，症见疮面疼痛、疮色鲜活、脓腐将尽。

【用法用量】外用。摊于纱布上贴患处，每隔 1～2 日换药一次。

【注意事项】孕妇慎用。若用药后出现皮肤过敏反应需及时停用。不可内服。用药期间忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

2019

二、生肌敛疮剂

3. 拔毒生肌散

【药物组成】黄丹、红粉、轻粉、龙骨（煅）、炉甘石（煅）、石膏（煅）、冰片、虫白蜡。

【功能】拔毒生肌。

【主治】热毒内蕴所致的溃疡，症见疮面脓液稠厚、腐肉未脱、久不生肌。

【用法用量】外用适量。撒布疮面，或以膏药护之。每日换药一次。

【注意事项】孕妇及溃疡无脓者禁用。溃疡过大、过深者不可久用。皮肤过敏者慎用。不可久用。不可内服。用药期间忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

2019

二、生肌敛疮剂

生肌玉红膏

紫草膏

拔毒生肌散

2019

三、清热消痤剂

当归苦参丸

【药物组成】当归、苦参。

【功能】活血化瘀，燥湿清热。

【主治】湿热瘀阻所致的粉刺、酒皶，症见颜面、胸背粉刺疙瘩、皮肤红赤发热，或伴脓头、硬结，酒皶鼻、鼻赤。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及哺乳期妇女慎用。脾胃虚寒者慎用。服药期间不宜同时服用热性药物，忌吸烟，忌饮酒，忌食辛辣、油腻及腥发物。切忌用手挤压患处，特别是鼻唇周围。

2019

题目

当归苦参丸的功效是

A. 拔毒生肌

B. 活血化瘀，燥湿清热

C. 清热解毒，祛腐生肌

D. 散结消肿，化瘀止痛

E. 软坚散结，清热解毒

2019

第二节　治烧伤剂

第二节　治烧伤剂

京万红软膏

【功能】活血解毒，消肿止痛，去腐生肌。

【主治】轻度水、火烫伤，疮疡肿痛，创面溃烂。

【用法用量】外用。用生理盐水清理创面，涂敷本品或将本品涂于消毒纱布上，敷盖创面，用消毒纱布包扎，每日换药一次。

【注意事项】烧、烫伤感染者禁用。孕妇慎用。若用药后出现皮肤过敏反应需及时停用。不可内服。不可久用。用药期间忌食辛辣、海鲜食物。

2019

第三节　治瘰核乳癖剂


Swollen
lymph node
肿大淋巴结
Normal
lymph node
正常淋巴结
乳腺增生
脂肪
组织
乳腺
小叶
小结块通常
长在乳腺
小叶组织

散结消核剂

1. 内消瘰疬丸

【药物组成】夏枯草、海藻、蛤壳（煅）、连翘、白蔹、大青盐、天花粉、玄明粉、浙贝母、枳壳、当归、地黄、熟大黄、玄参、桔梗、薄荷、甘草。

【功能】化痰，软坚，散结。

【主治】痰湿凝滞所致的瘰疬，症见皮下结块、不热不痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】疮疡属阳证者禁用。孕妇慎用。忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

2019

散结消核剂

2. 小金丸（胶囊）

【功能】散结消肿，化瘀止痛。

【主治】痰气凝滞所致的瘰疬、瘿瘤、乳岩、乳癖，症见肌肤或肌肤下肿块一处或数处、推之能动，或骨及骨关节肿大、皮色不变、肿硬作痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、哺乳期妇女禁用。疮疡阳证者禁用。脾胃虚弱者慎用。不宜长期使用。肝、肾功能不全者慎用。忌食辛辣、油腻及海鲜等发物。

2019

散结消核剂

3. 阳和解凝膏

【功能】温阳化湿，消肿散结。

【主治】脾肾阳虚、痰瘀互结所致的阴疽、瘰疬未溃、寒湿痹痛。

【用法用量】外用。加温软化，贴于患处。

【注意事项】孕妇禁用。疮疡阳证者慎用。不可久用。不可内服。用药后出现

皮肤过敏反应者需及时停用。忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

2019

散结消核剂

4. 乳癖消胶囊（颗粒、片）

【功能】软坚散结，活血消痈，清热解毒。

【主治】痰热互结所致的乳癖、乳痈，症见乳房结节、数目不等、大小形态不一、质地柔软，或产后乳房结块、红热疼痛；乳腺增生、乳腺炎早期见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇慎用。若因服该药引起全身不适者需及时停药。

2019

散结消核剂

内消瘰疬丸

小金丸

阳和解凝膏

乳癖消胶囊

2019

题目

乳癖消的功效是

A. 软坚散结，活血消痈，清热解毒

B. 活血化瘀，燥湿清热

C. 清热解毒，祛腐生肌

D. 散结消肿，化瘀止痛

E. 软坚散结，清热解毒

2019

第四节　治痔肿剂

清肠消痔剂

1. 地榆槐角丸

【药物组成】地榆炭、蜜槐角、炒槐花、黄芩、大黄、当归、地黄、赤芍、红花、防风、荆芥穗、麸炒枳壳。

【功能】疏风凉血，泻热润燥。

【主治】脏腑实热、大肠火盛所致的肠风便血、痔疮肛瘘、湿热便秘、肛门肿痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇禁用。脾胃虚寒者慎用。忌食辛辣、油腻食物及海鲜等食物。

2019

清肠消痔剂

2. 马应龙麝香痔疮膏

【药物组成】人工麝香、人工牛黄、珍珠、煅炉甘石、硼砂、冰片、琥珀。

【功能】清热燥湿，活血消肿，祛腐生肌。

【主治】湿热瘀阻所致的各类痔疮、肛裂，症见大便出血，或疼痛、有下坠感；亦用于肛周湿疹。

【用法用量】外用。涂擦患处。

【注意事项】不可内服。孕妇慎用或遵医嘱。用药后如出现皮肤过敏反应或月经不调者需及时停用。忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。

【名师点睛】注意地榆槐角丸的注意事项。

2019

第五节　治疹痒剂

第五节　治疹痒剂

1. 消风止痒颗粒

【药物组成】荆芥、防风、石膏、蝉蜕、苍术（炒）、地骨皮、木通、亚麻子、当归、地黄、甘草。

【功能】清热除湿，消风止痒。

【主治】风湿热邪蕴阻肌肤所致的湿疮、风疹瘙痒、小儿瘾疹，症见皮肤丘疹、水疱、抓痕、血痂或见梭形或纺锤形水肿性风团、中央出现小水疱、瘙痒剧烈；湿疹、皮肤瘙痒症、丘疹性荨麻疹见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇禁用。阴虚血亏者不宜服用。服药期间，饮食宜清淡，易消化，忌辛辣、海鲜食物，若出现胃脘疼痛或腹泻时应及时停用。

2019

第五节　治疹痒剂

2. 消银颗粒（片）

【药物组成】地黄、玄参、牡丹皮、金银花、大青叶、当归、赤芍、红花、苦参、白鲜皮、防风、牛蒡子、蝉蜕。

【功能】清热凉血，养血润肤，祛风止痒。

【主治】血热风燥型白疕和血虚风燥型白疕，症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑、较干燥、基底淡红色、瘙痒较甚。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇禁用。脾胃虚寒者慎用。服药期间忌食辛辣、油腻食物及海鲜等发物。儿童用量宜减或遵医嘱。

2019

第五节　治疹痒剂

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

第三章　妇科常用中成药

第一节 调经剂



一、活血行气调经剂

1. 大黄䗪虫丸

【药物组成】熟大黄、土鳖虫（炒）、水蛭（制）、虻虫（去翅足，炒）、蛴螬（炒）、干漆（煅）、桃仁、地黄、白芍、黄芩、炒苦杏仁、甘草。

【功能】活血破瘀，通经消癥。

【主治】瘀血内停所致的癥瘕、闭经，症见腹部肿块、肌肤甲错、面色黯黑、潮热羸瘦、经闭不行。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇禁用。气虚血瘀、体弱年迈者慎用。体质壮实者当中病即止，不可过量、久用。服药后出现皮肤过敏者应停用。服药期间，忌食寒凉食物。

2019

一、活血行气调经剂

2. 益母草颗粒（膏、胶囊、口服液）

【药物组成】益母草。

【功能】活血调经。

【主治】血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋沥不净，产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇禁用。月经量多或气血亏虚、肝肾不足之月经不调者当慎用。不宜过量服用。

2019

一、活血行气调经剂

大黄䗪虫丸
Dahuang Zhechong Wan
每瓶装 60g
北京同仁堂
股份有限公司同仁堂制药厂

太极
国药准字Z20055303
OTC
益母草颗粒
活血 调经 用于 血瘀所致的月经不调 症见经水量少
YI MU CAO KE LI
15克×12袋

一、活血行气调经剂

3. 妇科十味片

【药物组成】醋香附、当归、醋延胡索、熟地黄、白芍、川芎、赤芍、白术、 大枣、甘草、碳酸钙。

【功能】养血舒肝，调经止痛。

【主治】血虚肝郁所致月经不调、痛经、月经前后诸证，症见行经后错，经水量少、有血块，行经小腹疼痛，血块排出痛减，经前双乳胀痛、烦躁，食欲不振。

【用法用量】口服。

【注意事项】气血两虚之月经不调者慎用。服药期间慎食辛辣刺激食物。

2019

一、活血行气调经剂

4. 七制香附丸

【药物组成】醋香附、当归、熟地黄、阿胶、白芍、益母草、醋延胡索、川芎、艾叶、艾叶炭、茯苓、炒白术、人参、粳米、鲜牛乳（在制法中）、砂仁、盐小茴香、地黄、天冬、食盐（在制法中）、酒萸肉、黄芩、炒酸枣仁、甘草。

【功能】疏肝理气，养血调经。

【主治】气滞血虚所致的痛经、月经量少，闭经，症见胸胁胀痛、经行量少、行经小腹胀痛、经前双乳胀痛、经水数月不行。

【用法用量】口服。一次 6g，一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。湿热患者慎用。服药期间忌食生冷。

2019

一、活血行气调经剂

OTC
妇科十味片
Fuke
Shiwei
Pian
每瓶装60片
妇科十味片

七制香附丸
Qizhi xiangfu wan
辽宁金丹药业有限公司

二、补虚扶正调经剂

1. 安坤颗粒

【药物组成】墨旱莲、牡丹皮、益母草、栀子、当归、白芍、女贞子、白术、茯苓。

【功能】滋阴清热，养血调经。

【主治】阴虚血热所致的月经先期、月经量多、经期延长，症见月经期提前、经量较多、行经天数延长、经色红质稀、腰膝痿软、五心烦热；放节育环后出血见上述证候者。

【用法用量】开水冲服。

【注意事项】孕妇及脾胃虚寒者慎用。服药期间，忌食辛辣刺激食物。

2019

二、补虚扶正调经剂

2. 八珍益母丸（胶囊）

【药物组成】益母草、熟地黄、当归、酒白芍、川芎、党参、炒白术、茯苓、甘草。

【功能】益气养血，活血调经。

【主治】气血两虚兼有血瘀所致的月经不调，症见月经周期错后、行经量少、淋漓不净、精神不振、肢体乏力。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、月经过多者禁用。湿热所致的月经不调者慎用。

2019

二、补虚扶正调经剂

乌鸡白凤丸
WUJIBAIFENGWAN
补气养血，调经止带。用于气血两虚，身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，白带量多。
OTC

二、补虚扶正调经剂

3. 乌鸡白凤丸（片）

【药物组成】乌鸡（去毛爪肠）、人参、黄芪、山药、熟地黄、当归、白芍、川芎、丹参、鹿角霜、鹿角胶、鳖甲（制）、地黄、天冬、香附（醋制）、银柴胡、芡实（炒）、桑螵蛸、牡蛎（煅）、甘草。

【功能】补气养血，调经止带。

【主治】气血两虚，身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，崩漏带下。

【用法用量】口服。

【注意事项】月经不调或崩漏属血热实证者慎用。服药后出血不减或带下量仍多者请医生诊治。服药期间慎食辛辣。

2019

二、补虚扶正调经剂

4. 女金丸

【药物组成】当归、白芍、熟地黄、鹿角霜、阿胶、党参、炒白术、茯苓、甘草、益母草、牡丹皮、没药（制）、醋延胡索、川芎、醋香附、砂仁、陈皮、肉桂、煅赤石脂、藁本、白芷、黄芩、白薇。

【功能】益气养血，理气活血，止痛。

【主治】气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调，症见月经提前、月经错后、月经量多、神疲乏力、经水淋漓不净、行经腹痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇慎用。湿热蕴结、阴虚火旺所致月经失调者慎用。月经量多者服后经量不减者，应请医生诊治。服药期间忌食寒凉食物。

2019

二、补虚扶正调经剂

安坤颗粒

八珍益母丸

乌鸡白凤丸

女金丸

2019

三、温经活血调经剂

1. 少腹逐瘀丸（颗粒）

【药物组成】当归、蒲黄、五灵脂（醋炒）、赤芍、延胡索（醋制）、没药（炒）、川芎、肉桂、炮姜、小茴香（盐炒）。

【功能】温经活血，散寒止痛。

【主治】寒凝血瘀所致的月经后期、痛经、产后腹痛，症见行经后错、经行小腹冷痛、经血紫黯、有血块、产后小腹疼痛喜热、拒按。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇忌服。湿热或阴虚有热者慎用。治产后腹痛应排除胚胎或胎盘组织残留。服药期间忌食寒凉食物。

2019

三、温经活血调经剂

2. 艾附暖宫丸

【药物组成】当归、地黄、白芍（酒炒）、川芎、炙黄芪、艾叶（炭）、制吴茱萸、肉桂、续断、醋香附。

【功能】理气养血，暖宫调经。

【主治】血虚气滞、下焦虚寒所致的月经不调、痛经，症见行经后错、经量少、有血块、小腹疼痛、经行小腹冷痛喜热、腰膝痠痛。

【用法用量】口服。小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸。一日 2～3 次。

【注意事项】孕妇禁用。热证、实热证者慎用。服药期间忌食寒凉食物。

2019

三、温经活血调经剂



四、固崩止血剂

1. 固经丸

【药物组成】酒龟甲、炒白芍、盐关黄柏、酒黄芩、麸炒椿皮、醋香附。

【功能】滋阴清热、固经止带。

【主治】阴虚血热所致的月经先期，症见经血量多、色紫黑；以及赤白带下。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及脾胃虚寒者慎用。实证瘀滞者不宜使用。服药期间忌食辛辣油腻。

2019

四、固崩止血剂

2. 宫血宁胶囊

【药物组成】重楼。

【功能】凉血止血，清热除湿，化瘀止痛。

【主治】血热所致的崩漏下血、月经过多，产后或流产后宫缩不良出血及子宫功能性出血，以及慢性盆腔炎属湿热瘀结所致者，症见少腹痛、腰骶痛、带下增多。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇忌服。虚证及血瘀出血、妊娠期出血者不宜。暴崩及脾胃虚寒者慎用。服药期间忌肥甘厚味及辛辣食物。

2019

五、安坤除烦剂

五、安坤除烦剂

1. 更年安片

【药物组成】地黄、熟地黄、制何首乌、玄参、麦冬、茯苓、泽泻、牡丹皮、珍珠母、磁石、钩藤、首乌藤、五味子、浮小麦、仙茅。

【功能】滋阴清热，除烦安神。

【主治】肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烘热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安；更年期综合征见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇禁用。脾肾阳虚及糖尿病患者慎用。服药期间，应忌辛辣食物。

2019

五、安坤除烦剂

2. 坤宝丸

【药物组成】何首乌（黑豆酒炙）、地黄、枸杞子、女贞子（酒炙）、墨旱莲、龟甲、覆盆子、菟丝子、南沙参、麦冬、石斛、当归、白芍、鸡血藤、赤芍、地骨皮、白薇、知母、黄芩、桑叶、菊花、珍珠母、酸枣仁（炒）。

【功能】滋补肝肾，养血安神。

【主治】肝肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢痠楚；更年期综合征见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇禁用。脾肾阳虚者慎用。服药期间忌食辛辣食物。

2019

五、安坤除烦剂

第二节　止带剂

涼
快
你涼快了，
遭罪的是我啊！

一、健脾祛湿止带剂

千金止带丸

【药物组成】党参、炒白术、盐补骨脂、盐杜仲、续断、当归、白芍、川芎、醋香附、醋延胡索、鸡冠花、椿皮（炒）、煅牡蛎、木香、砂仁、小茴香（盐炒）、青黛。

【功能】健脾补肾，调经止带。

【主治】脾肾两虚所致的月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋沥不净、色淡无块，或带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝痠软。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、肝郁血瘀证、湿热证、热毒证者慎用。

2019

二、清热祛湿止带剂

1. 白带丸

【药物组成】黄柏（酒炒）、椿皮、当归、白芍、醋香附。

【功能】清热，除湿，止带。

【主治】湿热下注所致的带下病，症见带下量多、色黄、有味。

【用法用量】口服。一次 6g，一日 2 次。

【注意事项】肝肾阴虚证者慎用。饮食宜清淡，忌食辛辣食物。

2019

二、清热祛湿止带剂

广发制药
千金止带丸
Qianjin Zhidai Wan

OTC
白带丸
BAI DAI WAN
300粒
707
OTC
白带丸
BAI DAI WAN
300粒
江苏七0七天然制药有

二、清热祛湿止带剂

2. 妇科千金片

【药物组成】千斤拔、功劳木、单面针、穿心莲、党参、鸡血藤、当归、金樱根。

【功能】清热除湿，益气化瘀。

【主治】湿热瘀阻所致的带下病、腹痛，症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见有上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】气滞血瘀、寒凝血瘀证者慎用。孕妇慎用。饮食宜清淡，忌辛辣食物。糖尿病患者慎用。

2019

二、清热祛湿止带剂

3. 妇炎平胶囊

【药物组成】苦参、蛇床子、苦木、冰片、珍珠层粉、枯矾、薄荷脑、硼酸、盐酸小檗碱。

【功效】清热解毒，燥湿止带，杀虫止痒。

【主治】湿热下注所致的带下病、阴痒，症见带下量多、色黄味臭、阴部瘙痒；滴虫、霉菌、细菌引起的阴道炎、外阴炎见上述证候者。

【用法用量】外用。睡前洗净阴部，置胶囊于阴道内，一次 2 粒，一日 1 次。

【注意事项】孕妇禁用。

2019

二、清热祛湿止带剂

4. 花红颗粒（片）

【药物组成】一点红、白花蛇舌草、地桃花、白背叶根、鸡血藤、桃金娘根、菥蓂。

【功能】清热解毒，燥湿止带，祛瘀止痛。

【主治】湿热瘀滞所致带下病、月经不调，症见带下量多、色黄质稠、小腹隐痛、腰骶酸痛、经行腹痛；慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎见有上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇禁用。气血虚弱所致腹痛、带下者慎用。忌食生冷、厚味及辛辣食物。

2019

二、清热祛湿止带剂

5. 消糜栓

【药物组成】紫草、黄柏、苦参、儿茶、枯矾、冰片、人参茎叶皂苷。

【功能】清热解毒，燥湿杀虫，祛腐生肌。

【主治】湿热下注所致的带下病，症见带下量多、色黄、质稠、腥臭、阴部瘙痒；滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、非特异性阴道炎、宫颈糜烂见有上述证候者。

【用法用量】阴道给药。一次 1 粒，一日 1 次。

【注意事项】孕妇禁用。月经期前至经净 3 天内停用。饮食宜清淡，忌食辛辣食物。

2019

二、清热祛湿止带剂

6. 保妇康栓（泡沫剂）

【药物组成】莪术油、冰片。

【功能】行气破瘀，生肌止痛。

【主治】湿热瘀滞所致的带下病，症见带下量多、色黄，时有阴部瘙痒；霉菌性阴道炎、老年性阴道炎、宫颈糜烂见有上述证候者。

【用法用量】栓剂：洗净外阴部，将栓剂塞入阴道深部，或在医生的指导下用药。每晚 1 粒。泡沫剂：为阴道用药。一日 1 次，睡前使用。使用前先装上导管，振摇均匀，倒置容器，将导管轻轻插入阴道约 7cm，掀压阀门，以泡沫刚好溢出阴道口为准。

【注意事项】孕妇禁用。带下属脾肾阳虚者慎用。月经前至经净 3 天内停用。用药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣食物。

二、清热祛湿止带剂

白带丸

消糜栓

妇炎平胶囊

妇科千金片

花红颗粒

保妇康栓

2019

第三节　产后康复剂

一、化瘀生新剂

1. 生化丸

【药物组成】当归、川芎、桃仁、干姜（炒炭）、甘草。

【功能】养血祛瘀。

【主治】产后受寒、寒凝血瘀所致的产后病，症见恶露不行或行而不畅、夹有血块、小腹冷痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】产后出血量多者慎用。血热证者不宜使用。

2019

一、化瘀生新剂

2. 产复康颗粒

【药物组成】人参、黄芪、白术、益母草、当归、桃仁、蒲黄、黑木耳、何首乌、熟地黄、醋香附、昆布。

【功能】补气养血，祛瘀生新。

【主治】气虚血瘀所致的产后恶露不绝，症见产后出血过多、淋漓不断、神疲乏力、腰腿痠软。

【用法用量】开水冲服。

【注意事项】产后大出血者禁用。血热者慎用。若阴道出血时间长或量多应进一步查找出血原因，采取其他止血方法。

2019

二、调理通乳剂

二、调理通乳剂

1. 下乳涌泉散

【药物组成】柴胡、当归、白芍、地黄、川芎、王不留行（炒）、穿山甲（烫）、通草、漏芦、桔梗、麦芽、天花粉、白芷、甘草。

【功能】舒肝养血，通乳。

【主治】肝郁气滞所致的产后乳汁过少，症见产后乳汁不行、乳房胀硬作痛、胸闷胁胀。

【用法用量】水煎服。

【注意事项】孕妇禁用。产后缺乳属气血虚弱者慎用。治疗期间，要注意调和情志，保持心情舒畅，以免郁怒伤肝，影响泌乳；忌食生冷及辛辣食物。

2019

二、调理通乳剂

2. 通乳颗粒

【药物组成】黄芪、熟地黄、党参、当归、白芍（酒炒）、川芎、漏芦、瞿麦、通草、路路通、穿山甲（烫）、王不留行、天花粉、鹿角霜、柴胡。

【功能】益气养血，通络下乳。

【主治】产后气血亏损，乳少，无乳，乳汁不通。

【用法用量】口服。含蔗糖者一次 30g，无蔗糖者一次 10g，一日 3 次。

【注意事项】孕妇禁用。产后缺乳属肝郁气滞证者慎用。调和情志，保持心情舒畅，以免影响泌乳。忌食生冷及辛辣食物。

2019

第四节　疗杂病剂

桂枝茯苓丸

【药物组成】桂枝、桃仁、牡丹皮、赤芍、茯苓。

【功能】活血，化瘀，消癥。

【主治】妇人宿有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，以及产后恶露不尽等。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇慎用。素有癥瘕、妊娠后漏下不止、胎动不安者需遵医嘱，以免误用伤胎。经期及经后 3 天禁用。服药期间，忌食生冷、肥腻、辛辣食物。

2019

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

第四章　儿科常用中成药

第一节 解表剂

一、疏散风热剂

1. 小儿热速清口服液

【药物组成】柴胡、黄芩、金银花、连翘、葛根、板蓝根、水牛角、大黄。

【功能】清热解毒，泻火利咽。

【主治】小儿外感风热所致的感冒，症见高热、头痛、咽喉肿痛、鼻塞流涕、咳嗽、大便干结。

【注意事项】风寒感冒或脾虚、大便稀薄者慎用。服药期间忌食生冷、油腻、辛辣食物。病情较重或服用 24 小时后疗效不明显者，可酌情增加剂量。若高热持续不退者应去医院诊治。

2019

一、疏散风热剂

2. 儿感清口服液

【药物组成】紫苏叶、荆芥穗、薄荷、黄芩、桔梗、化橘红、法半夏、甘草。

【功效】解表清热，宣肺化痰。

【主治】小儿外感风寒、肺胃蕴热证，症见发热恶寒、鼻塞流涕、咳嗽有痰、咽喉肿痛、口渴。

【用法用量】口服。

【注意事项】服药 3 天症状无改善或服药期间症状加重者，应及时就医。忌食辛辣生冷油腻食物。本品如有少量沉淀，可摇匀后服用；性状发生改变时禁止使用。

2019

一、疏散风热剂

国药准字 Z20000094
小儿热速清糖浆
XiaoEr ReSuQing TangJiang
【功能主治】清热解毒，泻火利咽。用于小儿外感高热，头痛，咽喉肿痛，鼻塞，流涕，咳嗽，大便干结。
河南明康制药有限公司
儿感清口服液
OTC
每盒装6支
北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

二、发散风寒剂

解肌宁嗽丸

【药物组成】紫苏叶、葛根、前胡、苦杏仁、桔梗、浙贝母、陈皮、半夏（制）、茯苓、木香、枳壳、玄参、天花粉、甘草。

【功能】解表宣肺，止咳化痰。

【主治】外感风寒、痰浊阻肺所致的小儿感冒发热、咳嗽痰多。

【用法用量】口服。小儿周岁一次半丸，1～3 岁一次一丸，一日 2 次。

【注意事项】痰热咳嗽者慎用。忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

第二节　清热剂

清热解毒消肿剂

1. 小儿咽扁颗粒

【药物组成】金银花、射干、金果榄、桔梗、玄参、麦冬、人工牛黄、冰片。

【功能】清热利咽，解毒止痛。

【主治】小儿肺卫热盛所致的喉痹、乳蛾，症见咽喉肿痛、咳嗽痰盛、口舌糜烂；急性咽炎、急性扁桃体炎见上述证候者。

【用法用量】开水冲服。

【注意事项】虚火乳蛾、喉痹者慎用。服药期间忌食生冷、辛辣、油腻食物。服药期间症状加剧、高热不退、呼吸困难时，应及时到医院诊治。

2019

第二节　清热剂

2. 小儿化毒散（胶囊）

【药物组成】人工牛黄、大黄、黄连、珍珠、雄黄、川贝母、天花粉、赤芍、乳香（制）、没药（制）、冰片、甘草。

【功能】清热解毒，活血消肿。

【主治】热毒内蕴、毒邪未尽所致的口疮肿痛、疮疡溃烂、烦躁口渴、大便秘结。

【注意事项】肺胃阴虚喉痹，阴虚火旺、虚火上炎所致的口疮慎用。脾胃虚弱、 体弱者慎用。因其含有雄黄，故不宜过量或久用。服药期间，饮食宜清淡，忌用辛辣、油腻食物。

2019

第三节　止泻剂

一、清利止泻剂

小儿泻速停颗粒

【药物组成】地锦草、茯苓、儿茶、乌梅、焦山楂、白芍、甘草。

【功能】清热利湿，健脾止泻，缓急止痛。

【主治】小儿湿热蕴结大肠所致的泄泻，症见大便稀薄如水样、腹痛、纳差；小儿秋季腹泻及迁延性、慢性腹泻见上述证候者。

【用法用量】口服。【注意事项】虚寒泄泻者不宜使用。如病情较重，或服用 1～2 天后疗效不佳者，可酌情增加剂量。有脱水者可口服或静脉补液。服药期间，忌生冷、辛辣油腻食物；腹泻病情加重时，应到医院诊治。

2019

二、健脾止泻剂

1. 止泻灵颗粒

【药物组成】党参、白术（炒）、薏苡仁（炒）、茯苓、白扁豆（炒）、山药、莲子、陈皮、泽泻、甘草。

【功能】健脾益气，渗湿止泻。

【主治】脾胃虚弱所致的泄泻、大便溏泄、饮食减少、腹胀、倦怠懒言；慢性肠炎见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】感受外邪、内伤饮食或湿热腹泻者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。若久泻不止，伤津失水较重者，应及时送医院就诊。

2019

二、健脾止泻剂

2. 健脾康儿片

【药物组成】人参、白术（麸炒）、茯苓、山药（炒）、山楂（炒）、鸡内金（醋炙）、木香、陈皮、使君子肉（炒）、黄连、甘草。

【功能】健脾养胃，消食止泻。

【主治】脾胃气虚所致的泄泻，症见腹胀便泻、面黄肌瘦、食少倦怠、小便短少。

【用法用量】口服。

【注意事项】湿热泄泻者慎用。服药期间，饮食宜清淡，选择易消化食物，注意补充体液，防止脱水。

2019

第四节　消导剂

一、消食导滞剂

1. 小儿消食片

【药物组成】山楂、六神曲（炒）、炒麦芽、炒鸡内金、槟榔、陈皮。

【功能】消食化滞，健脾和胃。

【主治】食滞肠胃所致的积滞，症见食少、便秘、脘腹胀满、面黄肌瘦。

【用法用量】口服或咀嚼。

【注意事项】脾胃虚弱，内无积滞者不宜用。服药期间，忌辛辣油腻。

2019

一、消食导滞剂

2. 小儿化食丸

【药物组成】焦山楂、六神曲（炒焦）、焦麦芽、焦槟榔、醋莪术、三棱（制）、牵牛子（炒焦）、大黄。

【功能】消食化滞，泻火通便。

【主治】食滞化热所致的积滞，症见厌食、烦躁、恶心呕吐、口渴、脘腹胀满、大便干燥。

【用法用量】口服。

【注意事项】脾虚食积者慎用。服药期间不宜过食生冷、辛辣油腻食物。中病即止，不宜长期服用。

2019

一、消食导滞剂

3. 一捻金

【药物组成】大黄、炒牵牛子、槟榔、人参、朱砂。

【功能】消食导滞，祛痰通便。

【主治】脾胃不和、痰食阻滞所致的积滞，症见停食停乳、腹胀便秘、痰盛喘咳。

【用法用量】口服。

【注意事项】脾胃虚弱，内无痰食积滞者慎用。不宜过食生冷、肥腻食物。含有朱砂，不宜久用；肝肾功能不全者慎用。

2019

一、消食导滞剂

小儿消食片

小儿化食丸

一捻金

2019

二、健脾消食剂

1. 健脾消食丸

【药物组成】白术（炒）、枳实（炒）、木香、槟榔（炒焦）、草豆蔻、鸡内金（醋炙）、莪莪粉。

【功能】健脾，和胃，消食，化滞。

【主治】脾胃气虚所致的疳证，症见小儿乳食停滞、脘腹胀满、食欲不振、面黄肌瘦、大便不调。

【用法用量】口服。

【注意事项】脾胃虚弱无积滞者慎用。服药期间，宜食用清淡易消化食物，养成良好的饮食习惯。

2019

2. 肥儿丸

【药物组成】六神曲（炒）、炒麦芽、使君子仁、槟榔、木香、煨肉豆蔻、胡黄连。

【功能】健胃消积，驱虫。

【主治】小儿消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻。

【用法用量】口服。一次 1～2 丸，一日 1～2 次，三岁以内小儿酌减。

【注意事项】脾虚气弱者慎用。本品一般服药不超过三日，注意饮食卫生。

2019

第五节　止咳喘剂

清宣降气化痰剂

1. 小儿咳喘灵颗粒（口服液）

【药物组成】麻黄、石膏、苦杏仁、瓜蒌、金银花、板蓝根、甘草。

【功能】宣肺清热，止咳祛痰，平喘。

【主治】小儿外感风热所致的感冒、咳喘，症见发热、恶风、微有汗出、咳嗽咯痰、咳喘气促；上呼吸道感染、支气管炎、肺炎见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】风寒感冒者慎用。服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物，若见高热喘憋、鼻煽加剧者应及时到医院诊治。

2019

清宣降气化痰剂

2. 清宣止咳颗粒

【药物组成】桑叶、薄荷、苦杏仁、桔梗、紫菀、陈皮、白芍、枳壳、甘草。

【功能】疏风清热，宣肺止咳。

【主治】小儿外感风热所致的咳嗽，症见咳嗽、咯痰、发热或鼻塞、流涕、微恶风寒、咽红或痛、苔薄黄等。

【用法用量】开水冲服。1～3 岁，每次 1/2 包；4～6 岁，每次 3/4 包；7～14 岁，每次 1 包，一日 3 次。

【注意事项】糖尿病患儿禁服。脾虚易腹泻者慎服。服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

2019

清宣降气化痰剂

3. 鹭鸶咯丸

【药物组成】麻黄、苦杏仁、石膏、甘草、细辛、炒紫苏子、炒芥子、炒牛蒡子、瓜蒌皮、射干、青黛、蛤壳、天花粉、栀子（姜制）、人工牛黄。

【功效】宣肺，化痰，止咳。

【主治】痰浊阻肺所致的顿咳、咳嗽，症见咳嗽阵作、痰鸣气促、咽干声哑；百日咳见上述证候者。

【用法用量】口服。梨汤或温开水送服。一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】体虚久咳者慎用。本品含有细辛，不宜长期过量服用。百日咳患儿应及时隔离治疗。

2019

清宣降气化痰剂

4. 儿童清肺丸（合剂）

【药物组成】麻黄、炒苦杏仁、紫苏叶、细辛、薄荷、黄芩、石膏、蜜桑白皮、板蓝根、蜜枇杷叶、天花粉、炒紫苏子、葶苈子、法半夏、橘红、浙贝母、前胡、白前、瓜蒌皮、石菖蒲、煅青礞石、甘草。

【功能】清肺，解表，化痰，止嗽。

【主治】小儿风寒外束、肺经痰热所致的面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑。

【用法用量】口服。

【注意事项】阴虚燥咳、体弱久嗽慎用。

2019

清宣降气化痰剂

5. 小儿消积止咳口服液

【药物组成】枇杷叶（蜜炙）、葶苈子（炒）、瓜蒌、枳实、连翘、桔梗、山楂（炒）、莱菔子（炒）、槟榔、蝉蜕。

【功能】清热肃肺，消积止咳。

【主治】小儿饮食积滞、痰热蕴肺所致的咳嗽、夜间加重、喉间痰鸣、腹胀、口臭。

【用法用量】口服。

【注意事项】体质虚弱、肺气不足、肺虚久咳、大便溏薄者慎用。三个月以下婴儿不宜服用。服药期间饮食宜清淡，忌食生冷、辛辣、油腻食物。

2019

清宣降气化痰剂

小儿咳喘灵颗粒

清宣止咳颗粒

鹭鸶咯丸

儿童清肺丸

小儿消积止咳口服液

2019

第六节　补虚剂

益气养阴剂

龙牡壮骨颗粒

【药物组成】党参、黄芪、白术（炒）、山药、茯苓、大枣、炒鸡内金、山麦冬、醋龟甲、龙骨、煅牡蛎、醋南五味子、甘草、乳酸钙、葡萄糖酸钙、维生素D2。

【功能】强筋壮骨，和胃健脾。

【主治】治疗和预防小儿佝偻病、软骨病；对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓也有治疗作用。

【用法用量】开水冲服。

【注意事项】实热证者慎用。服药期间忌食辛辣、油腻食物。患儿发热期间暂停服本品，佝偻病合并手足搐搦者应配合其他治疗。

2019

第七节　镇惊息风剂

治急惊剂

1. 琥珀抱龙丸

【药物组成】琥珀、朱砂、天竺黄、胆南星、枳实（炒）、枳壳（炒）、山药

（炒）、茯苓、红参、檀香、甘草。

【功能】清热化痰、镇静安神。

【主治】饮食内伤所致的痰食型急惊风，症见发热抽搐、烦躁不安、痰喘气急、惊痫不安。

2019

治急惊剂

2. 牛黄抱龙丸

【药物组成】牛黄、胆南星、天竺黄、全蝎、炒僵蚕、朱砂、琥珀、人工麝香、雄黄、茯苓。

【功能】清热镇惊，祛风化痰。

【主治】小儿风痰壅盛所致的惊风，症见高热神昏、惊风抽搐。

【用法用量】口服。一次 1 丸，一日 2 次；婴儿每次 1/3 丸，化服。

【注意事项】慢惊及久病、气虚者忌服。寒痰停饮咳嗽、脾胃虚弱、阴虚火旺者慎用。外伤疯血痫疾不宜单用本品。因其含朱砂，故不宜过量或久用。服药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣刺激、油腻食物。小儿高热惊厥抽搐不止，应及时送医院抢救。

2019

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

第五章　眼科常用中成药

第一节 清热剂

一、清热散风明目剂

1. 明目蒺藜丸

【功能】清热散风，明目退翳。

【主治】上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪。

【用法用量】口服。

【注意事项】阴虚火旺及年老体弱者慎用。服药期间忌食辛辣、肥甘厚味之品，禁吸烟饮酒。

2019

一、清热散风明目剂

2. 明目上清片

【功能】清热散风，明目止痛。

【主治】外感风热所致的暴发火眼、红肿作痛、头晕目眩、眼边刺痒、大便燥结、小便赤黄。

【用法用量】口服。一次 4 片，一日 2 次。

【注意事项】孕妇慎用。脾胃虚寒者忌用。服药期间忌食辛辣燥热、油腻黏滞之物。

2019

二、清热泻火明目剂

1. 八宝眼药散

【药物组成】炉甘石（三黄汤飞）、地栗粉、熊胆、硼砂（炒）、冰片、珍珠、朱砂、海螵蛸（去壳）、麝香。

【功能】消肿止痛，退翳明目。

【主治】肝胃火盛所致的目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒。

【用法用量】取少许，点于眼角，一日 2～3 次。点药后，轻轻闭眼 5 分钟以上。

【注意事项】孕妇慎用。

2019

二、清热泻火明目剂

2. 黄连羊肝丸

【药物组成】黄连、龙胆、胡黄连、黄芩、黄柏、密蒙花、木贼、茺蔚子、夜明砂、决明子（炒）、石决明（煅）、柴胡、青皮（醋炒）、鲜羊肝。

【功能】泻火明目。

【主治】肝火旺盛，目赤肿痛，视物昏暗，羞明流泪，胬肉攀睛。

【用法用量】口服。一次 1 丸，一日 1～2 次。

【注意事项】本品苦寒，故阴虚火旺、体弱年迈及脾胃虚寒者慎用，不可过量或持久服用。服药期间忌食辛辣肥甘之物。

2019

第二节　扶正剂

一、滋阴养肝明目剂

二、益气养阴化瘀明目剂

2019

一、滋阴养肝明目剂

1. 明目地黄丸

【药物组成】熟地黄、山茱萸（制）、枸杞子、山药、当归、白芍、蒺藜、石决明（煅）、牡丹皮、茯苓、泽泻、菊花。

【功能】滋肾，养肝，明目。

【主治】肝肾阴虚所致的目涩畏光、视物模糊、迎风流泪。

【用法用量】口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2次。

【注意事项】肝经风热、肝胆湿热、肝火上扰，以及脾胃虚弱、运化失调者慎用。服药期间，不宜食油腻肥甘、辛辣燥热之物。

2019

一、滋阴养肝明目剂

2. 石斛夜光颗粒（丸）

【药物组成】石斛、天冬、麦冬、地黄、熟地黄、枸杞子、菟丝子、五味子、肉苁蓉、牛膝、人参、山药、茯苓、甘草、水牛角浓缩粉、羚羊角、决明子、青葙子、黄连、菊花、蒺藜（盐炒）、川芎、防风、苦杏仁、麸炒枳壳。

【功能】滋阴补肾，清肝明目。

【主治】肝肾两亏、阴虚火旺，内障目暗，视物昏花。

【用法用量】口服。颗粒剂：一次 2.5g，一日 2 次，开水冲化。丸剂：水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】孕妇慎用。肝经风热、肝火上攻实证，以及脾胃虚弱、运化失调

者慎用。

2019

一、滋阴养肝明目剂

3. 障眼明片

【药物组成】熟地黄、菟丝子、枸杞子、肉苁蓉、山茱萸、蕤仁（去内果皮）、决明子、密蒙花、菊花、车前子、青葙子、蔓荆子、党参、黄芪、黄精、白芍、川芎、石菖蒲、升麻、葛根、关黄柏、甘草。

【功能】补益肝肾，退翳明目。

【主治】肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠软，或轻度视力下降；早、中期年龄相关性白内障见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】脾胃虚寒者慎用。治疗过程中不宜食用辛辣烧烤、黏腻肥甘食物。

二、益气养阴化瘀明目剂

复方血栓通胶囊

【药物组成】三七、黄芪、丹参、玄参。

【功能】活血化瘀，益气养阴。

【主治】血瘀兼气阴两虚证的视网膜静脉阻塞，症见视力下降或视觉异常、眼底瘀血征象、神疲乏力、咽干、口干等；以及血瘀兼气阴两虚的稳定型劳累性心绞痛，症见胸闷痛、心悸、心慌、气短、乏力、心烦、口干等。

【用法用量】口服。一次 3 粒，一日 3 次。

【注意事项】孕妇及痰瘀阻络、气滞血瘀者慎用。用药期间，不宜食用辛辣厚味、肥甘滋腻食物。

2019

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

第六章　耳鼻喉、口腔科常用中成药



第一节 治耳聋耳鸣剂

一、清肝利耳剂

耳聋丸

【药物组成】龙胆、黄芩、栀子、羚羊角、泽泻、木通、地黄、当归、九节菖蒲、甘草。

【功能】清肝泻火，利湿通窍。

【主治】肝胆湿热所致的头晕头痛、耳聋耳鸣、耳内流脓。

【用法用量】口服。小蜜丸一次 7g；大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】孕妇及脾胃虚寒者慎用。服药期间，忌食辛辣油腻之物。

2019

二、益肾聪耳剂

耳聋左慈丸

【药物组成】熟地黄、山茱萸（制）、山药、泽泻、茯苓、牡丹皮、竹叶柴胡、磁石（煅）。

【功能】滋肾平肝。

【主治】肝肾阴虚所致的耳鸣耳聋、头晕目眩。

【用法用量】口服。水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2次。

【注意事项】痰瘀阻滞者慎用。服药期间，注意饮食调理，忌食或少食辛辣刺激及油腻之物。

2019

第二节　治鼻鼽鼻渊剂

一、清宣通窍剂

1. 鼻炎康片

【药物组成】野菊花、黄芩、猪胆粉、麻黄、薄荷油、广藿香、苍耳子、鹅不食草、当归、马来酸氯苯那敏。

【功能】清热解毒，宣肺通窍，消肿止痛。

【主治】风邪蕴肺所致的急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎。

【用法用量】口服。一次 4 片，一日 3 次。

2019

一、清宣通窍剂

【注意事项】过敏性鼻炎属虚寒症者慎用。肺脾气虚或气滞血瘀者慎用。运动员慎用。服药期间，戒烟酒，忌辛辣食物。所含苍耳子有小毒，故不宜过量或持久服用。又含马来酸氯苯那敏，易引起嗜睡，服药期间不得驾驶车、船，不得从事高空作业、机械作业及操作精密仪器等；又因其对 H1 受体阻断作用，故膀胱颈梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼、高血压和前列腺肥大者慎用；孕妇及哺乳期妇女慎用。

2019

一、清宣通窍剂

2. 千柏鼻炎片

【药物组成】千里光、卷柏、川芎、麻黄、白芷、决明子、羌活。

【功能】清热解毒，活血祛风，宣肺通窍。

【主治】风热犯肺、内郁化火、凝滞气血所致的鼻塞、鼻痒气热、流涕黄稠或持续鼻塞、嗅觉迟钝；急慢性鼻炎、急慢性鼻窦炎见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 3～4 片，一日 3 次。

【注意事项】外感风寒、肺脾气虚者慎用。高血压、青光眼患者慎用。服药期间，忌食辛辣厚味、油腻、鱼腥发物，戒烟酒。因含千里光，故不宜过量或持久服用。有文献报道，服用本品可引起肝脏损害偶有胸痛、口干等。

2019

二、清化通窍剂

藿胆丸

【药物组成】广藿香叶、猪胆粉。辅料为滑石粉、黑氧化铁。

【功能】芳香化浊，清热通窍。

【主治】湿浊内蕴、胆经郁火所致的鼻塞、流清涕或浊涕、前额头痛。

【用法用量】口服。

【注意事项】对本品过敏者禁用。

2019

三、散风通窍剂

1. 鼻渊舒胶囊（口服液）

【药物组成】辛夷、苍耳子、栀子、黄芩、柴胡、薄荷、川芎、细辛、白芷、茯苓、川木通、桔梗、黄芪。

【功能】疏风清热，祛湿通窍。

【主治】鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇、肺脾气虚或气滞血瘀者慎用。对本品过敏者忌用。服药期间，戒烟酒，忌辛辣油腻食物。所含细辛、苍耳子均有小毒，故不宜过量或持久服用。

2019

三、散风通窍剂

2. 辛芩颗粒

【药物组成】黄芪、白芷、白术、防风、荆芥、细辛、苍耳子、桂枝、石菖蒲、黄芩。

【功能】益气固表，祛风通窍。

【主治】肺气不足、风邪外袭所致的鼻痒、喷嚏、流清涕、易感冒；过敏性鼻炎见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 1 袋，开水冲化，一日 3 次。20 天为一个疗程。

【注意事项】外感风热或风寒化热者慎用。服药期间，戒烟酒，忌食辛辣之物。含有小毒的苍耳子与细辛，故不宜过量或持久服用。

2019

第三节　治咽肿声哑剂



一、清解利咽剂

1. 冰硼散

【药物组成】冰片、硼砂（煅）、朱砂、玄明粉。

【功能】清热解毒，消肿止痛。

【主治】热毒蕴结所致的咽喉疼痛、牙龈肿痛、口舌生疮。

【用法用量】吹敷患处，每次少量，一日数次。

【注意事项】孕妇及哺乳期妇女禁用。虚火上炎者慎用。服药期间，忌食油腻食物，戒烟忌饮酒。因含朱砂（硫化汞），故不宜长期大剂量使用，以免引起汞的蓄积而中毒。

2019

一、清解利咽剂

2. 桂林西瓜霜（胶囊、含片）

【功能】清热解毒，消肿止痛。

【主治】风热上攻、肺胃热盛所致的乳蛾、喉痹、口糜，症见咽喉肿痛、喉核肿大、口舌生疮、牙龈肿痛或出血；急慢性咽炎、扁桃体炎、口腔炎、口腔溃疡、牙龈炎见上述证候者及轻度烫伤（表皮未破）者。

【注意事项】孕妇禁用。

2019

一、清解利咽剂

对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻、鱼腥食物，戒烟酒。老人、儿童及素体脾胃虚弱者慎用。不宜与滋补性中药同时服用。内含有山豆根与煅硼砂，故不宜过量服用或长期服用。高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。外用时，应首先清洁患处，取适量药粉敷于患处。如口腔用药，先漱口清除口腔食物残渣，用药后禁食 30～60 分钟。

2019

一、清解利咽剂

3. 复方鱼腥草片

【药物组成】鱼腥草、黄芩、板蓝根、连翘、金银花。

【功能】清热解毒。

【主治】外感风热所致的急喉痹、急乳蛾，症见咽部红肿、咽痛；急性咽炎、急性扁桃体炎见上述证候者。

【用法用量】口服。一次 4～6 片，一日 3 次。

【注意事项】虚火喉痹、乳蛾者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻、鱼腥食物，戒烟酒。

2019

一、清解利咽剂

4. 六神丸

【药物组成】麝香、蟾酥、雄黄等。

【功能】清热解毒，消肿利咽，化腐止痛。

【主治】烂喉丹痧，咽喉肿痛，喉风喉痈，单双乳蛾，小儿热疖，痈疡疔疮，乳痈发背，无名肿毒。

【用法用量】口服。

【注意事项】孕妇及对本品过敏者禁用。

2019

二、滋润利咽剂

1. 玄麦甘桔含片（颗粒）

【药物组成】玄参、麦冬、桔梗、甘草。

【功能】清热滋阴，祛痰利咽。

【主治】阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛。

【用法用量】片剂：含服，一次 1～2 片，一日 12 片，随时服用。颗粒剂：开水冲服，一次 10g，一日 3～4 次。

【注意事项】喉痹、乳蛾属风热者慎用。脾虚便溏者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻、鱼腥之物，戒烟酒。儿童用药应遵医嘱。

2019

二、滋润利咽剂

2. 清音丸

【药物组成】诃子肉、天花粉、川贝母、百药煎、乌梅肉、葛根、茯苓、甘草。

【功能】清热利咽，生津润燥。

【主治】肺热津亏，咽喉不利，口舌干燥，声哑失音。

【用法用量】口服。温开水送服或噙化。水蜜丸一次 2g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。急喉痹证属实热者慎用。服药期间，忌食辛辣油腻食物，忌烟酒。

2019

三、化腐利咽剂

1. 锡类散

【药物组成】牛黄、象牙屑、青黛、珍珠、壁钱炭、人指甲（滑石粉制）、冰片。

【功能】解毒化腐，敛疮。

【主治】心胃火盛所致的咽喉糜烂肿痛。

【用法用量】每用少许，吹敷患处，一日 1～2 次。

【注意事项】孕妇、老人、儿童、虚火上炎及素体脾胃虚弱者慎用。服药期间，忌食辛辣油腻食物。

2019

三、化腐利咽剂

2. 珠黄散

【药物组成】珍珠、人工牛黄。

【功能】清热解毒，祛腐生肌。

【主治】热毒内蕴所致的咽痛、咽部红肿、糜烂、口腔溃疡久不收敛。

【用法用量】取药少许吹患处，一日 2～3 次。

【注意事项】孕妇慎用。虚火喉痹、口疮慎用。素体脾胃虚弱者慎用。服药期间，忌食辛辣油腻食物。

2019

四、开音利咽剂

1. 黄氏响声丸

【功能】疏风清热，化痰散结，利咽开音。

【主治】风热外束、痰热内盛所致的急、慢性喉瘖，症见声音嘶哑、咽喉肿痛、咽干灼热、咽中有痰，或寒热头痛，或便秘尿赤；急、慢性喉炎及声带小结、声带息肉初起见上述证候者。

【用法用量】口服。

【注意事项】阴虚火旺、素体脾胃虚弱或胃寒便溏者慎用。老人、儿童慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻、鱼腥食物，戒烟酒。儿童服用该药应遵医嘱。

2019

四、开音利咽剂

2. 清咽滴丸

【药物组成】薄荷脑、人工牛黄、青黛、诃子、冰片、甘草。

【功能】疏风清热，解毒利咽。

【主治】外感风热所致的急喉痹，症见咽痛、咽干、口渴，或微恶风、发热、咽部红肿、舌边尖红、苔薄白或薄黄、脉浮数或清数；急性咽炎见上述证候者。

【用法用量】含服。一次 4～6 粒，一日 3 次。

【注意事项】孕妇、虚火喉搏及素体脾胃虚弱者慎用。老人、儿童慎服。服药期间，忌食辛辣油腻之物。

2019

第四节　治口疮剂

清解消肿剂

1. 栀子金花丸

【药物组成】栀子、黄芩、黄连、黄柏、金银花、大黄、知母、天花粉。

【功能】清热泻火，凉血解毒。

【主治】肺胃热盛所致的口舌生疮、牙龈肿痛、目赤眩晕、咽喉肿痛、吐血衄血、大便秘结。

【用法用量】口服。一次 9g，一日 1 次。

【注意事项】孕妇及阴虚火旺者忌服。哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者慎用。服药期间，忌烟酒与辛辣食物。

2019

清解消肿剂

2. 口炎清颗粒

【药物组成】天冬、麦冬、玄参、山银花、甘草。

【功能】滋阴清热，解毒消肿。

【主治】阴虚火旺所致的口腔炎症。

【用法用量】口服。一次 2 袋，一日 1～2 次。

【注意事项】脾虚便溏者慎服。湿热内蕴、食积内停者忌服。服药期间，忌食辛辣、酸甜、油腻之物。

2019

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

第七章　骨伤科常用中成药

一、接骨续伤剂

1. 接骨七厘片

【药物组成】自然铜（煅）、土鳖虫、骨碎补（烫）、乳香（炒）、没药（妙）、大黄（酒炒）、血竭、当归、硼砂。

【功能】活血化瘀，接骨续筋。

【主治】跌打损伤，闪腰岔气，骨折筋伤，瘀血肿痛。

【用法用量】口服。一次 5 片，一日 2 次。黄酒送下。

【注意事项】孕妇禁用。骨折、脱臼者应先复位后再用本品治疗。脾胃虚弱者慎用。

2019

一、接骨续伤剂

2. 接骨丸

【药物组成】土鳖虫、骨碎补、自然铜（煅、醋淬）、续断、马钱子粉、甜瓜子、桂枝（炒）、郁金、地龙（广地龙）。

【功能】活血散瘀，消肿止痛。

【主治】跌打损伤，闪腰岔气，筋伤骨折，瘀血肿痛。

【用法用量】口服。一次 3g，一日 2 次。

【注意事项】本品所含马钱子粉有大毒，故应在医生指导下使用。孕妇禁用。骨折、脱臼者应先复位后再用本品治疗。切勿过量或持久服用。

2019

二、化瘀消肿剂

1. 七厘散（胶囊）

【药物组成】血竭、乳香（制）、没药（制）、红花、儿茶、冰片、人工麝香、朱砂。

【功能】化瘀消肿，止痛止血。

【主治】跌仆损伤，血瘀疼痛，外伤出血。

【用法用量】散剂：口服，一次 1～1.5g，一日 1～3 次；外用，调敷患处。胶囊剂：口服，一次 2～3 粒，一日 1～3 次；外用，以内容物调敷患处。

【注意事项】本品应在医生指导下使用。孕妇禁用。骨折、脱臼者宜手法先复位后，再用本品治疗。不宜过量或长期服用。饭后服用可减轻肠胃反应。皮肤过敏者不宜使用。

2019

二、化瘀消肿剂

2. 云南白药（胶囊、片）

【功能】化瘀止血，活血止痛，解毒消肿。

【主治】跌打损伤，瘀血肿痛，吐血，咯血，便血，痔血，崩漏下血，疮疡肿毒及软组织挫伤，闭合性骨折，支气管扩张及肺结核咯血，溃疡病出血，以及皮肤感染性疾病。

【注意事项】孕妇禁用。妇女月经期及哺乳期慎用。运动员慎用。过敏体质及有用本品过敏史者慎用。服药 1 日内，忌食蚕豆、鱼类及酸冷食物。外用前必须清洁创面。用药后如出现过敏反应，应立即停用，并视症状轻重给予抗过敏治疗，若外用可先清除药物。

2019

二、化瘀消肿剂

3. 跌打丸

【药物组成】三七、当归、白芍、赤芍、牡丹皮、北刘寄奴、苏木、桃仁、红花、血竭、乳香（制）、没药（制）、煅自然铜、土鳖虫、骨碎补（烫）、续断、姜黄、醋三棱、甜瓜子、防风、木通、桔梗、枳实（炒）、甘草。

【功能】活血散瘀，消肿止痛。

【主治】跌打损伤，筋断骨折，瘀血肿痛，闪腰岔气。

【用法用量】口服。一次 1 丸，一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。骨折、脱臼者宜手法先复位后，再用本品治疗。饭后服用可减轻肠胃反应，脾胃虚弱者慎用。

2019

二、化瘀消肿剂

4. 舒筋活血片（胶囊）

【药物组成】鸡血藤、红花、泽兰叶、伸筋草、自然铜（煅）、络石藤、狗脊（制）、香加皮、槲寄生、香附（制）。

【功能】舒筋活络，活血散瘀。

【主治】筋骨疼痛，肢体拘挛，腰背酸痛，跌打损伤。

【用法用量】口服。片剂：一次 5 片，一日 3 次。胶囊剂：一次 5 粒，一日 3次。

【注意事项】孕妇忌服。妇女月经期慎服。因所用的香加皮含强心苷而有毒，故不宜过量或持久服，禁与含强心苷类的西药同用。

2019

二、化瘀消肿剂

5. 活血止痛散（胶囊、片）

【药物组成】土鳖虫、煅自然铜、当归、三七、乳香（制）、冰片。

【功能】活血散瘀，消肿止痛。

【主治】跌打损伤，瘀血肿痛。

【用法用量】口服。散剂：用温黄酒或温开水送服，一次 1.5g，一日 2 次。胶囊剂：用温黄酒或温开水送服，一次 4 粒，一日 2 次。片剂：用温黄酒或温开水送服，一次 3 片，一日 2 次。

【注意事项】孕妇禁用。宜在饭后半小时服用。脾胃虚弱者慎用。不宜大剂量使用。妇女月经期及哺乳期慎用。服药期间忌生冷、油腻食物。

2019

感谢观看

本班次课程结束，祝大家取得好成绩

2019