

执业医师考试考前直播冲刺

中西医结合-执业（助理）医师

【第二单元】

1. 下列除哪项外, 其他均属于腰麻(蛛网膜下腔阻滞术)术后的并发症

- A. 尿潴留
- B. 呼吸抑制
- C. 颅神经麻痹
- D. 马尾丛综合征
- E. 化脓性脑脊膜炎

【答案】 B

2. 休克时反映内脏器官灌注情况, 简单方便的观察指标是

- A. 精神状态
- B. 皮肤温度、色泽
- C. 血压
- D. 趺阳脉搏动
- E. 大便量

【答案】 A

3. 下列各项, 宜采用透托法的是

- A. 急性脓肿, 毒盛正气不衰
- B. 肿疡已成, 正气已虚
- C. 肿疡初起
- D. 溃疡脓出不畅
- E. 溃疡后期, 疮口不敛

【答案】 A

4. 外科红灵丹主要适用于

- A. 脓肿初起
- B. 溃疡阴证
- C. 一切阳证
- D. 一切阴证
- E. 溃后生肌

【答案】 C

5. 益胃汤治疗疮疡的适应证是

- A. 气血两虚证
- B. 阴伤胃虚证
- C. 热盛伤津证
- D. 瘀血流注证
- E. 湿伤脾胃证

【答案】 B

6. 易入血分, 可汇聚于局部, 腐蚀血肉, 发为痈肿疮疡的邪气是

- A. 风
- B. 湿
- C. 寒
- D. 火
- E. 燥

【答案】 D

7. 肿疡基底部周围之坚硬区, 称为

- A. 创面
- B. 疽
- C. 根盘
- D. 根脚
- E. 护场

【答案】 C

8. 破伤风应用玉真散的目的是

- A. 疏风解表, 解毒镇痉
- B. 清热解毒利湿
- C. 清除毒素
- D. 活血化瘀通络
- E. 祛风化痰镇痉

【答案】 E

9. 毒蛇咬伤后, 如为神经毒, 其中医名称是

- A. 火毒
- B. 风毒
- C. 风火毒
- D. 热毒
- E. 湿毒

【答案】 B

10. 肺癌最常见的症状是

- A. 咳嗽
- B. 血痰
- C. 胸胁胀痛
- D. 发热
- E. 胸闷

【答案】 A

11. 六味地黄汤合黄连阿胶汤适用于甲状腺功能亢进症的哪种证型

- A. 心肝阴虚
- B. 心脾两虚
- C. 爽热瘀阻
- D. 心肾阴虚
- E. 肝火亢盛

【答案】 D

12. 下列各项, 不是甲亢手术并发症的是

- A. 呼吸困难和窒息
- B. 声音嘶哑
- C. 呛咳
- D. 甲状腺危象
- E. 吞咽困难

【答案】 E

13. 首选用于治疗急性乳腺炎肝胃郁热证的方剂是

- A. 托里消毒散
- B. 普济消毒饮
- C. 瓜蒌牛蒡汤
- D. 柴胡清肝汤
- E. 五味消毒饮

【答案】 C

14. 首选用于治疗乳腺纤维瘤肝郁痰凝证的的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 二陈汤加减
- D. 逍遥散合二陈汤
- E. 逍遥散合香贝养荣汤

【答案】 D

15. 肾损伤非手术治疗要求绝对卧床的时间是

- A. 1周
- B. 2~4周
- C. 4~6周
- D. 2个月
- E. 3个月

【答案】 B

16. 肛管与直肠的连接处有一条不整齐的分界线，称为

- A. 肛管直肠环
- B. 齿状线
- C. 肛乳头
- D. 肛瓣
- E. 肛柱

【答案】 B

17. 疝内容物经回纳后, 压住腹股沟管内环, 不出现的

- A. 股疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 腹股沟斜疝
- D. 脐疝
- E. 切口疝

【答案】 C

18. 剧烈呕吐可引起的是

- A. 低氯性碱中毒
- B. 高氯性酸中毒
- C. 高氯性碱中毒
- D. 低氯性酸中毒
- E. 呼吸性碱中毒

【答案】 A

19. 泛指一切皮里膜外浅表部位的病理性肿块, 中医称为

- A. 癭
- B. 瘤
- C. 结核
- D. 痰
- E. 癌

【答案】 C

20. 下列对天癸认识的叙述, 错误的是

- A. 天癸之源在肾
- B. 随肾气的盛衰而变化
- C. 决定月经的来潮和绝止
- D. 受冲任二脉调节
- E. 促进人体生长发育, 产生生殖功能

【答案】 D

21. 月经规律的妇女, 推算预产期常用的时间是

- A. 末次月经干净之日
- B. 末次月经开始之日
- C. 初觉胎动之日
- D. 房事之日
- E. 早孕反应开始之日

【答案】 B

22. 疑为宫外孕破裂, 最常用的辅助检查方法是

- A. 妊娠试验
- B. B型超声波
- C. 阴道后穹隆穿刺
- D. 腹腔镜检查
- E. 诊断性刮宫

【答案】 C

23. 中医学认为妊娠剧吐的主要发病机制是

- A. 脾胃虚弱, 肝气偏旺
- B. 冲气上逆, 胃失和降
- C. 肝失条达, 气机郁滞
- D. 痰湿内停, 阻郁脾阳
- E. 肝气郁结, 胃气上逆

【答案】 B

24. 下列妊娠期急性肾盂肾炎的治疗, 错误的是

- A. 首选氨苄西林, 头孢菌素类药物
- B. 无症状性菌尿2周为1个疗程
- C. 有症状性肾盂肾炎4周为1个疗程
- D. 症状重者两药联合静滴效果佳
- E. 选用喹诺酮类药物

【答案】 E

25. 产后胎盘附着处可全部修复的大约时间是

- A. 2周
- B. 3周
- C. 4周
- D. 5周
- E. 6周

【答案】 E

26. 治疗产褥中暑暑伤津气证, 应首选

- A. 白虎汤
- B. 竹叶石膏汤
- C. 清暑益气汤
- D. 凉膈散
- E. 银翘散

【答案】 C

27. 下列哪项不是慢性盆腔炎的临床表现

- A. 少腹一侧或双侧隐痛, 反复发作
- B. 突然少腹剧痛, 伴有停经史
- C. 带下增多, 色黄质稠
- D. 经量增多, 经期延长或婚久不孕
- E. 妇科检查附件增厚, 有压痛

【答案】 B

28. 下列关于阴道假丝酵母菌病的描述, 正确的是

- A. 主要是直接传染
- B. 孕妇与非孕妇发生率大体相同
- C. 白带增多, 灰白色, 稀薄泡沫状
- D. 多见于长期服用甲羟孕酮的妇女
- E. 有阴道假丝酵母菌感染的阴道pH为4. 0~4. 7

【答案】 E

29. 月经后期是指月经周期推迟多少天以上

- A. 3天以上
- B. 5天以上
- C. 7天以上
- D. 8天以上
- E. 10天以上

【答案】 C

30. 下列哪项是月经先期肝郁血热证的主症

- A. 经量增多
- B. 经量减少
- C. 经量或多或少
- D. 经色淡红
- E. 经后小腹隐痛

【答案】 C

31. 经血呈不凝状态的原因是

- A. 月经量多
- B. 有宫颈黏液
- C. 含有前列腺素
- D. 含有大量纤溶酶
- E. 含有脱落的阴道上皮细胞

【答案】 D

32. 下列各项, 不是闭经气血虚弱证主要症状的是

- A. 月经闭止, 腰膝酸软
- B. 月经量少, 经色淡质稀, 继而停经
- C. 头晕目眩
- D. 神疲乏力
- E. 食欲不振

【答案】 A

33. 下列关于短效口服避孕药服用方法的叙述, 正确的是

- A. 月经来潮第1天起, 每天1片, 连服22天
- B. 月经净后第1天起, 每天1片, 连服22天
- C. 月经来潮第5天起, 每晚1片, 连服22天
- D. 有房事时服1片
- E. 月经来潮第5天服1片, 20天后再服一片

【答案】 C

34. 妊娠时每小时正常胎动是

- A. 5~10次
- B. 3~5次
- C. 26~30次
- D. 16~25次
- E. 10~15次

【答案】 B

35. 孕妇末次月经为2014年3月15日, 其预产期是

- A. 2015年1月20日
- B. 2014年12月28日
- C. 2014年12月22日
- D. 2015年1月15日
- E. 2015年12月15日

【答案】 C

36. 妇女的主要生理特点是

- A. 经、带、胎、产
- B. 经、孕、产、乳
- C. 冲、任、督、带
- D. 胞宫、天癸
- E. 经、孕、胎、产

【答案】 A

37. 调经之本在

- A. 肝、肾
- B. 心、脾
- C. 脾、肾
- D. 心、肝
- E. 肺、肾

【答案】 C

38. 崩漏的诊断要点是

- A. 出血如崩
- B. 淋漓不断
- C. 月经周期严重紊乱
- D. 月经周期时先时后
- E. 月经量时多时少

【答案】 C

39. 下列关于不孕症的中医治疗, 错误的是

- A. 肝郁证首选开郁种玉汤
- B. 湿热证首选清热调血汤
- C. 肾阳虚首选温胞饮
- D. 肾气虚弱证选首毓麟珠
- E. 痰湿证首选启宫丸

【答案】 B

40. 小儿前囟闭合的正常时间是

- A. 6~7个月
- B. 8~9个月
- C. 9~11个月
- D. 12~18个月
- E. 19~20个月

【答案】 D

41. 随着小儿年龄增长, 其呼吸、脉搏变动规律是

- A. 同步增加
- B. 同步减低
- C. 基本不变
- D. 呼吸增加、脉搏减低
- E. 呼吸减低、脉搏增加

【答案】 B

42. 小儿开始更换恒牙的年龄是

- A. 2~3岁
- B. 4~5岁
- C. 6~7岁
- D. 8~9岁
- E. 10岁

【答案】 C

43. 儿科常见病中发病率最高的是

- A. 消化系统疾病
- B. 循环系统疾病
- C. 呼吸系统疾病
- D. 营养性疾病
- E. 泌尿系统疾病

【答案】 C

44. 下列关于母乳喂养优点的叙述, 错误的是

- A. 含饱和脂肪酸多, 利于消化吸收
- B. 钙磷比例适宜, 较少发生低钙血症
- C. 含优质蛋白质、必需氨基酸多
- D. 有促进婴儿免疫力的作用
- E. 哺乳可促进子宫收缩, 利于母亲早日康复

【答案】 A

45. 卫气营血辨证与三焦辨证常用于治疗的是

- A. 心理性疾病
- B. 肠寄生虫病
- C. 营养性疾病
- D. 急性传染病
- E. 结缔组织病

【答案】 D

46, 治疗小儿暑邪感冒, 应首选

- A. 荆防败毒散
- B. 新加香薷饮
- C. 银翘散
- D. 三拗汤
- E. 桑菊饮

【答案】 B

47. 新生儿硬肿症复温至正常的时间为

- A. 1~3小时
- B. 4~6小时
- C. 6~12小时
- D. 12~24小时
- E. 36~48小时

【答案】 C

48. 桑菊饮适用于哪种证型的急性支气管炎引起的咳嗽

- A. 痰湿
- B. 阴虚
- C. 风热
- D. 痰热
- E. 风寒

【答案】 C

49. 小儿肺炎痰热闭肺证的首选方剂是

- A. 银翘散合麻杏石甘汤加减
- B. 华盖散
- C. 杏苏散
- D. 五虎汤合葶苈大枣泻肺汤
- E. 荆防败毒散

【答案】 D

50. 小儿哮喘发病的主要内因是

- A. 外感六淫之邪
- B. 嗜食酸、甘、咸、膩
- C. 胎禀不足与伏痰
- D. 接触异常气味
- E. 活动过度, 情绪激动

【答案】 C

51. 诊断病毒性心肌炎最常做的检查是

- A. 心脏彩色多普勒检查
- B. 心电图
- C. 心电向量
- D. 胸部X线摄片
- E. 螺旋CT

【答案】 B

52. 属于左向右分流的先天性心脏病是

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 室间隔缺损
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 主动脉缩窄
- E. 右位心

【答案】 B

53, 鹅口疮心脾积热证的首选方剂是

- A. 清胃散
- B. 泻黄散
- C. 泻心汤
- D. 清热泻脾散
- E. 导赤散

【答案】 D

54. 下列关于婴幼儿腹泻的叙述, 错误的是

- A. 病因分为感染因素与非感染因素
- B. 病毒或细菌感染直接引起的称为肠炎
- C. 饮食不当引起的称为食饵性肠炎
- D. 感染因素分为消化道内感染和消化道外感染
- E. 细菌引起的腹泻多发生在夏、秋季

【答案】 C

55. 下列哪项不是急性肾炎的临床特征

- A. 多数病人都有血尿
- B. 病程早期常有高血压
- C. 部分病例可出现急性肾功能不全
- D. 血压急剧升高时可出现高血压脑病
- E. 浮肿为凹陷性、可行性

【答案】 E

56. 夏季病毒性脑炎的常见病因是

- A. 外感寒湿
- B. 外感湿热
- C. 感受温热毒邪
- D. 饮食不洁
- E. 感受暑湿

【答案】 C

57. 特发性血小板减少性紫癜血热伤络证的治法是

- A. 清热解毒, 凉血止血
- B. 益气健脾, 摄血养血
- C. 滋阴清热, 凉血宁络
- D. 活血化瘀, 理气止血
- E. 清热解毒, 凉血宁络

【答案】 E

58. 小儿易患疳病的原因是

- A. 脏腑娇嫩
- B. 发育迅速
- C. 肺常不足
- D. 脾常不足
- E. 肾常虚

【答案】 D

59. 幼儿麻疹发热与出疹的关系是

- A. 发热数小时至1天出疹
- B. 发热1~2天出疹
- C. 发热3~4天出疹，出疹时发热更高
- D. 发热3~4天出疹，疹出热退
- E. 发热与出疹无明显关系

【答案】 D

60. 流行性腮腺炎肿大部位是

- A. 两侧颈部
- B. 两侧耳后
- C. 两侧颌下
- D. 两侧面部
- E. 耳垂为中心

【答案】 E

61. 手三阴经的循行走向是

- A. 从胸走手
- B. 从腹走手
- C. 从手走头
- D. 从头走足
- E. 从足走腹

【答案】 A

62. 下列除哪项外, 均为十五络脉的分布特点

- A. 十二经的别络走向相表里的经脉
- B. 十二经的别络从本经四肢肘膝关节以下的络穴分出
- C. 向心性循环
- D. 任脉别络从鸠尾分出后散布于腹部
- E. 督脉别络从长强分出后散布于头

【答案】 C

63. 属于经外奇穴的是

- A. 四缝
- B. 四白
- C. 环跳
- D. 期门
- E. 神庭

【答案】 A

64. 选用神阙穴常用的操作方法是

- A. 灯草灸
- B. 隔姜灸
- C. 隔蒜灸
- D. 隔盐灸
- E. 隔泥灸

【答案】 D

65. 八脉交会穴与阳跷脉相通的经穴是

- A. 列缺
- B. 外关
- C. 后溪
- D. 照海
- E. 申脉

【答案】 E

66. 化脓灸属于

- A. 直接灸
- B. 间接灸
- C. 温和灸
- D. 回旋灸
- E. 实按灸

【答案】 A

67. 十二经脉中, 相表里的阴经与阳经的交接部位在

- A. 四肢部
- B. 胸部
- C. 腹部
- D. 头部
- E. 面部

【答案】 A

68. 曲池穴归属的经脉是

- A. 手太阴肺经
- B. 手少阴心经
- C. 手厥阴心包经
- D. 手太阳小肠经
- E. 手阳明大肠经

【答案】 E

69. 手三里位于阳溪穴与曲池穴连线上, 曲池穴下

- A. 5寸
- B. 4寸
- C. 3寸
- D. 2寸
- E. 1寸

【答案】 D

70. 下列各项, 不属三阴交主治的是

- A. 脾胃病证
- B. 妇产科病证
- C. 生殖泌尿系统病证
- D. 心悸、失眠
- E. 阳虚诸病

【答案】 E

71. 翳风穴位于

- A. 胸锁乳突肌后缘, 平下颌角处
- B. 乳突前下方与下颌角之间的凹陷中
- C. 乳突后下方凹陷中
- D. 胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷中
- E. 颈后区, 横平第2颈椎棘突上际, 斜方肌外缘凹陷中

【答案】 B

72. 下列哪项不宜用三棱针治疗

- A. 高热惊厥
- B. 中风脱证
- C. 中暑昏迷
- D. 急性腰扭伤
- E. 乳蛾

【答案】 B

73. 治疗呕吐, 主穴的操作方法是

- A. 灸法
- B. 毫针补法
- C. 毫针泻法
- D. 毫针平补平泻法
- E. 刺络拔罐法

【答案】 D

74. 治疗遗尿伴夜梦多除主穴外, 应加

- A. 肾俞、内关
- B. 肾俞、肺俞
- C. 肺俞、足三里
- D. 百会、神门
- E. 脾俞、内关

【答案】 D

75. 拔罐时若需留罐, 留罐的时间一般为

- A. 5~10分钟
- B. 10~15分钟
- C. 15~20分钟
- D. 20~25分钟
- E. 25~30分钟

【答案】 B

76. 患者, 女, 24岁。因外伤导致膀胱破裂现面色苍白, 呼吸急促, 四肢厥冷, 烦躁不安, 脉细数。查: 血压90/70mmHg, 心率155次/分钟, 。应考虑为

- A. 创伤性休克早期, 感染性休克
- B. 创伤性休克早期
- C. 创伤性休克休克期
- D. 心源性休克, 失液性休克
- E. 心源性休克

【答案】 B

77. 患者, 男, 30岁。输血后4-5分钟, 即出现寒战, 高热, 头痛, 腰背剧痛, 心前区压迫感全身有散在性荨麻疹, 血压为80/60mmHg, 血浆呈粉红色。应首先考虑的是

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应
- D. 细菌污染反应
- E. 枸橼酸盐中毒

【答案】 C

78. 患者，女，20岁。左前臂圆形肿物如指头大小，质硬，表面光滑，边缘清楚，无粘连，活动度大。应首先考虑的是

- A. 粉瘤
- B. 脂肪瘤
- C. 神经纤维瘤
- D. 纤维瘤
- E. 血管瘤

【答案】 D

79. 患者，女，32岁。右腹疼痛3天，伴发热，口干欲饮，大便秘结，小便黄，舌红苔黄腻，脉滑数。查体：右下腹麦氏点压痛、反跳痛。诊断为急性阑尾炎，其证型是

- A. 瘀滞
- B. 热毒
- C. 热毒蕴滞
- D. 湿热
- E. 气血瘀滞

【答案】 B

80. 患者, 女, 40岁, 胆囊穿孔术后7天, 有弛张热, 下腹胀, 大便次数增多, 应首先考虑的是

- A. 急性胃肠炎
- B. 膈下脓肿
- C. 肠间脓肿
- D. 盆腔脓肿
- E. 粘连性肠梗阻

【答案】 D

81. 患者, 男, 68岁。有胆结石病史, 上腹部剧痛1天, 大汗淋漓, 烦躁不安, 口燥咽干, 静脉萎陷, 尿少, 舌质红面干, 脉微细数。其证型是

- A. 阴厥
- B. 寒厥
- C. 厥逆
- D. 阴脱
- E. 阳脱

【答案】 D

82. 患者, 男, 27岁, 发现颈前肿块3个月, 诊断为甲状腺瘤, 腰膝酸软, 头晕耳鸣, 舌质红, 苔少, 脉细数, 局部时有发胀, 胸闷, 有痰难咯, 舌淡红苔薄白, 脉弦, 治疗应首选

- A. 八珍汤
- B. 海棠玉壶汤
- C. 逍遥散
- D. 柴胡疏肝散
- E. 二陈汤

【答案】 B

83. 患者, 女, 26岁, 左乳发现肿块1年, 无疼痛, 查体: 左乳外下象限可扪及2.5cm×1.8cm大小肿块, 形如鸡卵, 表面光滑活动度好, 应首先考虑的是

- A. 乳腺增生病
- B. 乳腺纤维瘤
- C. 乳房结核
- D. 乳腺癌
- E. 乳腺导管内乳头状瘤

【答案】 B

84. 患者, 女, 38岁。骤然剧烈腹痛6小时, 经检查诊断为胃、十二指肠溃疡急性穿孔合并腹膜炎。现上腹部拒按, 伴恶心、呕吐, 大便干结, 小便短少, 舌苔薄白, 脉弦细数。其证型是

- A. 气血闭阻
- B. 气血两虚
- C. 肝气郁结
- D. 实热
- E. 厥脱

【答案】 A

85. 患者, 男, 28岁, 餐后突发性右上腹痛, 疑为十二指肠溃疡穿孔, 下列检查中, 最具有诊断意义的是

- A. 肠鸣音消失
- B. 腹腔穿刺
- C. 肠鸣音亢进
- D. 上腹压痛、反跳痛
- E. 立位腹部平片可见膈下游离气体

【答案】 E

86. 患者，男，29岁。患非淋球菌性尿道炎半个月，排尿不爽，淋漓不尽，热涩刺痛，尿道红而分泌物多，小腹拘急，舌红苔黄，脉弦滑。治疗应首选

- A. 萆薢渗湿汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 五神汤
- D. 三妙丸
- E. 萆薢化毒汤

【答案】 A

87. 患者, 男, 35岁, 2小时前劳动中无诱因突发上腹刀割样疼痛, 迅速波及全腹, 体格检查: 舟状腹, 呼吸运动受限, 全腹有明显腹膜刺激征, 肝浊音界消失, 肠鸣音消失, 初步诊断是

- A. 阑尾穿孔腹膜炎
- B. 胃十二指肠溃疡穿孔腹膜炎
- C. 胆囊穿孔腹膜炎
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 急性出血性胰腺炎

【答案】 B

88. 患者, 女, 28岁, 已婚。产前检查胎背位于母体腹部右侧, 胎心位于右上腹, 宫底可触及浮球物。诊断其胎位为

- A. ROP (枕右后)
- B. RSP (骶右后)
- C. RSA (骶右前)
- D. LSA (骶左前)
- E. ROT (枕右横)

【答案】 C

89. 患者, 女, 28岁, 已婚。妊娠后阴道少量出血, 伴小腹隐痛, 腰酸, 恶心纳差, 舌苔白, 脉细滑。B超检查示宫内可见胎囊。应首先考虑的是

- A. 难免流产
- B. 先兆流产
- C. 习惯性流产
- D. 稽留流产
- E. 不全流产

【答案】 B

90. 患者, 女, 29岁, 已婚, 孕8个月, 头晕头痛, 耳鸣作响, 心悸怔忡, 夜寐多梦, 舌红, 少苔, 脉弦细滑, 血压150/90mmHg. 治疗应首选

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 杞菊地黄丸
- C. 羚角钩藤汤
- D. 知柏地黄汤
- E. 牛黄降压丸

【答案】 B

91. 患者, 女, 25岁。在分娩时突发呼吸困难, 其后咯血而死。尸检发现肺小血管内有胎脂及角化上皮。其死因可能是

- A. 血栓栓塞
- B. 气体栓塞
- C. 脂肪栓塞
- D. 羊水栓塞
- E. 瘤细胞栓塞

【答案】 D

92. 患者,女,26岁,已婚。孕2产1。现孕40周,来院途中分娩,总产程1小时,产后5天出现寒战、高热、下腹痛,无乳胀及腹泻妇科检查:阴道内有脓血,宫颈轻度裂伤,子宫大面软,压痛明显。应首先考虑的是

- A. 乳腺炎
- B. 宫颈炎
- C. 产褥感染
- D. 产后细菌性痢疾
- E. 泌尿系统感染

【答案】 C

93. 患者, 女, 21岁, 未婚。3天来带下量多, 色黄呈脓性, 有臭气, 阴部坠胀, 口苦咽干, 舌红苔黄腻, 脉弦滑, 阴道分泌物镜检见大量脓细胞, 其诊断是

- A. 滴虫性阴道炎湿热证
- B. 滴虫性阴道炎湿毒证
- C. 霉菌性阴道炎湿热证
- D. 非特异性阴道炎湿热证
- E. 非特异性阴道炎湿毒证

【答案】 D

94. 患者, 女, 45岁, 已婚。接触性阴道流血2个月, 宫颈重度糜烂伴颗粒样增生, 宫颈脱落细胞检查巴氏Ⅲ级。为了明确诊断, 提高活检的准确性, 应用的检查是

- A. 宫颈活组织检查
- B. 阴道镜与宫颈检查
- D. 阴道活组织检查
- E. 子宫内膜活组织检查

【答案】 A

95. 患者，女，30岁，已婚。月经周期正常，但经量多（5包纸纸/次），色深红、质稠，心烦口渴，尿黄便结，舌红苔黄，脉滑数。妇科盆腔及B型超声波检查无异常，基础体温呈双相。治疗应首选

- A. 黄体酮加保阴煎
- B. 黄体酮加清经散
- C. 丙酸酮加保阴煎
- D. 丙酸睾酮加清经散
- E. 丙酸睾酮加丹栀逍遥散

【答案】 B

96. 患者, 女, 48岁, 已婚。月经紊乱1年, 停经50天后突然阴道大量出血5天, 经色深红、质稠, 口渴烦热, 舌红苔黄, 脉洪数, 妇科检查未见异常, 子宫内膜为腺囊型增生过长应首先考虑

- A. 无排卵型功能失调性子宫出血, 虚热证
- B. 无排卵型功能失调性子宫出血, 实热证
- C. 排卵型月经过多, 虚热证
- D. 无排卵型功能失调性子宫出血, 血瘀证
- E. 排卵型月经过多, 血瘀证

【答案】 B

97. 患者, 女, 36岁, 已婚, 半年来每逢经后两乳作胀, 腰膝酸软, 两目干涩, 咽干口燥, 五心烦热, 舌红少苔, 脉细数。治疗应首选

- A. 调肝汤
- B. 逍遥散
- C. 一贯煎
- D. 丹栀逍遥散
- E. 柴胡疏肝散

【答案】 C

98. 患者，女，23岁，未婚，近3个月，因大怒后，每逢月经期即出现鼻衄，量较多，色鲜红，经量明显减少伴心烦易怒，口干口渴，胸胁胀痛，舌红，苔黄，脉弦数。治疗应首选

- A. 清肝引经汤与维生素C
- B. 顺经汤与维生素C
- C. 三黄四物汤与维生素C
- D. 丹栀逍遥散与维生素C
- E. 凉膈散与维生素C

【答案】 D

99. 患者,女,32岁。结婚5年未孕,月经规则,自觉胸脘痞闷,带下量多、色白、质黏,舌苔白腻,脉细滑,妇科检查:子宫如孕2个月大小,宫底部明显突出,质硬,B型超声波检查为单个结节,血红蛋白90g/L。应首选的治疗措施是

- A. 甲基睾酮加开郁二陈汤
- B. 雌激素加开郁二陈汤
- C. 输血加开郁二陈汤
- D. 子宫肌瘤摘除术
- E. 子宫次全切除术

【答案】 D

100. 患儿, 男, 18个月。腹泻时轻时重, 已经3个月, 大便清稀无臭, 夹不消化食物, 有时便后脱肛, 形寒肢冷, 面色㿠白, 精神萎靡, 睡时露睛, 舌淡苔白, 指纹色淡, 治疗应首选

- A. 异功散合平胃散
- B. 附子理中汤合四神丸
- C. 保和丸合二陈汤
- D. 金匱肾气丸合人参乌梅汤
- E. 参苓白术散合理中丸

【答案】 B

101. 患儿, 女, 1岁。发热, 鼻塞流涕, 咽部充血, 兼见咳嗽, 喉间痰多, 甚则气急痰鸣, 舌苔厚腻。其诊断是

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 感冒夹痰
- D. 感冒夹惊
- E. 感冒夹滞

【答案】C

102. 患儿,男,10个月,入院时诊断为腺病毒肺炎痰热闭肺证,今突然虚烦不安,额汗不温,口唇发绀,查体:体温38℃,呼吸64次/分钟,心率165次/分钟,心音低钝,肝脏比入院时增大2cm,舌暗紫,指纹沉而色青,达于命关。治疗应首选

- A. 西地兰加参附龙牡汤
- B. 青霉素加生脉散
- C. 地塞米松加参附龙牡汤
- D. 西地兰加真武汤
- E. 地塞米松加麻杏石甘汤

【答案】 A

103. 患儿, 女, 2岁, 着凉感冒后胸闷气短, 恶心呕吐, 心悸, 乏力, 低热, 心率快, 心音低钝, 心肌酶升高, 心电图示ST段抬高, 低电压, 下列处理错误的是

- A. 安静卧床
- B. 避免情绪波动
- C. 易消化富营养饮食
- D. 加强体育锻炼, 增加运动量
- E. 营养心肌, 改善心肌代谢, 稳定心功能

【答案】 D

104. 患儿, 男, 5个月, 急性腹泻, 频繁呕吐2天, 检查头颅, 可能发现的体征是

- A. 凶门逾期不闭
- B. 凶门内陷
- C. 凶门高凸
- D. 凶门宽大, 头缝开解
- E. 凶门早闭

【答案】 B

105. 患儿,女,2岁,体重11kg。盛夏就诊,腹泻2天,量多次频,泻下急迫,大便呈黄色蛋花样,有少许黏液,精神稍差,皮肤弹性尚可,哭时有泪,尿黄量少。舌质红,苔黄腻,指放紫,大便常规WBC4~6/HP, RBC1~2/HP,应首先考虑的诊断是

- A. 轮状病毒性肠炎,轻度脱水
- B. 轮状病毒性肠炎,中度脱水
- C. 大肠杆菌肠炎,轻度脱水
- D. 大肠杆菌肠炎,中度脱水
- E. 急性细菌性痢疾,轻度脱水

【答案】 C

106. 患儿,男,8岁,颜面眼睑浮肿,小便短赤,下肢疮毒,舌红苔薄黄,脉滑数,实验室检查:尿蛋白(++),镜下红细胞20~30/HP,白细胞5~6/HP,血清补体明显下降。治疗应首选青霉素加

- A. 三妙丸合导赤散
- B. 麻黄连翘赤小豆汤
- C. 五苓散
- D. 真武汤
- E. 八正散

【答案】 A

107. 患儿, 女, 10岁, 因患癫痫而服用抗癫痫药物。继续服药2个月后, 出现头昏, 嗜睡, 上下前牙唇侧的牙龈增生, 增生的牙龈为淡红色硬质组织, 无肿痛, 不影响咀嚼功能, 逐渐减少抗癫痫药剂量, 同时给予钙剂, 1个月后增生的牙龈逐渐消失, 随访1个月后恢复正常。此患者服用的抗癫痫药可能为

- A. 硫喷妥钠
- B. 苯妥英钠
- C. 安定
- D. 苯巴比妥
- E. 卡马西平

【答案】 B

108. 患儿，男，4岁，一向偏食，不吃鱼肉蛋，仅食蔬菜，近日面色渐苍白，不愿活动，时而腹泻，心肺正常，肝脏于肋下3cm触及，脾未触及，血红蛋白60g/L，红细胞 $2.90 \times 10^{12}/L$ ，血涂片示红细胞大小不等，以小细胞为主，中心淡染区扩大。最可能诊断是

- A. 溶血性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 巨幼红细胞性贫血
- E. 营养性混合性贫血

【答案】 B

109. 患儿, 男, 6个月。夜惊多汗, 烦躁不安, 面色不华, 纳食不佳, 枕秃, 舌淡苔白, 指纹淡, 实验室检查: 血钙磷乘积稍低, 血碱性磷酸酶升高, 诊断为佝偻病, 其分期及证型是

- A. 活动早期, 肾精亏损
- B. 活动早期, 肾虚骨弱
- C. 活动早期, 脾气虚弱
- D. 活动期, 肾精亏损
- E. 活动期, 肾虚骨弱

【答案】 C

110. 患儿, 男, 3岁, 麻疹见疹已6日, 高热不退, 咳嗽气急, 鼻翼扇动, 口渴烦躁, 舌红苔黄, 脉数。其证型是

- A. 顺证, 见形期
- B. 顺证, 初热期
- C. 逆证, 热毒攻喉
- D. 逆证, 麻毒闭肺
- E. 逆证, 邪陷心肝

【答案】 D

111. 患儿, 男, 3岁, 夏季发病, 发热1天, 无汗, 口渴烦躁, 2分钟前突然抽搐。查体: 体温40. 2℃, 舌红, 苔黄, 脉洪数。中医辨证为

- A. 风热动风
- B. 暑邪致惊
- C. 温邪内陷
- D. 湿热疫毒
- E. 痰湿惊风

【答案】 B

112. 患者, 女, 45岁, 在针刺中, 突然出现头晕目眩, 多汗, 四肢发冷, 脉沉细。应首选的处理方法是

- A. 停止针刺, 立即起针
- B. 速饮糖水
- C. 针刺百会
- D. 针刺人中
- E. 灸足三里、关元

【答案】 A

113. 患者, 女, 43岁。关节疼痛, 屈伸不利, 痛处游走不定。治疗除取阿是穴及局部经穴外, 还应选用的是

- A. 膈俞、血海
- B. 肾俞、关元
- C. 足三里、阴陵泉
- D. 大椎、曲池
- E. 神阙、关元

【答案】 A

114. 患者, 女, 38岁, 腰部冷痛重着, 天气化阴雨风冷时加重, 治疗除取主穴外, 正应选用

- A. 腰阳关
- B. 膈俞
- C. 肾俞
- D. 次髎
- E. 足三里

【答案】 A

115. 患者, 女, 47岁, 头晕目眩, 急躁易怒, 口苦, 耳鸣, 舌红, 苔黄, 脉弦。治疗选取百会穴, 其操作方法是

- A. 毫针泻法
- B. 毫针补法
- C. 毫针平补平泻法
- D. 毫针补法加灸法
- E. 温针灸法

【答案】 A

116. 患者, 男, 50岁, 腰部疼痛10年余, 有劳伤史, 久坐加重, 痛处固定不移。治疗除取主穴外, 还应选用的穴位是

- A. 膏肓
- B. 膈俞
- C. 志室
- D. 腰阳关
- E. 环跳

【答案】 B

117. 患者, 女, 51岁, 久病漏下, 血色淡, 伴腰酸肢冷, 小腹冷痛, 喜温喜按, 舌淡, 脉沉细。治疗应选取的主穴是

- A. 气海、隐白、三阴交、百会
- B. 关元、隐白、三阴交、肾俞
- C. 肾俞、命门、气海、脾俞
- D. 关元、血海、水泉、百会
- E. 气海、肾俞、足三里、三阴交

【答案】 E

118. 患者, 男, 50岁。肩关节疼痛, 痛有定处, 抬举困难, 夜间痛甚, 劳累加剧, 治疗应首选

- A. 手太阳经穴
- B. 近取穴为主
- C. 局部近取穴与远取穴相结合
- D. 循经取穴
- E. 手少阳经穴

【答案】 C

119. 患者, 女, 46岁, 非周期性子宫出血, 量多、色紫红、质稠, 夹有血块, 腹痛拒按, 口干喜饮, 舌红苔黄, 脉滑数。治疗除取关元、三阴交、隐白穴外, 还应加

- A. 气海、百会
- B. 中极、阴交
- C. 归来、合谷
- D. 血海、水泉
- E. 曲泉、血海

【答案】 D

120. 患者, 女, 31岁, 患者三天前自觉右肋背部疼痛, 并逐渐出现疱疹, 呈现带状分布疼痛较剧, 口干苦、大便干、小便黄, 脉弦, 舌红苔黄。根据病情应取哪组经脉或腧穴为主

- A. 手足阳明经
- B. 局部阿是穴及相应夹脊穴
- C. 手足太阳经
- D. 手足太阴经
- E. 手足厥阴经

【答案】 B

(121~122题共用备选答案)

- A. 右上腹阵发性痛, 常于进食油腻、饱餐后发病
- B. 腹痛, 起病急骤, 病情迅速恶化
- C. 转移性右下腹痛
- D. 腰腹部绞痛, 伴有血尿
- E. 阵发性腹痛, 伴有呕吐、腹泻

121. 急性阑尾炎常见的临床表现是

122. 急性胆囊炎常见的临床表现是

【答案】 CA

(123～124题共用备选答案)

- A. 透托法
- B. 温通法
- C. 清热法
- D. 消法
- E. 补托法

123. 肿疡已成, 毒盛正气不虚, 尚未溃破或而脓出不畅者, 治疗应首选

124. 没有成脓的初期肿疡, 治疗应首选

【答案】 AD

(125~126题共用备选答案)

- A. 动力性肠梗阻
- B. 血运性肠梗阻
- C. 机械性肠梗阻
- D. 不完全性肠梗阻
- E. 绞窄性肠梗阻

125. 由于器质性病变导致肠腔变小, 使肠内容物通过发生障碍, 称为

126. 肠腔不通同时伴肠壁血运障碍, 称为

【答案】 CE

(127~128题共用备选答案)

- A. 直肠息肉
- B. 肛裂
- C. 直肠癌
- D. 直肠周围脓肿
- E. 直肠炎

127. 直肠触诊触及柔软光滑而有弹性的包块应考虑的是

128. 直肠触诊触及质地坚硬、表面凹凸不平的包块, 应考虑的是

【答案】 AC

(129~130题共用备选答案)

- A. 肾虚证
- B. 气血虚弱证
- C. 血热证
- D. 血瘀证
- E. 气滞证

129. 妊娠期阴道下血, 色红质稠, 腰腹坠胀作痛, 舌红, 苔黄, 脉滑数, 其证候是

130. 产后遍身疼痛, 关节刺痛, 恶露量少色暗, 舌紫暗, 脉涩, 其证候是

【答案】 CD

(131~132题共用备选答案)

- A. 高烧, 白带增多, 子宫及附件区压痛, WBC升高
 - B. 停经, 下腹痛, 阴道出血
 - C. 腹痛由脐周开始, 后转移至右下腹麦氏点
 - D. 不孕, 消瘦, 输卵管碘油造影呈串珠状
 - E. 卵巢囊肿病史, 运动后突发一侧下腹痛, B超检查囊肿消失, 盆腔有少量积液
131. 急性盆腔炎常见的症状是
132. 生殖器结核常见的症状是

【答案】 AD

(133～134题共用备选答案)

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 归肾丸
- D. 血府逐瘀汤
- E. 苍附导痰丸

133. 治疗闭经肝肾不足证, 应首选

134. 治疗闭经痰湿阻滞证, 应首选

【答案】 CE

(135～136题共用备选答案)

- A. 桂枝茯苓丸
- B. 血府逐瘀汤
- C. 失笑散
- D. 膈下逐瘀汤
- E. 桃红四物汤

135. 治疗子宫肌瘤气滞血瘀证, 应首选

136. 治疗子宫内膜异位症气滞血瘀证, 应首选

【答案】 DD

(137～138题共用备选答案)

- A. 头颅
- B. 胸胁
- C. 腹部
- D. 皮肤
- E. 四肢

137. 小儿水肿, 按诊的主要部位是

138. 婴儿颅内压增高, 按诊的主要部位是

【答案】 DA

(139～140题共用备选答案)

- A. 清热利湿
- B. 解表化湿
- C. 温脾化湿
- D. 运脾燥湿
- E. 利水渗湿

139. 胎黄湿热熏蒸证的治法是

140. 胎黄寒湿阻滞证的治法是

【答案】 AC

(141～142题共用备选答案)

A. 桂枝汤

B. 归脾汤

C. 玉屏风散

D. 六君子汤

E. 黄芪桂枝五物汤

141. 治疗小儿反复呼吸道感染营卫失和, 邪毒留恋证。应首选的方剂是

142. 治疗小儿反复呼吸感染肺脾两虚, 气血不足证。应首选的方剂是

【答案】 EC

(143~144题共用备选答案)

- A. 补肾纳气
- B. 补肺固卫
- C. 健脾化痰
- D. 温肺化痰, 止咳平喘
- E. 回阳固脱, 温肺平喘

143. 哮喘未发之时, 常怯寒自汗, 容易感冒, 发作前每有鼻塞流涕。其治法是

144. 哮喘发作, 喘息喉鸣, 痰多白沫, 形寒无汗, 四肢不温, 面色晦滞带青, 其治法是

【答案】 BD

(145～146题共用备选答案)

- A. 前后配穴
- B. 表里配穴
- C. 左右配穴
- D. 上下配穴
- E. 本经配穴

145. 胃脘痛取内关、足三里, 其配穴方法是

146. 肺病取中府、肺俞, 其配穴方法是

【答案】 DA

(147～148题共用备选答案)

- A. 足阳明胃经
- B. 手厥阴心包经
- C. 手太阴肺经
- D. 足太阴脾经
- E. 手太阳小肠经

147. 主治心、胸、胃、神志病的经脉是

148. 主治前头、口齿、咽喉病、胃肠病、眼病、神志病、热病的经脉是

【答案】 BA

(149-150题共用备选答案)

- A. 十二经脉
- B. 十五络脉
- C. 十二经别
- D. 十二经筋
- E. 十二皮部

149. 经络系统中, 具有维持人体正常运动功能的是

150. 经络系统中, 从十二正经中离入出合的是

【答案】 DC