

### 2019 年中医全科学（302）1800 个考前必看点

1. 一般适应综合征(GAS)分三期警戒期、阻抗期、衰竭期。
2. 代赭石具有的功效是降逆止呕。
3. 初孕妇最初感觉胎动的时间一般在妊娠 18~20 周。
4. 属于配伍禁忌的是人参与藜芦
5. 将手法归纳为“八法”的医家是吴谦。
6. 增强手指精细活动的作业训练是编织。
7. 心为五脏六腑之大主是由于心主神明。
8. 外科成为独立的专科始于周代。
9. “穷源竟委，作为是书”中“穷源竟委”意思是探究源流。
10. 络于舌本的经脉是足厥阴经。
11. “阴胜则阳病”的理论基础是阴阳的对立制约
12. 在“世常谓一怒不足以侵性”中，“慢侵”之义为伤害。
13. 首次记载用竹片夹板固定骨折的是晋葛洪《肘后救卒方》。
14. 痈的成脓期是 7 天左右
15. 医疗机构及其人员违反《传染病防治法》规定的情形，由其所在单位对直接责任人员给予行政处分。
16. 在“自役过差，百病兼结”中，“过差”之义为过度
17. 腹腔游离液体有多少时，移动性浊音阳性 100ml。
18. 能截疟、润肠的药物是生首乌。
19. 具有“贯心脉行血气”功能的是宗气。
20. 具有活血化瘀、行气止痛功用的方剂是血府逐瘀汤。
21. “夺血者无汗”的理论依据是津血同源
22. 具有补肾阳、益精血、强筋骨、调冲任、托疮毒功效的药物是鹿茸。
23. 诊断急性心肌梗死的确定性标志物为肌钙蛋白 T。
24. 治疗咽喉红肿疼痛，兼有肺热咳嗽痰多者，应首选射干。
25. 小儿患病后易趋康复的主要原因是脏气清灵。
26. 职业病是指由职业性有害因素直接引起的疾病。
27. 乳痈初起可选用金黄散。
28. “肇颁四方，景式万代”中“景式”的意思是做最好的模式。
29. 肾系病属于肾不纳气者，若见少气不足以息，动则喘甚，舌淡苔白脉虚弱，可用参蛤散合人参胡桃汤。
30. 典型的心肌梗死表现为坏死性 Q 波。
31. 球囊及椭圆囊的生理作用是感受直线加速运动。
32. 羚角钩藤汤和天麻钩藤饮均具有的作用是平息肝风。
33. 在“望之俨然，宽裕汪汪”中，“宽裕”之义为气度宽宏。
34. 患者头晕目眩，面白无华，爪甲不荣，视物模糊，舌淡，脉细，宜诊为肝血虚证。
35. 在病例对照研究中，病例组有暴露史的比例显著高于对照组，则认为该病与暴露存在联系。
36. 葛根黄芩黄连汤的主治病证是协热下利。
37. 岐骨至脐中的骨度分寸是 8 寸。
38. 具有藏泄互用关系的两脏是肾与肝。
39. 天王补心丹中配伍茯苓的用意是宁心。
40. 《黄帝内经》将子宫称为女子胞。
41. “饥寒不赡”中的“赡”意思是富足。
42. 使用逐水方药，时间不可过久，应遵循衰其大半而止
43. “决渎之官”指的是三焦。
44. 白痞的出现是由于湿郁汗出不彻。
45. 丹毒的主要病机是血分有热。

46. 在“夫服药求汗，或有弗获；而愧情一集，则涣然流离”中，“涣然”之义为消散散开的样子。
47. 在“下及诸子传说皆充秘府”中，“府”之义为内廷藏秘籍之处。
48. 结肠造影的特征性表现是结肠袋。
49. “人芝兰之室久而不闻其香，入鲍鱼之肆久而不闻其臭。”这说的是感觉的适应性
50. 在“呻吟无赖”中，“无赖”之义为无奈。
51. 在“尔有文德，恶用珪璋”中，“珪璋”之义为为官；官印。
52. 虚热证的病理基础是阴偏衰。
53. 在“夫医药为用，性命所系”中，“为”之义为相当于之。
54. 血瘀型小便不通，宜选用的治法为活血化瘀，行气利水
55. 饮郁化热，烦躁而喘，脉浮，方选小青龙加石膏汤。
56. 脊髓损伤中预后最好的类型是脊髓震荡。
57. 在“父兄见出，妻息长诀”中，“息”之义为儿女
58. 在“人有此三者，是谓坏府”中，“坏府”之义为脏气败坏。
59. 单侧眼球下陷见于 Homer 综合征。
60. 消渴的病变涉及多个脏器，尤以肾最为关键。
61. 手足厥寒，口不渴，脉沉细而欲绝。宜选当归四逆汤。
62. 从脏腑论治，所谓调冲任，即调肝肾。
63. 魄门位于大肠末端
64. 提出黄芩、白术为安胎之妙药的是朱丹溪。
65. 在“执志箕山，犹当容之”中，“箕山”之义为退隐。
66. 在“食黍与臯。其器宏以臯”中，“臯”之义为深。
67. 传染性非典型肺炎发病时间集中在冬春季
68. 脾主升清的内涵是脾气将水谷精微上输心肺。
69. 治疗虚火牙痛的组穴是合谷、下关、颊车、侠溪、足临泣。
70. 《千金要方》鲤鱼汤常用于治疗胎水肿满，其中鲤鱼的主要功效是行水消肿。
71. 视物旋转动荡，如在舟车之上，称为目眩。
72. 全科医学专科的服务对象是所有人
73. 在“故五脏六腑之盈虚，血脉荣卫之通塞，固非耳目之所察，必先诊候以审之”中，“候”之义为脉候。
74. 在“道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物”中，“物”之义为物象。
75. 败毒散的药物组成有独活、茯苓。
76. 在“因疾抽簪，散发林阜”中，“阜”之义为土山。
77. 针眼类似于西医学的麦粒肿。
78. “阴盛者胜之以阳”所说明的阴阳关系是阴阳对立
79. 患者高热烦渴，脉疾无力，汗出如油，热而沾手者属于暑伤津气。
80. 久泄不愈，腹部坠胀，少气懒言，倦怠，头晕目眩，舌淡脉弱，证属气虚证
81. 鸡血藤的功效为行血补血调经，舒筋活络。
82. 为保证材料真实，也为了维护心理治疗本身的声誉及权威性，因此心理治疗要坚持保密原则。
83. 舌质淡嫩，舌苔白润，多主虚寒证。
84. 屡孕屡堕，孕后腰膝酸软，头晕耳鸣，夜尿频多，面色晦暗，舌质淡，苔薄白，脉细滑尺脉沉弱。治疗首选方补肾固冲汤。
85. 氮氧化物与碳氢化物在紫外线的作用下易发生反应生成  $O_3$ 。
86. 女子在青春期，月经异常责之于肾。
87. 行政责任的追究机关的行政行为具有强制性。
88. 在“澍案：王本并注是也”中，“案”之义为考证。
89. 我国发生肝癌最常见的病因是肝硬化。
90. 在“自仲景以来，发明其书者，不可以数计中，”发明意为阐明

91. “或益之以畎洫，而泄之以尾闾”用的修辞手法为借喻。
92. 在法去其旧而新是图中，新是图语序特点是动词宾语前置。
93. 对流动人口中的传染性非典型肺炎病人、疑似病人处理的原则是就地隔离、就地观察、就地治疗。
94. 在“植发冲冠”中，“植”之义为竖立。
95. 病例对照研究中，比值比(OR)的含义是病例组的暴露比值与对照组的暴露比值之比。
96. 月经先后不定，经量或多或少，有小血块，经行乳房胀痛，经后腰酸无力；舌淡苔润，脉弦细，证属肝郁肾虚证。
97. “靚奥升堂”的喻义是深入探究医书奥理。
98. 清热燥湿药中，尤善于清上焦湿热的药物是黄芩。
99. 芍药、五味子在小青龙汤中属佐制药。
100. 根据五行相克的关系中，土的“所胜”是水
101. “不可曲止也”中的“曲”意思是详尽。
102. 在“上以中贵人有疾”中，“中贵人”是指受宠宦官。
103. 少阳经头痛的部位是头之两侧，并连及耳部。
104. 诊断不寐一般需睡眠障碍出现3周以上。
105. 失枕往往起病较快，病程较短，1周内多能痊愈。
106. 肱二头肌长头腱滑脱检查时，屈肘90°内外旋转时滑动
107. 当大汗、大吐、大泻等津液大量丢失时，气亦随之大量外脱是因为津能载气。
108. 在“疾之初作，大热发四体中”中，“四体”之义为此指全身。
109. 大承气汤用治热结旁流，体现的治法是通因通用。
110. 负责全国中医药管理工作的部门是国务院中医药管理部门。
111. “见肝之病，知肝传脾”，从五行之间的相互关系看，其所指内容是木乘土
112. 在“俗民既不能生生而务，所以煞生”中，“煞”之义为损伤
113. 在“然有阴虚火动，或阴阳两虚，湿热自盛者，又当消息而用之”中，“消息”之义为斟酌考虑
114. “能会精神于相与之际”一句中，“会”是集中。
115. 在“徒执方以疗病，恶能保其不殃人乎？适为之愍惻”中，“愍惻”之义为哀怜悲痛。
116. 在“用细茶脚汤煮之”中，“细茶”之义为明前茶。
117. 带下过多之热毒蕴结证治宜首选五味消毒饮。
118. 导赤散的功用是清心利水养阴。
119. 能防御外邪入侵，又能娩出胎儿，胎盘的门户是阴户。
120. 治疗肝气郁结而致的月经不调，应首选香附。
121. 浮滑脉的主病为表证夹痰。
122. 中等量咯血可见于二尖瓣狭窄。
123. 锁骨外1/3骨折与肩脱位的主要鉴别点是方肩畸形。
124. “所注排抉隐奥，多所发明”中的“抉”意思是择取。
125. 在“众凶不闻”中，“凶”之义为喧闹声。
126. 在“此皆众工所共知也”中，“工”之义为医生
127. 根据阴阳属性的可分性，五脏中属于阴中之阴的脏是肾
128. 在“余初读《灵》《素》诸书，觉其经义深，脉理错杂，每若望洋意沮”中，“望洋”之喻义为力不从心，无可奈何。
129. 经行浮肿因于虚者主要为脾肾阳虚。
130. 医务人员称呼病人的姓名而不是叫床号，这是为了满足病人的被关心尊重的需要。
131. 肺胀首先在肺，继则影响到脾、肾。
132. 用于风寒感冒，巅顶头痛者：宜用藁本。
133. 瞳孔扩大可见于视神经萎缩。
134. 有头疽的整个病程为四周。
135. 关格的临床特征为小便不通与呕吐并见。

136. “六书”中“比类合谊，以见指撝，武信是也”所指的造字法是会意字
137. 与情志扣郁关系密切的是肝失疏泄。
138. 在“舌娇然而不下”中，“娇”之义为翘起
139. 对病人利害共存时，要求临床医师保证最大善果和最小恶果的医学伦理学原则是有利患者。
140. 黄疸伴明显皮肤瘙痒可见于阻塞性黄疸。
141. 脏躁的治疗原则是养心安神，甘润健脾。
142. 热哮证，外有表证，宜用越婢加半夏汤。
143. 流行性腮腺炎可引起淋巴细胞绝对值增多。
144. 反常呼吸往往发生于多根肋骨多处骨折。
145. 小柴胡汤的组成是柴胡，黄芩，半夏，人参，炙甘草，生姜，大枣。
146. 清热解毒药中，被誉为“疮家圣药”的药物是连翘。
147. “阴亢者，胜之以阳”所说明阴阳之间的关系是阴阳对立
148. 功用与枳实相同，但作用缓和，以行气宽中除胀为主的药物是枳壳。
149. 易引起葡萄球菌食物中毒的食品是剩米饭
150. 公孙配内关属于上下配穴法。
151. 自我意识的形成与培养应主要放在少年期。
152. “在心易了，指下难明”，意在说明脉象的变化难以把。
153. 生化汤除活血化瘀、止痛外，还具有的功用是温经。
154. 方药配伍寓有“治风先治血，血行风自灭”之意的方剂是消风散。
155. 在“论中主治诸方，隶别门者注明见某门字样”中“隶”之义为附属。
156. 位术前病人既想通过手术解除病痛，又担心手术会影响机体的某些功能，此时所形成的动机冲突是趋避冲突。
157. 患者因病不能自行调节体位，属于被动体位。
158. 一般而言，对应激性事件了解越多，结果更倾向于压力减轻
159. 行于上肢内侧中线的经脉是手厥阴经。
160. 损伤疼痛气滞致痛的治法是理气止痛。
161. 治疗心胸、胃疾病宜选用内关、公孙
162. 导致发生医疗事故的直接原因是行为主体违反医疗卫生管理法律法规。
163. “子宫附件”是指输卵管和卵巢。
164. 我国的慢性肝炎主要为乙型。
165. 六淫中会使病程延长，难以速愈的病邪是湿邪。
166. “见肝之病，知肝传脾”的病机传变是木乘土
167. 在“若夫法天则地，随应而动”中，“法”之义为效法。
168. 既能润肠通便，又能利水消肿的药物是郁李仁
169. 最有助于膀胱癌确诊的检查项目是膀胱镜。
170. 研磨性外力引起的半月板损伤多见外侧半月板。
171. 邪热郁蒸型自汗的特点是蒸蒸汗出。
172. 叩诊肝浊音界下移见于右侧张力性气胸。
173. 牡蛎散煎煮时，原方注明应加入的药物是小麦。
174. 在“夫医道所兴，其来久矣中，”其的意义是医学。
175. 痰浊痹阻之胸痹宜首选瓜蒌。
176. 外耳道有血液或脑脊液流出，首先应考虑的是颅底骨折。
177. 当归、肉桂同用的方剂是苏子降气汤。
178. 在“表邪未已，迤邐内传”中，“迤邐”之义为曲折连绵。
179. 区别慢性活动性胃炎和非活动性胃炎的主要依据是中性粒细胞浸润的多少。
180. 生活事件属于社会性应激源。
181. 既能凉血止血，又能活血祛瘀的药物是茜草。
182. 口淡乏味，甚至口中无味，此属脾胃虚弱。

183. 杏林佳话歌颂的是董奉。
184. 在“此见人之绝于物而参天地”中，“绝”之义为超越。
185. 晚期肝硬化患者肝浊音区的变化是缩小。
186. 在“登稼披垄，不获不刈”中，“登”之义为成熟。
187. “扁鹊乃使弟子子阳厉针砥石”中的“厉”意思是研磨。
188. 抢救刺激性气体中毒的关键是防治肺水肿
189. 头穴中，颞前线主治下偏头痛、运动性失语、周围性面瘫。
190. 以五行生克关系推断，出现主色胜客色的情况其病为逆
191. “凶填”的形成，主要由于外感时邪。
192. 《尔雅》的编排方法是主题事类。
193. 关节脱位合并骨折者应具有严重肿胀、皮下瘀斑。
194. 称肝为“罢极之本”，主要是由于肝有贮藏血液的功能。
195. “阳病治阴”的方法适用于阴虚阳亢。
196. 肺与肝的关系主要表现在气机升降方面
197. 参苓白术散中具有芳香醒脾之功效的药物是砂仁。
198. 外感凉燥，治宜选用杏苏散。
199. 痹证日久，可由经络累及脏腑出现相应的脏腑病变，以心病变较为多见。
200. 功能舒筋活络，并善于缓解拘挛疼痛的药物是木瓜。
201. 在“村儒举目皆是”中，“举”之义为满。
202. 治疗肝经郁火型经行吐衄，最佳方剂是清肝引经汤。
203. 肺癌常见的组织学类型是腺癌。
204. 醋制甘遂可降低毒性。
205. 对挫折的积极应对反应是升华
206. 治疗气血虚虚寒，痈肿脓成不溃，或溃后久不收口，肾阳不足，畏寒肢冷，阳痿，尿频，应首选肉桂。
207. 寒邪客胃之胃痛，若兼恶寒、头痛表证者，常加藿香、苏叶等。
208. 过期妊娠是指平时月经周期规律，妊娠达4周仍未临产。
209. 具有活血行气，祛风止痛功效的药物是川芎。
210. 在“渠亦不自省其过，虽终老而不悔中，”终老之义为到老。
211. 手、足三阳经在头部的分布规律是阳明在前，少阳在侧，太阳在后。
212. 《中华人民共和国药品管理法》规定的药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病的物质。
213. 慢性支气管炎早期肺部X线表现是无特殊征象
214. 五味中入肝的是酸。
215. 容易引起气血凝滞不通的病邪是寒邪。
216. 以清宣温燥，润肺止咳为主要功用的方剂是桑杏汤。
217. 泄泻与痢疾最主要鉴别点为有无赤白脓血便。
218. 生命神圣与价值原则既是生物医学伦理学也是一般伦理学的最基本的原则。
219. 具有消食化积，活血散瘀功效的药物是山楂。
220. 症见手足疼痛，肤色紫暗发凉，得温痛减，月经衍期，经色暗紫脉沉迟而涩，属血寒证
221. 在“不得道听途说，而言医道已了”中，“了”之义为明白。
222. 在“解其装，无长物”中，“长”之义为多余。
223. 医院工作人员在医院内获得的感染属于医院感染。
224. 在“不料名纸一投，蒙爹门延请”中，“名纸”之义为名片。
225. 风湿热痹的治疗原则是清热通络，祛风除湿。
226. 调经重在治本，调经应以肾为主。
227. 退虚热、除有汗之骨蒸的是地骨皮。
228. “阳病治阴”的方法适用于阴虚阳亢证

229. 胃癌的好发部位是胃窦部。
230. 在“乡居僻处及暮夜叵测迎医不给者中叵”之义为不可。
231. 五行递相克制的顺序是木、土、水、火、金
232. 治疗寒湿困脾证的最佳方药是胃苓汤。
233. 在手小指末节尺侧，距指甲角 0.1 寸的腧穴是少泽。
234. 在“于文武火中炮令皴坼”中，“皴坼”之义为裂开。
235. 呕吐与呃逆在病理上主要相同点为胃失和降，气逆于上
236. 在“母郑安人以暴疾终，既含不瞑”中，“安人”之义为封建朝廷给妇女封赠的称号。
237. 阴虚风动证的主要临床表现为颜面潮红，手足心热，四肢瘛瘲
238. 苏子降气汤主治病证的病机是痰涎壅肺，肾阳不足
239. 妊娠数月，面浮肢肿，下肢尤甚，腰酸乏力，小便不利，舌淡苔白润，脉沉迟。最常用的方剂是真武汤。
240. 制方以“常养其阴，阴与阳齐则水能制火”为理论依据的方剂是左归丸。
241. 在“翌日天甫明，来视予脉”中，“翌日”的意义是次日。
242. 在“有最畏出奇，惟求稳当”中，“噎奇”之义为意外。
243. 少用丸剂的方剂类别是清热剂
244. 水痘患儿应隔离至皮疹完全结痂。
245. 在“张介宾虽似涉乎语怪”中，“语怪”之义为谈论怪异。
246. 高血压伴肾功能不全、高血钾时，选用 ACEI 类药物应慎重。
247. 管理本行政区域医师工作的机构是县级以上人民政府卫生行政部门。
248. 在“兴言撰缉，勒成一家”中，“勒”的意义是编写。
249. 最早对汉字结构方式进行系统研究的著作是《说文解字》。
250. 在“遂考竟佗”中，“考竟”之义为狱中处死。
251. 清暑益气汤（《温热经纬》）的功用是清暑益气，养阴生津。
252. 四逆汤与当归四逆汤二方组成中均含有的药物是甘草。
253. 按三焦辨证，属上焦病证的是逆传心包
254. 戊型肝炎青壮年多见，男性多于女性。
255. 患者身患外感实热病证，兼见喘喝，气不能接续，甚则心悸气短。其病机是实中夹虚。
256. 在“死生之域”中，“同”之义为认为。相同。
257. 第十届全国人大常委会第十一次会议通过修订的《中华人民共和国传染病防治法》正式施行日期是 2004 年 12 月 1 日。
258. 症见咳嗽气粗，咯痰粘白或黄，咽痛或咳声嘶哑，或有发热，微恶风寒；口微渴。舌尖红，舌苔薄白或黄，脉浮数。证属风热犯肺。
259. 肺部持续存在的局限性干啰音提示的疾病是支气管内膜结核。
260. 肾开窍于耳。
261. 小柴胡汤中用量最重的药是柴胡
262. 月经后期常与月经过少并见，其共同病因病机有血虚。
263. 具有补血、滋阴、止血功效的药物是阿胶。
264. 每逢经期肢体疼痛麻木，肢软乏力，月经量少，色淡质稀，其辨证为血虚。
265. 感冒风寒轻证所用代表方剂是荆防达表汤。
266. 乌梅丸的主治病证是蛔厥。
267. 具有解表通便功能的方剂是防风通圣散。
268. 咽喉淡红漫肿者，属痰湿凝聚。
269. 属于既往史的是预防接种。
270. 具有镇静安神、利尿通淋功效的药物是琥珀。
271. 补阳还五汤中用量最大的药物是黄芪。
272. 望形神的改变对诊断有重要意义，若头晕困倦，面色苍白，肢冷汗出，甚则昏不知人，多为妇科血症。
273. 《素问·六节藏象论》说：“肾者主蛰，封藏之本，精之处也。”。

274. 高血压急症治疗药物中，降压最迅速的是硝普钠。
275. 在“故论其书，以序方技为四种中”，“序”之义为依次排列。
276. 天王补心丹与朱砂安神丸组成中均含有的药物是生地黄。
277. 清胃散中具有清热解毒作用，又寓“火郁发之”之意的药物是升麻。
278. 被誉为润肤公主的水果是芒果。
279. 实热证患者的典型面色应是满面通红。
280. 喉痹的病位主要在咽黏膜。
281. 顿咳常见于小儿。
282. 海金沙具有的功效是利尿通淋，止痛。
283. 痰湿、饮的产生多与肺、脾、肾功能失调有关。
284. 按照《中华人民共和国传染病防治法》，属于乙类传染病分类，但依法采取甲类传染病的预防、控制措施的是感染高致病性禽流感。
285. 属于不稳定性骨折的是斜形骨折。
286. 治疗梅毒，或因梅毒服汞剂中毒而致肢体拘挛，宜选用的药物是土茯苓。
287. 在治疗瘀血病证时，常配以行气、补气药，其理论根据是气能行血。
288. 膝关节外伤性滑膜炎关节腔内积液的颜色一般呈粉红色。
289. 参苓白术散中具有芳香醒脾之功效的药物是砂仁。
290. 并殖吸虫胸膜炎与结核性胸膜炎的主要鉴别点是胸、肺体征。
291. 中医辨证疫毒痢相当于现代医学细菌性痢疾的临床类型是中毒型菌痢。
292. 受卫生行政部门委托的机构或组织应当按照医师执业标准对医师进行定期考核，考核的内容是医师的业务水平、工作成绩和职业道德状况。
293. 在“时大唐宝应元年岁次壬寅序”中，“次”之义为值。
294. 心左缘上段的结构是主动脉结。
295. “阴胜则阳病”指的是阴寒过盛，阳气被伤。
296. “考验首服”的译释是拷打审问，低头服罪。
297. 疝属暑热侵淫型方用消暑汤加减。
298. “心病宜食薤”的记载，出于《灵枢·五味》。
299. “大寒触犯心君”是指气候寒冷可诱发或发生胸痹。
300. 产后三冲是指冲心、冲肺、冲胃。
301. 体现“以泻代清”治法的代表方剂是凉膈散。
302. 医疗机构配制制剂必须取得省级药品监督管理部门批准发给的《医疗机构制剂许可证》。
303. 在“然吾乡诸医鲜克知之者”中，“克”之义为能够。
304. 风入经络而见口眼歪斜的最佳选方是牵正散。
305. 阳损及阴的病机，主要是指阳气虚损，累及阴液化生不足。
306. 与神志活动关系最密切的脏是心。
307. 清气化痰丸的赋形剂为姜汁。
308. 充血性心肌病的X线所见是肺淤血出现间质性肺水肿。
309. 鉴别太阳伤寒证与太阳中风证最有意义的是有无汗出。
310. 最早记载用海藻、昆布治疗瘰疬的著作是《肘后方》。
311. 头晕目眩、口苦呕恶，烦躁不寐，惊悸不宁，胸闷喜太息，苔黄腻，脉弦滑，属胆郁痰扰。
312. 吐酸一证的治疗原则治肝为根本。
313. “诸寒收引皆属于肾”出自《素问·至真要大论》。
314. 心悸时严重脉律失常与疾病预后的关系最早记载于《内经》。
315. 在“古方能使其各遂其性”中，“遂”之义为顺应。
316. 经络与带下的生理、病理直接相关的是任脉。
317. 正常成人心率在正常范围时，P-R间期为0.12~0.20s。

318. 产后突感一侧下腹撕裂样剧痛，阴道少量出血，血压下降，血红蛋白下降，最可能的诊断是异位妊娠。
319. 脉来一息不足四至，搏指无力者的主病是虚寒证
320. “即各与药，明旦并起”中“起”的意思是病愈
321. 症状具有做作、夸张或富有感情色彩的神经症类型是癔症。
322. 胸膜摩擦音最易听到的部位是腋中线第5~7肋间。
323. 天行赤眼，俗称为红眼病
324. 寒凝厥阴之肝系病，而见少腹冷痛及寒疝，可用暖肝煎治疗。
325. 高热是指体温在39.1℃~41℃
326. 二尖瓣杂音在左侧卧位体位听诊最清楚。
327. 最早提出胃脘痛与肝脾有关的著作是《内经》
328. “穹而达中，刻题于侧中穹”的意思是凿成孔窍。
329. 太阳之为病脉浮头项强痛而恶寒”（《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》第1）含有的修辞手法是分承。
330. 在“配临溪吴氏，举子三”中，“举”之义为生养。
331. 在“仓猝不可得”中，“仓猝”之义为匆忙
332. “穹而达中，刻题于侧”中“题”的意思是名称。
333. 杀灭所有的微生物称为菌。
334. 泻白散主治病证的发热特征是皮肤蒸热。
335. 胃火炽盛，消谷善饥，烦渴多饮者，治疗宜选用黄连。
336. “若子子然离群而独立”中的“子子然”意思是孤单的样子。
337. 消化道线诊断目前最佳的检查方法是钡剂双重对比造影检查。
338. 血分证的病机特点是动血动风耗阴。
339. 蜜制桑叶多用于润肺燥。
340. 可与金石贝壳类等药物同用，以助其消化的药物是神曲。
341. 妊娠以后，呕吐不食，呕吐清涎，神疲思睡，舌淡，苔白润，脉缓滑无力，中医辨证为胃虚。
342. 具有温肾阳、温脾阳、温通血脉、引火归原功效的药物是肉桂。
343. “寒者热之”的所属的治法是正治法。
344. 健康教育的核心问题是促进个体或群体改变不健康的行为与生活方式
345. 在“唏以朝阳”中，“唏”之义为晒。
346. 鉴别细菌性痢疾和阿米巴痢疾，最可靠的是大便检出病原体。
347. 脘腹胀闷，口腻纳呆，泛恶欲呕，口淡不渴，腹痛便溏，头身困重，舌体淡胖，舌苔白滑，脉濡缓，证属寒湿困脾证
348. 在“时于先生郭子斋堂，受得先师张公秘本”中，“斋堂”是指书房。
349. 暑湿伤表证的代表方剂是新加香薷饮。
350. 根据《内经》五脏化五液的理论，化液为泪的脏是肝。
351. 风寒喉痹的治法宜选疏风散寒，宣肺利咽。
352. 妇女特有的病种归纳为经、带、胎、产、杂。
353. 癫痫与郁病的鉴别关键是有无自我控制能力。
354. 在面部，耳屏上切迹前，下颌骨髁状突的后方，张口呈凹陷处的穴位是耳门。
355. 舌质红，苔黄腻，多见于湿热内蕴。
356. 但咳，身热不甚，口微渴，脉浮数。选方为桑菊饮。
357. 县级以上人民政府卫生行政部门，具体负责组织突发公共卫生事件的调查、控制和医疗救治工作。
358. 在“至其当发，间不容瞋”中，“间不容瞋”之义为比喻刻不容缓。
359. 暑邪伤人，可见气短、乏力等症，其原因是暑性升散，伤津耗气。
360. 患者肠胃燥热，津液不足，大便干结，小便频数，治宜用麻子仁丸。
361. 药物组成中含有地黄、麦冬、五味子的方剂是大定风珠。

362. 在“越明年，挺然百余，其密如簣，而竹盛矣”中，“簣”之义为竹席。
363. 与人的精神、意识、思维活动关系最密切的脏是心。
364. 检查脊柱应采取的正确体位是站立位或卧位。
365. 耳穴定位中，在屏间切迹内，耳甲腔的前下部，即耳甲 18 区的耳穴是内分泌。
366. 医患之间的道德关系是信托关系。
367. 耳尖放血可治疗目赤肿痛。
368. 指伸肌腱末端断裂后手指可能出现的畸形是锤状指。
369. 《诸病源候论》将前起阴蒂，后至阴唇系带，左右大、小阴唇之间的前后左右，称为四边。
370. 纠正严重休克时，至少应备足全血 2000ml~3000ml。
371. 救母丹出自《傅青主女科》。
372. 形寒肢冷，心悸怔忡，胸闷气喘，神疲乏力，腰膝酸软，唇甲青紫，尿少水肿，舌淡紫，苔白滑，脉弱，证属心肾阳虚证。
373. 判断骨髓增生程度的主要标准是成熟红细胞/有核细胞。
374. 主要经输血传播的传染病是丙型肝炎。
375. 手少阴心经的郄穴是阴郄。
376. 患者心悸怔忡，形寒肢冷，浮肿尿少，唇、甲、舌暗淡青紫，脉沉细微，宜诊为心肾阳虚证。
377. 开窍药内服多入丸散。
378. 口角糜烂的原因是核黄素缺乏。
379. 胸骨压痛常见的疾病是白血病。
380. 在“然后附意阐发，庶晰其蕴”中，“蕴”之义为深藏的含义。
381. 白睛浮肿，赤痛较甚，胞睑红肿，眵多胶结，热泪如汤，兼见头痛鼻塞，恶寒发热，尿赤便秘，苔黄脉数。本病辨证属风热并重。
382. 肝脾血瘀型鼓胀的治法是活血化瘀，行气利水。
383. 在“或更以大热之药救之，以苦阴邪，则他证必起，非所以救白虎也”中，“或”之义为如果。
384. 同病异治之“异”，是指证候之异。
385. 急性血吸虫病的好发季节为夏秋季节。
386. “太尉黄琬辟”中的“辟”意思是征召。
387. 心肌梗死后二级预防具有肯定疗效的药物组合为阿司匹林+美多心安。
388. 对患者享有知情同意权的正确理解是完全知情，必须签字同意。
389. 形成神的主要物质基础是血液。
390. 跌扑骨折、瘀阻肿痛等症，最宜选用的药物是自然铜。
391. 具有推动呼吸和行血气等作用的气是宗气。
392. 针刺浅薄部位腧穴，应用提捏进针法。
393. 在“然则，秋燥可无论乎”中，“然则”之义为既然如此，那么。
394. 开始有胎动的时间是 4 个月后。
395. 地机穴位于内踝尖与阴陵泉穴的连线上，阴陵泉下 3 寸。
396. “藏府治内，经络治外”中的“治”意思是主宰。
397. 在“我闻在昔鲧涇洪水，汨陈其五行”中“汨”之义为扰乱。
398. 导赤散中的君药为木通、生地。
399. 在“然升峻者，患于垂上而不足”中，“垂”之义为接近，将近。
400. 鼻腔的检查方法主要有收缩鼻腔黏膜法。
401. 心悸，心痛，气短，自汗，面色白，畏寒，舌淡苔白，脉弱，证属心阳虚证。
402. 肝郁化火所致的失眠，所应用的治疗方法是疏肝泻热，宁心安神。
403. 外科营养中的 TPN 是指完全胃肠外营养。
404. 在“逆其根，则伐其本，坏其真矣”中，“真”的意义是元气。
405. 足厥阴肝经与足太阴脾经循行交叉，变换前中位置，是在内踝上 8 寸处。

406. 症见胸闷纳呆，口渴欲饮，腹胀，小溲短赤，大便不爽。舌红，舌苔黄腻，脉濡滑而数。属湿邪阻滞，热重于湿。
407. 阴挺下脱的临床证型有气虚与肾虚。
408. 淤胆型肝炎主要是以肝内胆汁淤积为特征。
409. 乙肝五项检测指标中对机体有保护意义的是抗-HBs。
410. 在“与桐、雷众记，颇或瑑驳”中，“瑑驳”之义为舛错杂乱。
411. “渐固膏肓，期于天折”中“固”的意思是深入。
412. 肝气犯胃之胃痛，主症为胃脘胀闷，攻撑作痛。
413. 在“能存八动之变，五胜更立呻中”，“存”之义为察看。
414. 在“壮士之怒，赫然殊观”中，“殊观”之义为面容大变。
415. 黄斑区距视神经乳头约 3mm。
416. 饥不欲食，可因胃阴虚所致。
417. 定痫丸出自于《医学心悟》
418. 治疗慢性病毒性肝炎的最关键措施是抗病毒。
419. 中心型肺癌最典型 X 线表现的是肺门区肿块。
420. 初步提出内伤杂病与外感病之厥的不同点的医著是《卫生宝鉴》。
421. Brunnstrom 神经生理疗法治疗脑卒中偏瘫的重点是利用张力性反射与协同模式改善运动控制。
422. 腹部于清晨空腹出现振水音，最可能的是幽门梗阻。
423. 外感热病，热入血分，宜选用犀角地黄汤。
424. 《中华人民共和国药品管理法》明确规定国家发展现代药和传统药。
425. 瓜蒌薤白白酒汤等治疗胸痹的方剂出于《金匱要略》。
426. 术后尿潴留常见于全身麻醉后。
427. 眩晕的主要特征是目眩、头晕。
428. 深吸气时脾脏在左肋下 4 cm 但未超过脐水平，临床为脾大中度。
429. 阳痿的记载最早见于《内经》。
430. 可引起血清总胆固醇增高的是糖尿病。
431. 霍乱病人最早出现的病理生理改变是大量水分及电解质丢失。
432. 患者白睛发红，多为肺火。
433. 血瘀型经期延长的首选方剂桃红四物汤合失笑散。
434. 超过有效期的药品按劣药论处。
435. 治疗肝火上扰型不寐证的组穴首选风池、行间、足窍阴、神门。
436. “每一书已，向辄条其篇目”中“条”意思是分条列出。
437. 在“咻过于辛，精神乃央”中，“央”之义为尽也。
438. 下焦虚寒或寒客胞宫所致的月经不调、痛经、宫冷不孕、胎漏下血、胎动不安宜选用的药物是艾叶。
439. 在人禀五常，因风气而生长中，“风气”之义为自然气候。
440. 病原体侵袭人体后，不出现或仅出现不明显的临床表现，但通过免疫学检查可发现对入侵病原体产生了特异性免疫反应，应称为隐性感染。
441. 肉豆蔻与白豆蔻均具有的功效是温中散寒，行气消胀。
442. 治疗风火牙痛，除选取主穴外，应加用的腧穴是外关、风池。
443. 在“头倾视深，精神将夺矣”中，“夺”的意义是丧失。
444. 在“中道应宿封股进之”中，“剗股”的译释应当是精心侍奉而尽孝心。
445. 百合固金汤组成中含有的药物是玄参、桔梗。
446. 善治寒疝腹痛、睾丸肿痛的药物是荔枝核。
447. 血府逐瘀汤除活血化瘀外，还具有的功效是行气止痛。
448. 五行中具有“润下”特性的是水。
449. 具有祛风胜湿止痛功效的药组是防风、羌活、藁本。
450. 在“凡会膳食之宜”中，“会”之义为调和。

451. 根据阴阳属性的可分性，五脏中属于阳中之阳的脏是心。
452. 肺肾精伤导致的音哑和失音属于“金破不鸣”。
453. 中国历史上有记载的第一个外科名医是医的。
454. 既善疏肝又能暖肝的药物是吴茱萸。
455. 气滞血瘀所导致的胸胁刺痛，日久不愈者，宜选用血府逐瘀汤。
456. 吸气性呼吸困难见于甲状腺肿大。
457. 在“怀玉者不炫”中，“怀玉”之义为怀才。
458. 苔质致密，颗粒细小，融合成片，属腻苔。
459. 芍药汤的功用是清热燥湿，调和气血。
460. 新石器时代已产生的外科手术器械为砭镰。
461. 语颤减弱，叩诊浊音，呼吸音明显减弱。可能的病因是胸腔积液。
462. 霍乱在我国的流行特点为地方性流行。
463. 宫环出血脉弦涩是肝郁血瘀证。
464. 在“此治劳之三本，宜先切究也”中，“切究”之义为深入研究。
465. 社会性心理应激源主要指人际冲突。
466. 《素问·六元正纪大论》：“民病寒热。王冰注：“寒热，虐也。”此条的注释方法是对释法。
467. 既能祛风湿，又能补肝肾、强筋骨、安胎的药物是桑寄生。
468. 症见头晕耳鸣，两目干涩，胁肋灼痛，面部烘热，脉弦细数，属肝阴虚。
469. 中医子之系(精索)在脏腑归属上属于肝。
470. 在“然惟于此，而不敢自信矣”中，“唯”之义为思。
471. 在“真气不荣，则痰动于体，故谨医砭以救民”中，“谨”之义为慎守。
472. 猪苓汤中配伍阿胶的用意是滋阴润燥。
473. 在“予窥其人，啐然貌也”中，“啐”之义为润泽。
474. 最早提出“五不女”的书籍是《广嗣纪要》。
475. 养阴清肺汤主治证的病因病机是阴虚燥热，复感疫毒。
476. “反复更秋，稍得其绪”可译为经历多年，逐渐理出头绪。
477. 肋部皮肤始发灼热疼痛，继则出现簇集粟粒大小丘状疱疹，呈带状排列，疱壁紧张，口苦，心烦，脉弦数。治疗本病除局部阿是穴、夹脊外，宜选取行间、阳陵泉。
478. 反映肝癌最敏感的指标是甲蛋白(AFP)。
479. 在“佗舍去，妇稍小差”中，“妇稍小差”应今译为妇女的病渐渐稍有转愈。
480. 在“吾待物混而无别，竹之理而析足以医之”中，“析”之义为有差别。
481. 中风后遗症期是指发病半年以上。
482. 患者全腹部膨隆，不随体位改变而变化。应考虑的是肠麻痹。
483. “主胞胎”的经脉是任脉。
484. 配伍体现治治暑之法，清心利小便最好”之法的方是桂苓甘露散。
485. 咳吐浊痰脓血，腥臭异常，可见于肺痈。
486. 小海穴深层分布的主要干是尺神经。
487. 因上着粉”中的“因”意思是于是。
488. 在“风湿候隙，遘手足之灾”中，“遘”之义为造成。
489. 被誉为“久泻久痢之涩肠止泻之圣药”的是罂粟壳。
490. 在“时周脑后生细疮，累累若贯珠。余曰：君以此无所若，一旦勃发，为害非浅。”中以”之义为认为。
491. 麻黄细辛附子汤的主治病证是素体阳虚，外感风寒证。
492. 贯穿结扎法最适用的是Ⅱ、Ⅲ期内痔。
493. 病人坐而喜仰多属肺实气逆。
494. “余虽不敏，公不以为无似”中的“敏”意思是聪明。
495. 组成药物中含有四君子汤的方剂是枳实消痞丸。
496. 在“至于一语一默，一处一处中，“一”之义为或者。

497. 槐花散组成中含有的药物是荆芥穗。
498. 在圣上喟然而称曰：朕甚闵焉中，焉”是指代迄孝武世，书缺简脱，礼坏乐崩。
499. 被称为“药王”的我国古代名医是孙思邈。
500. 《神农本草经》中“主腹中邪热气，诸毒，杀三虫指的是贯众。
501. 在“气卫血营，并行而不悖中，”悖”之义为冲突。
502. 《寿世保元》提出吐酸与肝气有关。
503. 产后小便不畅，小腹胀满，坐卧不安，腰膝酸软，畏寒肢冷，舌淡苔薄润，脉沉滑无力。其治疗常用方肾气丸。
504. 观察舌苔以辨别病情轻重、病势顺逆的主要依据是舌苔有根无根。
505. 消风散中配伍蝉蜕的用意是疏散风邪。
506. 痰液镜检发现枯什曼螺旋体常见于支气管哮喘。
507. 温病病人在热入营分时，舌色应为绛。
508. 被称为“骨之余”的是齿。
509. 腹满时痛，喜温喜按，体倦，大便溏稀，舌淡，苔薄白，脉细弱，方选小建中汤。
510. 舌绛少苔而津润者，多属瘀血内停。
511. 蜈蚣疔好发于儿童头部。
512. 有温肾益精，润肠通便功效的方剂是济川煎。
513. 败毒散中配伍人参的用意是扶正鼓邪外出。
514. 吐舌和弄舌一般都属心脾有热。
515. 肝肾阴虚，风阳上扰型中风的治法是育阴潜阳，镇肝熄风。
516. 十二经原穴多分布在腕、踝关节附近。
517. 家庭圈评价的是家庭功能。
518. 具有纳气平喘功效的药物是沉香。
519. 八脉交会穴是十二经脉与奇经八脉发生互通关系的腧穴。
520. 症见胸胁胀闷，走窜疼痛，性情急躁，胁下痞块，刺痛拒按，舌紫暗，脉涩。证属气滞血瘀。
521. 治疗痰伏中脘，流注经络证，最宜选用的方剂是茯苓丸。
522. 在“民莹属辞尔雅”中，“属词”之义为连缀文词以成文章。
523. 临产的主要标志是宫口扩张，规律宫缩，胎头下降。
524. 车前子入汤剂须包煎。
525. 治疗虚热证经期延长，首选方剂是两地汤合二至丸。
526. 怀孕后小腹隐痛不适，痛处不移，舌暗有瘀点，脉弦滑。其证候是血瘀证。
527. 滑脉与涩脉的脉象区别点是往来流利度。
528. 在慢性病的预防和控制中，最大的困难是对慢性病的预防和治疗方案不依从。
529. 治疗阳虚内寒型痛经的最佳方剂是金匱温经汤。
530. 在“于是始悟血之复来，由于寒凉速之也呻，速之义为招致。
531. 在“未挹上池之水中，”挹”之义为舀。
532. 在“其内伤生冷成滞下者，并可从疟而比例矣”中，“比例”之义为类例。
533. 在四方豪杰，分曹而仕，伏轼而游”中，“伏轼”之义为乘车。
534. 在“何必崇接世利，事官鞅掌，然后为名乎”中，鞅掌”之义为烦劳。
535. “君王众庶，尽欲全角”中的“庶”意思是庶民。
536. 骨折的整复原则是远端凑近端。
537. 消化道最常见的肿瘤是胃癌。
538. 在“详究义理，以为径论。故后世可得依而畅焉”中，“畅”之义为发挥。
539. 镜面舌的主病是胃阴枯竭，胃乏生气。
540. 由国家特定的专门机关对违法者依其应负的法律所给予的惩罚措施是法律制裁。
541. 脾阳不振，痰湿壅阻胞脉所致经、孕之病，选用代表方为苍附导痰汤。
542. 战国时期，为妇科的形成和发展奠定了基础，确立了中医学基础理论的一部巨著是《黄帝内经》。

543. 虚劳的治疗原则为补益。
544. 十二经脉中，多气多血之经是手阳明大肠经。
545. 在“神宗皇帝诏见褒谕”中，“褒谕”之义为褒奖并晓谕众人。
546. 气营两燔型流行性脑脊髓膜炎可用清瘟败毒饮。
547. 《医疗用毒性药品管理办法》规定，毒性药品每次处方剂量不得超过二日极量。
548. 头痛的病位在脑，与肝脾肾关系最密切。
549. 血府逐瘀汤善于治疗胸中血瘀证。
550. 患者胸胁饱满，支撑作痛，随呼吸、咳嗽、转侧而痛增，可见于饮停胸胁。
551. 产妇在哺乳期中，乳汁不经婴儿吸吮而自然溢出者，称为漏乳。
552. 对化疗最敏感的肺癌类型是小细胞癌。
553. 功能消食健胃，涩精止遗的药物是鸡内金。
554. 桂枝茯苓丸的组成药物，除桂枝、茯苓外，其余是丹皮、芍药、桃仁。
555. 在“如环无端，莫知其纪”中，“纪”之义为起始。
556. 国家支持中医药对外交流与合作，推进中医药的国际传播。
557. 20 世纪初叶陈滋所编的一部具有代表性的著作是《中西眼科汇通》。
558. 血吸虫病的主要传染源是受感染的人和动物。
559. 症见病久咳声低微，咳而伴喘，咯痰清稀色白，食少，气短胸闷，神倦乏力。自汗畏寒。舌淡嫩，苔白，脉弱。证属肺气亏虚。
560. 流行性脑脊髓膜炎的主要传播途径是经呼吸道飞沫近距离传播。
561. 完成一个动作的协调一致主要靠小脑。
562. 小柴胡汤证的发热特征是往来寒热。
563. 《中华人民共和国药品管理法》规定：执业医师收受药品生产经营企业给予财物或其他利益的违法行为情节严重的，由卫生行政部门给予的行政处罚是吊销执业医师证书。
564. 常作为计数胸椎体表标志的是第 7 颈椎棘突。
565. 既可降气祛痰，又能疏散风热的药物是前胡。
566. 既能平肝息风，清肝明目，又能散血解毒的药物是羚羊角。
567. “及乎近代诸家，尤不过顺文敷衍”中“敷衍”意思是铺叙引申。
568. “循喉咙之后，上入颡颥”的经脉是足厥阴肝经。
569. 骨髓穿刺常选用的部位除了肋骨。
570. 腰椎间盘突出引起的自身免疫反应的物质是髓核组织。
571. 急性血吸虫病的外周血象特征性改变是嗜酸性粒细胞显著增高。
572. 家庭治疗三角中，全科医生充当的角色是治疗者。
573. 原发性肝癌转移最早的淋巴结是肝门淋巴结。
574. 手足少阳经交接的部位在目外眦。
575. 桑螵蛸散与天王补心丹两方组成中均含有的药物是远志，当归。
576. 患者咳嗽痰多，痰质黏稠，色白易咯，胸闷，苔白腻，脉濡缓，宜诊为寒痰阻肺证。
577. 在“未尝得望精光”中，“尝”之义为曾经。
578. 阳气不足之人，慎用寒凉药物，属于的治则是因人制宜。
579. 舌淡白光莹，舌体瘦薄，其主病是气血两亏。
580. 通常情况下，两眼突出差一般不超过 2mm。
581. 问恶露情况的关键是量、色、质、味。
582. “水冰地坼，无扰乎阳”(《素问·四气调神大论》)中“水冰地坼”的语法现象是名词作动词。
583. 多根多处肋骨骨折，因反常呼吸导致呼吸困难时，主要措施是固定胸壁消除反常呼吸。
584. 乳房与肝经、肾经、脾经、冲任脉相关。
585. 儿童期严重感染华支睾吸虫后的严重后果是侏儒症。
586. 治疗瘀血停滞之胃痛实证应首选失笑散加味。
587. 月经量少，点滴即净，色淡无块，伴头晕眼花，心悸怔忡，舌淡脉细，首选方是滋血汤。

588. “当其受生之时，已有定分焉”中的“定分”喻指固定的寿限。
589. 普济消毒饮的主治证中的症状之一是恶寒发热。
590. 识记的内容遗忘最快发生在识记后的第1天。
591. 分娩时最主要的产力是子宫收缩力。
592. 猩红热的主要病理变化有炎症性病变、中毒性病变及炎症性病变。
593. 望小儿指纹主要适用于小儿的年龄阶段为3岁以内。
594. 左心室增大时，心尖搏动移位的方向是向左下。
595. 具有化瘀止血功效的药组是三七、茜草。
596. 既能凉血止血，又能清肺胃热、清热利尿的药物是白茅根。
597. 肩锁关节脱位时不会出现的症状是搭肩试验阳性。
598. 胸痛，咳吐脓血腥臭痰，是因痰热阻肺。
599. 秦景明最先提出“内伤发热”之名。
600. 骨折后的特有体征是畸形、骨擦音、异常活动。
601. 小儿佝偻病可出现方颅。
602. 有头疽切开引流常作十字形切口。
603. 卫分证临床基本特征是发热微恶风寒。
604. 咳嗽病名最早见于《内经》。
605. 在“其视吾民之颠连，漠然若秦越肥瘠之不相维系”中，“秦越”之义为喻疏远。
606. 在“盖前人作法，后人因焉”中，“作法”之义为创立。
607. 在“彼莫不负笈随师”中，“笈”之义为竹制书箱。
608. 大定风珠主治证的病机特点是阴虚动风。
609. 乳痈初起临床症状为乳房胀痛，恶寒发热。
610. 在“夫大医之体，欲得澄神内视，望之俨然”中，“俨然”之义为庄重貌。
611. 带下过多的西医病机为雌激素水平低落。
612. 治疗风热型感冒的首选组方是大椎、尺泽、外关、鱼际。
613. 具有补益、和中、缓急作用的是甘味。
614. 便秘总的病机是大肠传导失常。
615. 心悸辨证首先看病人是否有“心跳”、“心慌”不能自主的症状。
616. 最常见的炭疽临床类型是皮肤炭疽。
617. 提出血虚发热治疗可用当归补血汤的医著是《内外伤辨惑论》。
618. 在“脉理精微，其体难辨”中，“体”的意义是脉象。
619. 人生来就有的基本面色，终生基本不变，称为主色。
620. 认为中风者，非外来风邪，乃本气自病也”的是李东垣。
621. 喘证的发病病位主要是肺肾。
622. 测量指间关节的活动范围常用的量角器是小型半圆形量角器。
623. 三仁汤与八正散两方组成中均含有的药物是滑石。
624. 在“唯当审谛覃思”中，“覃”之义为深。
625. 对全身水液代谢起主宰作用的是肾之蒸腾气化。
626. 紫雪的主治病证是热盛动风证。
627. 具有清热解毒、息风止痉功效的药组是牛黄、熊胆。
628. 前列腺指诊急性前列腺炎的特点前列腺增大，中央沟消失，无压痛。
629. 血中还原血红蛋白至少达 $>50\text{g/L}$ 时，皮肤黏膜可出现发绀。
630. 在“学者多诵习而取则焉”中，“则”的意义是法则。
631. “子之所慎，斋战疾”中，“子”指的是孔子。
632. 治疗风湿日久累及肝肾的首选药组是五加皮、桑寄生。
633. 虚喘的原因是肺肾气虚。
634. 理中丸与吴茱萸汤两方组成中均含有的药物是人参。
635. 对久泻久痢，涩肠止泻的圣药是罂粟壳。
636. 关于早期妊娠诊断，超声多普勒检查证明有胎心最为准确。

637. 大承气汤用治热厥，体现的治法是寒因寒用。
638. 肺痿的临床主症是咳吐浊唾涎沫。
639. “时大明天启四年，岁次甲子黄钟之吉”中“黄钟”属于律吕纪月。
640. 心电图 P-R 间期的临床意义为心房去极开始至心室去极开始的时间。
641. 幽门梗阻的呕吐物特点是含有隔夜或隔日食物。
642. 既有季节性，又不受季节限制，又常为外感病先导的邪气是风邪。
643. 在“翁在婺得道学之源委”中，“源委”之义为本末。
644. 消渴病口渴特点是大渴引饮。
645. 把“同我者是之，异己者非之”中的“是”今译为“认为…正确”，属于古今译法中的替换。
646. 在“举隅而反，触类而推”中，“反”之义为类推。
647. 有明显出血倾向的肝炎是重型肝炎。
648. 按脏腑分类，将咳嗽分为肺咳、心咳、肝咳、脾咳、肾咳的是《素问》。
649. 《传染病防治法》规定，国家对传染病实行的方针与管理办法是预防为主，防治结合，分类管理。
650. 实证脓耳鼓膜穿孔前全身症状及耳痛较重，鼓膜穿孔后症状明显减轻，这是因为鼓膜穿孔前邪实，穿孔后热势随脓泻出。
651. 水痘皮疹的分布特征是以躯干为主。
652. 耳穴定位中，耳甲腔正中凹陷处，即耳甲 15 区的耳穴是心。
653. 在相同背景下，遭遇相同的应激事件时，不同性格的人往往会产生不同的应激反应，这是因为人格因素不同。
654. 扁豆具有的功效是补脾和中，化湿。
655. 治疗肝气郁结型经行乳房胀痛呈肝郁化热之象的首先方剂是丹栀逍遥散。
656. 在“夫唯不居，是以不去”中，“居”之义为占有。
657. 在“臣意即诊之，告曰：公病中热”中，“中热”之义为内热。
658. 古人称妇产科医生为带下医是因为妇女病多发生于带脉以下。
659. 心悸虚证以养血安神为主。
660. 风寒袭肺和痰湿蕴肺证咳嗽的共同点是声重。
661. 中风的病理因素为风火痰瘀。
662. “荣输治外经，合治内府”出自《灵枢·邪气脏腑病形》。
663. 在“召桑田巫，示而杀之中”，“示”的意义是昭示。
664. 增强延胡索止痛作用的最佳炮制方法是醋炒。
665. 颈椎骨折脱位可选用的治疗方法是持续牵引法。
666. 决定心肺复苏最后是否成功的关键是脑复苏。
667. 胁痛之虚证主要指肝阴不足。
668. 中医治疗流行性感冒外感风寒证的首选方剂是荆防败毒散。
669. 清燥救肺汤中用量最重的药是桑叶。
670. 在“幾縹肤腠，莫知救止”中，“幾”之义为始、微。
671. “一旦用汤，妄生疑讶”中的“疑讶”意思是疑惑惊奇。
672. 在“其笃行似儒，其奇节似侠中”，“笃行”之义为厚道诚实的品行。
673. 人格核心是性格。
674. 细菌性阴道炎白带镜检可见线索细胞。
675. 肾在志为恐。
676. 烧伤深度达到真皮浅层时，称为浅Ⅱ度烧伤。
677. 肺实证而出现咳呛气逆属肝火犯肺时，应选用的方法是泻木清金法。
678. 人参入汤剂的用法是另煎。
679. 既治风湿热痹，又治湿热黄疸的药物是白鲜皮。
680. 药物“七情”的含义是指相须、相使、相畏、相杀、相恶相反、单行。
681. 正常腹部不能触到的脏器是胆囊。

682. 在“蒸出暴干“中，“暴“之义为晒。
683. 实验流行病学研究中对研究对象进行随机分组是为了提高实验组和对照组的可比性。
684. 定经汤出自《傅青主女科》，常用治月经先后无定期，其适用证型是肝郁肾虚证。
685. 在“一着之谬，此生付之矣中”，“着“之喻义为计策、手段。
686. 在骨折中期，除了初期的锻炼之外，还可采用的练功活动是逐渐进行关节活动。
687. 既治疗风寒表实无汗，又治疗风寒表虚有汗的药物是桂枝。
688. 各证型不寐，失眠严重者多加用朱砂、生龙骨、琥珀等。
689. 喘证的发病机制主要为肺和肾。
690. 预产期的计算是从末次月经来潮第一天算起。
691. 骨折早期治疗宜采用攻法，所谓早期是指伤后 1~2 周。
692. 风入经络而见四肢抽搐，角弓反张，牙关紧闭的最佳选方是玉真散。
693. 白雪在晚霞的映照下，呈现出红色，但是我们对雪地的知觉仍然是白色。这是因为人的知觉具有恒常性。
694. 首次提出水肿病必须忌盐的是孙思邈。
695. Ig 增高常见的病因是支气管哮喘。
696. 对阴虚发热的论述，强调保养阴精的重要性的医家为朱丹溪。
697. MRI 周缘显示最亮的组织是脂肪。
698. 功用为补脾柔肝，祛湿止泻的方剂是痛泻要方。
699. “开鬼门，洁净府“的治疗原则是《内经》提出的。
700. 在使用活血调经药时常配伍疏肝理气药。
701. 黄芩具有而黄柏不具有的功效是清肺热。
702. 属于红外线生物效应的是日射病。
703. 《中华人民共和国执业医师法》适用于依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员。
704. 高，膏；梁，米也。（《素问·腹中论》）“今禁高粱”王冰注。顾观光校勘记：“以生气通天论注校之，米，即梁之坏字”。此条校勘属本校。
705. 容易感冒的人，是由于气的防御功能不足导致的。
706. 印堂、上星、迎香主治鼻渊。
707. “利小便即所以实大便治法的依据是小肠泌别清浊。
708. 骨折后期有神经干损伤时，急诊处理应及时将骨折复位。
709. 高血压病健康促进规划的结局评价是评估目标人群的高血压控制率的变化。
710. 服药后为助药力，常于药后进热粥。
711. 乳香的功效为活血行气，消肿生肌。
712. 执行健康教育活动的首要任务是制定健康促进计划。
713. 右肺中心型肺癌合并右肺上叶不张的典型表现是横 S 征。
714. 治疗肺胃津伤证的最佳方药是沙参麦冬汤。
715. 阑尾炎的突出表现是转移性右下腹痛。
716. 女孩第二性征开始发育，约在 10 岁始。
717. 经前吐血、衄血，量较多，色鲜红，心烦易怒，两胁胀痛，口苦咽干，其辨证为肝经郁火。
718. 在“一夕尽数瓿中”，“瓿“之义为盆盂。
719. 不是“温燥“症状的有项强，骨节疼痛。
720. 在“矫易其故常，捭摩其性理“中，“捭摩“之义为分析研究。
721. 芳香化湿药的主治证是湿阻中焦。
722. 痰湿凝聚可产生咽喉漫肿，颜色淡红。
723. 外感风寒表证、外感风热表证均可使用的药组是荆芥、防风。
724. 甲状腺功能亢进症病人特征性的改变是甲状腺触诊触及震颤或听诊闻及血管杂音。
725. 动态观察血浓度，可作为检查胎盘功能指标的是耐热性酸性磷酸酶。
726. 疟腮的主要病变经脉是胆。

727. 正常人 24 小时尿液最高一次比密应当是 $>1020$ 。
728. “一源而三歧”指的是任脉、督脉、冲脉。
729. 得阳气煎熬而成者为痰，为阴气凝聚而成者为饮。
730. 可治疗风热感冒与时邪感冒的方剂是银翘散。
731. 《中华人民共和国传染病防治法》规定，国家建立传染病疫情信息公布制度。
732. 易黄汤的功用是固肾止带，清热祛湿。
733. 胃痛患者，呕血便黑，面色萎黄，四肢不温，舌淡，脉弱无力，治疗应首选归脾汤。
734. 妊娠中期，腹大异常，腹部胀满，胸胁满闷，行动艰难，小便短少甚至不通，其病因病机是脾胃虚弱。
735. 突然剧烈腹痛，全腹压痛、反跳痛。应首先考虑的是消化道溃疡穿。
736. 在有干于津液而荣卫气衰、肉烁而皮著于骨者“中，烁“之义为瘦削。
737. 支配眼球运动的颅神经是动眼神经、展神经、滑车神经。
738. 在“其笃行似儒，其奇节似侠”中，嗜奇节“之义为奇特的节操。
739. 子淋湿热下注证其治法是清热利湿，润燥通淋。
740. 以病原治疗为主的传染病是流行性脑脊髓膜炎。
741. 鸡内金入药最宜研末冲服。
742. 马鞍区感觉减退或消失提示腰椎间盘突出方向最可能是向后方中央突出。
743. 湿热蕴结下焦，膀胱气化不利，可见小便短赤频急。
744. 患者胁痛口苦，胸闷纳呆，恶心呕吐，目赤尿黄，舌苔黄腻，脉滑，其辨证为清热利湿。
745. 所谓中药的剂量，一般是单味药成人一日量。
746. 鉴别良恶性溃疡的最重要方法是胃黏膜组织病理学检查。
747. 喘证表现为肺实肾虚的“上实下虚”证，当选用苏子降气汤。
748. 在“背曲肩随，府将坏矣”中，“隕“的意义是通“堕“。
749. 在“若执东垣以治者，未免以燥剂补土，有拂于清肃之肺金”中。“拂之义为违背。
750. 在“太祖果大怒，使人往检，若妻信病，赐小豆四十斛”中，“信“之义为确实。
751. 溃疡疮口太小，脓腐难去，常用的腐蚀药是白降丹。
752. 能行“血中气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛“的药物是延胡索。
753. 良性骨瘤逐渐增大应如手术治疗。
754. 针刺肌肉浅薄部位的腧穴，常用的进针法是提捏。
755. 精浊好发于男性中青年。
756. 性成熟期一般自 18 岁左右开始，历时 30 年。
757. 女阴的病症多从肝肾论治。
758. 在我国法定传染病中，属于甲类传染病的是霍乱。
759. 《中华人民共和国传染病防治法》列入管理的传染病分甲、乙、丙三类共计 37 种。
760. 与情志因素关系最密切的胃脘痛是肝气犯胃。
761. 五脏共同的生理功能是贮藏精气。
762. 揭示胸痹不仅有实证，亦有虚证的文献是《玉机微义》。
763. 二陈汤的君药是半夏。
764. “顾其方，旁涉元禁，琐及游戏”中“旁”意思是广泛。
765. 在“今之游权门、食厚奉者”中，“奉”之义为俸禄。
766. “垂不朽之仁慈，开生民之寿域”中“垂”意思是流传。
767. 抑郁发作时，一日之内的规律是昼重夜轻。
768. 足少阳胆经，自头临泣至风池连线上的腧穴排列顺序是目窗、正营、承灵、脑空。
769. 急喉风最主要的特征是吸气性呼吸困难。
770. 脓耳的证候特征是耳膜穿孔，耳内流脓。
771. 在“贱者焦劳不适，怀抱可知”中，“怀抱“之义为心思。
772. 诊断慢性阻塞性肺疾病的必要条件是肺功能检查示阻塞性通气功能障碍。
773. 在“真气不荣，则痰动于体中，痰“之义为病。

774. 肝为“五脏之贼”，为病最杂而治法最广。
775. 依照《中华人民共和国执业医师法》取得医师资格，经注册取得医师执业证书的人即可开展诊疗执业活动。
776. 中医学女性生殖轴的概念是肾-天癸-冲任-胞宫。
777. 黄芪桂枝五物汤的功用是益气温经，和血通痹。
778. 两种药物合用，能产生或增强毒性。这种配伍关系是相反。
779. 在“病深者，其声啾中”，“啾”之义为呃逆。
780. 口渴欲饮水，但欲漱水不欲咽者属内有瘀血。
781. 性微寒的行气药是枳实。
782. 在“伤寒六七日大下后寸脉沉而迟手足厥逆下部脉不至（《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》第357条）“中据上文的“寸脉呵可知下文的“下部脉”指关脉。
783. 脉“指关脉”。
784. 被称为“十二经脉之海”和“五脏六腑之海”的是冲脉。
785. 波高尖，基底狭窄为高钾血症时的心电图改变。
786. 左归饮用于治疗肾阴虚的绝经前后诸证。
787. 在“躬自稼穡，带经而农中”，“农”之义为务农。
788. 由县级以上人民政府报经上一级政府决定可以在传染病流行时采取的紧急措施是停工、停业、停课。
789. “继而绎之久”中“绎”的意思是探究。
790. 晚期肺癌病人，现症见咳嗽，少痰，痰中带血，神疲乏力，纳差声低微言，低热，盗汗，膝软乏力，口渴，大便结，舌质淡，舌苔少脉细弱无力。其证型是气阴两虚。
791. 二尖瓣关闭不全杂音的最响部位是心尖部。
792. 对《内经》予以补充，并提出了八会穴，对五输穴按五行学说作了详细解释的著作是《难经》。
793. 舌绛少苔或无苔者的主病是久病阴虚火旺。
794. 既能用于血滞经闭，又能用于肺病、肠痈及肠燥便秘的药物是桃仁。
795. 流行性出血热早期低血压的原因，最主要的是小血管通透性增加大量血浆外渗。
796. 气虚型产后恶露不绝，宜选用的方剂为补中益气汤。
797. 胃热熏蒸型经行口糜最佳治疗方剂凉膈散。
798. 医务工作者崇高的职业道德境界只体现在认识疾病、治疗疾病的活动中。
799. 某患者改良 Barthel 指数评分为 60 分，其意义为中度功能障碍。
800. 青蒿鳖甲汤中青蒿与鳖甲的配伍体现的配伍特点为出入结合，先入后出。
801. 手太阴肺经在上肢的分布是内侧前廉。
802. 半夏白术天麻汤的证治要点是呕恶。
803. 羌活、独活同用的方剂是羌活胜湿汤。
804. 在病例对照研究中选择对照时使用最多的对照来源是同一或多个医疗机构中诊断的其他病例。
805. “丸艾而坏肝，投针而失胃”中“丸艾”的意思是转成艾炷灸之。
806. 苔白如积粉，扪之不燥者，多见于瘟疫内痈。
807. 在“诀脉结筋，搦髓脑”中，“搦”之义为按治。
808. OPs 波下降或消失常见的眼病是糖尿病视网膜病变。
809. 在“未入于经络”中，“络”之义为通“络”。
810. 月经“之名最早见于《脉经》。
811. 心为“五脏六腑之大主”的理论依据是心主神志。
812. 治疗筋脉挛急疼痛的药物，大多是酸。
813. 起于足跟内侧的经脉是跷脉。
814. 胁痛的病理特点是肝失疏泄，络脉不和。
815. 计划生育技术服务机构中的医师资格取得及管理执行《中华人民共和国执业医师法》。
816. 中风脱证的病机是阴阳离决。

817. “伯牙常有也，而钟期不常有；夷吾常有也，而鲍叔不常有”在文中喻指真医常有，而知真医者不常有。
818. 颈椎骨折脱位采用颅骨牵引，复位后维持重量为 4kg。
819. 心脏后前位 X 线片左心缘出现四段，第三段向外突出是左心耳增大。
820. 在複者芟之，阙者缉之，讹者绳之呻中，绳“义为纠正。
821. 淫羊藿、巴戟天共同的功效是补肾壮阳，祛风除湿。
822. 热甚发痉的治法是泄热存津，养阴增液。
823. 治疗风热、肝热之目赤肿痛的首选药组是桑叶、菊花。
824. 善治“皮里膜外之痰”的药物为白芥子。
825. 全科医学的学科特点是范围宽广、内容丰富，与各专科有交叉，有独特的知识技能和态度或价值观。
826. 经期延长是行经时间超过 7 天以上，但不超过 2 周。
827. 术后尿潴留的首选处理方法是下腹部热敷。
828. 发热伴右上腹痛，墨菲征阳性，最可能的诊断是急性胆囊炎。
829. 在“使在人之脉，方春即以弦应，方夏即以数应，躁促所加，不三时而岁度终矣”中，“加”之义为超越。
830. 当归拈痛汤的功用是利湿清热，疏风止痛。
831. 患者神疲乏力，自汗，动则益甚，易感冒，多属卫气虚弱。
832. 在“每若望洋意沮呬中，“沮”之义为沮丧。
833. 阳和汤的主治病证是阴疽。
834. 胸部，锁骨下缘，前正中线旁开 2 寸的是俞府。
835. 生命价值论指的是生命神圣与生命质量的统。
836. 某农民将一头死猪以低价出售给邻居食用，造成多人发病，主要症状为腹痛、呕吐、腹泻、大便为黄绿色水样便。可考虑诊断为沙门菌属食物中毒。
837. 肩关节周围炎病程日久肩臂部肌肉出现萎缩，较明显的是三角肌。
838. 主病痰饮、食滞、实热证，以及青壮年的常脉，妇人孕脉，其脉象是滑脉。
839. “翁不怪，居月余，皆毙中的怪”意思是高兴。
840. 病人坐时常以手抱头，头倾不能昂者，属精神衰败。
841. 猩红热疹后阴伤的首选方剂是沙参麦冬汤。
842. 在“六气之中，君相两火无论已中，“已”的意义是通“矣”
843. 检查听觉功能的方法是音叉实验。
844. 病人但坐不得卧，卧则气逆者，属咳喘肺胀。
845. 在“雨暘寒暑，不能以时若”中，“时若”之义为寒暑无过，风调雨顺。
846. “五脏六腑之大主”指的是心。
847. 世界上最早的关于人体实验的国际性医德文献是 1946 年的《纽伦堡法典》。
848. 在剽窃医绪，倡为诡异”中，“绪”之义为残端零头。
849. 在“古人方之于冰盃之盛汤”中，“方”之义为比拟。
850. 既可健脾益气燥湿，又可止汗安胎的药物是白术。
851. 对虚实错杂证运用先攻后补治则的主要根据是正气虽虚尚可耐攻。
852. 健康教育项目不仅对传播、教育和干预的过程评价，还要评价效果。
853. 在药物配伍上体现“一补一润一敛”之特点的方是生脉散。
854. 我国第一部具有现代工具书意义的中医药专业综合性工具书是谢观《中国医学大辞典》。
855. 具有致癌作用的环境因子主要是砷化物。
856. 患者恶寒发热，头项强痛，无汗而喘，脉浮紧，可辨证为太阳伤寒证。
857. 治咳嗽有治上、治中、治下之分，治下是指治肾。
858. 被称为“水谷之海的腑是胃。
859. 胸痹疼痛剧烈，持续 30 分钟以上，含化扩张血管药物不能缓解应考虑为真心痛。
860. 盐灸对升降浮沉的影响是下行。

861. 少阳证的要药是柴胡。
862. “有性缓者遭急病，濡滞而成难挽”中的濡滞”意思是拖延。
863. “并是书且弁髦置之者”中”弁髦置之“谓当作无用之物弃置一边。
864. 关于慢性乙型肝炎的治疗，最主要的措施是抗病毒。
865. 肱骨干上 1/3 骨折后的移位方向应是近端向前向内，远端向上向外。
866. 丹毒发于小腿，称为流火。
867. 治疗铅中毒的最常用药物依地酸二钠钙。
868. 平胃散的药组有苍术。
869. 主津所生病的经脉是手阳明大肠经。
870. 具养阴清肺、益胃生津功效的药物是北沙参。
871. 在“皦皦微似有汗中”，“似”之义为持续。
872. 茵陈蒿汤主治病证的病机是湿热郁蒸。
873. 脑血管病最常出现的感觉障碍类型是内囊型。
874. 主治中阳不足之痰饮的方剂是苓桂术甘汤。
875. 超声波检查显示胆囊内有一个或数个强光团、光斑，最可能的是胆囊结石。
876. 方中取清热与养阴、利水之品相配，利水而不伤阴，泻火而不伐胃，滋阴而不恋邪，最宜于小儿的方剂是导赤散。
877. 若肝血素虚，孕血养胎，产后突然头项强直，四肢抽搐，牙关紧闭，适宜的方剂为羚角钩藤汤。
878. 强调潜意识心理冲突、个体心理特征产生心身疾病的研究途径是心理动力理论。
879. 关节脱位最为常用的整复手法是拔伸牵引。
880. 排便异常完谷不化属脾肾阳虚所致。
881. 寒邪客于胞中，阻滞胞脉、胞络导致气血运行不畅，治以温经散寒，此法常与化瘀止痛法配合使用。
882. 邪犯阳明经所致之头痛部位为前额部。
883. 自觉呼吸短促而不相接续，气短不足以息，称之为短气。
884. 既可镇惊安神，又利尿通淋的药物是琥珀。
885. 在“太祖闻而召佗，佗常在左右”中，“左右”之义为身边。
886. 右胸下部肋间隙变窄，语颤减弱，气管右移，呼吸音减低。诊断应考虑为胸膜肥厚。
887. 在“窃闻同命之士，咸以毕到”中，“以”之义为已。
888. 局部刺痛，拒按，肿块隆起，舌有瘀斑，脉涩，其病因应为瘀血内阻。
889. 在“凡使，不计多少，用腊水细研”中，“腊水”之义为冬雪化的水。
890. 血海穴位于髌骨内上缘上 2 寸。
891. 热在上焦肺经气分，导致渴而小便闭涩不利，治疗宜首选清肺饮。
892. 胡桃仁，黄豆属于平性食物。
893. 以肺组织含气量由多到少为序，叩诊音的排序是鼓音-过清音-清音-浊音实音。
894. 在我国最多见的痢疾杆菌菌群是福氏痢疾杆菌。
895. 反应速度和记忆能力下降是中年期心理发展的常见问题。
896. 桔梗与贝母都能够治疗的病证是肺病。
897. 哮喘与肺炎喘嗽的主要区别是哮喘，呼气延长。
898. 天王补心丹主治病证的病位是心肾。
899. 与月经关系最密切的经脉是冲脉。
900. 可引起单侧上睑下垂的是动眼神经麻痹。
901. “火烧人肉坏死，宜用麻子膏外敷”出自《刘涓子鬼遗方》。
902. 眩晕从肝论治的依据是诸风掉眩，皆属于肝。
903. 中焦的功能实际是指脾胃的整个运化功能。
904. 依照《中华人民共和国执业医师法》，卫生行政部门对医师活动的监督管理制度是医师执业注册制度。
905. 在“是以脾胃之论出于东垣则无弊，若执东垣以治者，未免以燥剂补土”中，“执”之义为

- 持。
906. 滑苔常见于痰饮水湿。
907. 尿中  $\beta$  微球蛋白增多而血中  $\beta_2$  微球蛋白不增高, 此时出现的蛋白尿属于肾小管性蛋白尿。
908. 吐舌多见于疫毒攻心。
909. 常咯出大量脓臭痰的疾病是支气管扩张。
910. 在“顾轻身以希必获, 谓父母遗体何”中, “轻身”之义为轻忽身体, 不顾性命。
911. 烟卷式引流大都在术后 4~7 天拔出。
912. 患者, 男, 19 岁。手足心热, 夜眠多梦, 时有遗精, 舌质红, 脉细数。首选药组是黄柏、知母。
913. 气虚便秘的特点是大便干或不干, 排出困难。
914. 三仁汤中杏仁的作用是宣利上焦肺气。
915. 食滞痰阻型聚证, 若痰湿较重, 兼有食滞, 腑气虽通, 苔腻不化者, 可用平胃散加消导药。
916. 咳嗽, 痰稠色黄, 鼻流浊涕, 咽喉肿痛, 发热, 微恶风寒, 舌尖红, 脉浮数, 证属风热犯肺。
917. 舌苔花剥而兼有白腻苔, 多属痰浊未化, 正气已伤。
918. 镇肝息风汤中具有清泄肝热、疏肝理气作用的药物是川楝子、茵陈、生麦芽。
919. 生儿出生时卵巢内的卵泡可有 15~50 万个。
920. 在柳为布衣时过吾中, “过”之义为来访。
921. 引起“水土不服”的发病因素是地域因素。
922. 既能凉血止血又能散瘀解毒消痛的药物是大蓟、小蓟。
923. 在“修途之累, 非移晷所臻”中, “修”之义为长远。
924. 生化汤证的病机是产后血虚, 寒凝血瘀。
925. 药力居方中之首的药物是君药。
926. 在燥之所胜, 亦云燥矣”中, “燥”之义为干燥。
927. 既能疏肝理气, 又能调经止痛的药物是香附。
928. 配伍体现了“增水行舟”的是增液承气汤。
929. 《兰室秘藏》首立“胃脘痛”一门, 以区别于心痛。
930. 与“气虚”关系最大的两个脏腑是肺与脾。
931. 伤津是火邪、燥邪暑邪共同的致病特点。
932. 中医辨证治疗湿热痢疾的方剂是芍药汤。
933. 在“煮之一伏时了”中, “一伏时”是指昼夜的时间。
934. 既可润肺止咳, 又能灭虱杀虫的药物是百部。
935. 产妇每天的泌乳量可达 1000~300ml。
936. 功能清热生津, 除烦止呕的药物是芦根。
937. 在“今并味精英, 铃其要妙”中“铃”之义为掌握。
938. 腹部受暴力冲击后突发剧烈腹痛, 应首先想到的是肝脾破裂。参
939. 风水一名始见于《内经》。
940. 既能回阳温中, 又能温肺化饮的药物是干姜。
941. 胃痛的病理特点是胃气郁滞, 失于和降。
942. 阴闭的病因是痰浊瘀阻。
943. 触诊, 全腹肌紧张, 硬如木板, 最可能的疾病是急性弥漫性腹膜炎。
944. 超声药物透入法的优点是不破坏药性、操作简单、对皮肤无刺激、无痛苦。
945. 医疗机构发现甲类传染病时, 对病源携带者、疑似病人的密切接触者, 应依法及时采取的措施是在指定场所进行医学观察。
946. 肺脓肿与癌性空洞继发感染的鉴别主要是 X 线检查或痰液细胞学检查。
947. 脾胃湿热的口渴特点是渴不多饮。
948. 痰浊中阻型眩晕的证候特点是眩晕头重如蒙。
949. 在此则泥于迹象, 太嫌呆板, 去神化二字瞠乎远矣”中“神化”之义为出神入化。
950. “听卒头眩堕车”中的“卒”通“猝”。

951. 患者，女，25岁。妊娠8周，不属禁忌药组的是—当归、阿胶、党参。
952. 内燥的主要病机是津液耗伤，阴血亏耗。
953. 《灵枢·口问》指出中气不足可致“溲便为之变”。
954. 提出“八法”的是清代医家程钟龄。
955. 口渴多饮，口舌干燥，尿频量多，烦热多汗，舌边尖红，苔薄黄，脉洪数，其选方是消渴方。
956. 脑出血后脑水肿的高峰期一般出现在发病后的48小时。
957. 切断传播途径可预防细菌性痢疾的发生。
958. 在肝炎病毒中，基因组为DNA的是HBV。
959. 在“幼负奇气，顾犹跳梁呬中”，“负”之义为抱有。
960. 在“时因肩舆道远腹饿，即在病者榻前进食”中，“肩舆”之义为坐轿子。
961. 在“母其以二三子未树邪中”，可以代替“其”的是或。
962. 在“今删其要，以备篇籍”中，“删”之义为选取。
963. 五色分属五脏，则黄色属脾。
964. 厚朴温中汤适用于寒湿气滞证。
965. 在“蒜齏大酢”中，“酢”之义为同醋，味酸。
966. 在足外踝的前下方，当趾长伸肌腱外侧凹陷中的腧穴是丘墟。
967. 旋覆代赭汤中旋覆花、代赭石的配伍意义是镇冲逆除噎气。
968. 在“不能久立，行则振掉，骨将惫矣”中，“振掉”意为摇动。
969. 既能益肾固精，又能补脾止泻的药物是莲子。
970. 既属于奇恒之腑，又属于六腑的脏器是胆。
971. 既可以清肝又能杀虫的药物是芦荟。
972. 猩红热患者舌的特点是草莓舌。
973. 与月经后期和月经过少的发病均有关的是血虚。
974. 按照需要起源，可把需要分为生理性需要和社会性需要两大类。
975. 卡特尔认为人格是由人格特质构成的。
976. 第二心音产生的机理主要是两个半月瓣关闭时的震动。
977. 阴闭可用辛温开窍，豁痰熄风治疗。
978. 地黄饮子的药物配伍，体现了标本兼顾，上下并治，而以治本治下为主要的特点。
979. 治膏淋的要药是萆薢。
980. 作者说真菊延龄，野菊泄人。正如黄精益寿，钩吻杀人之意”，意在说明有些药物有益，有些药物有害。
981. 患者发病三天，咳嗽少痰，口咽干燥，微恶风寒，苔薄少津，证属燥邪犯肺。
982. 在“由是遍索两经，先求难易，反复更秋”中，“更”之义为经过。
983. 在“六书”理论中，人们理解分歧较大的造字法是转注。
984. 心悸怔忡，健忘失眠，盗汗虚热，体倦食少，面色萎黄，舌淡苔薄白，脉细弱。宜选归脾汤。
985. 肾上腺糖皮质激素不宜用于慢性胃炎治疗的药物。
986. 证见形寒肢冷，心悸怔忡，唇甲青紫，舌苔白滑，脉沉微，属心肾阳虚。
987. 肺癌的发生与吸烟关系最密切。
988. 在骨盆四个假想平面中最小、最窄的平面是中骨盆平面。
989. 在“得诸见闻，班班可纪”中，“班班”之义为明显貌。
990. 问带下史时量、色、质、味最重要。
991. 只能由司法机关代表国家依照法定程序予以追究的是刑事责任。
992. 大承气汤的臣药为芒硝。
993. 正常尿中偶见透明管型。
994. 假若天机迅发，妙识玄通，蒯谋虽属乎生知，标格亦资于诂训。此句谓训诂之重要。
995. 在“留淫日深，著于骨髓”中，“著”之义为附着。
996. 学习和记忆的电生理学基础是突触长时程增强电位。
997. 妇科病机与内科病机的不同点在于必然损伤冲任。
998. 在“虎啸而谷风至，龙举而景云属”中，“属”之义为会集。

999. 骨折后出现疼痛的特征是间接压痛。
1000. 在“或密戚偏见难回”中，“回”之义为扭转。
1001. 引起急性前间壁心肌梗死闭塞的冠状动脉分支是左冠状动脉前降支。
1002. 平胃散与藿香正气散两方组成中均含有的药物是陈皮、厚朴、甘草。
1003. 黄土汤与理中丸两方组成中均含有的药物是白术。
1004. 四肢厥冷，神昏，面紫暗，脉沉迟，身热，胸腹灼热，口鼻气灼，口臭息粗，口渴引饮，小便短黄，舌红苔黄而干，脉有力，此为真热假寒。
1005. 胸骨左缘第二肋间是肺动脉瓣听诊区。
1006. 在“睢庸工误人最深，如鲧堙洪水，不知五行之道”中，“鲧堙洪水”这一典故的喻义是庸医滥补，越补越坏。
1007. 脉来缓慢，时有中止，止有定数的脉象是代脉。
1008. 气虚型月经过多的发病机制是气虚不摄。
1009. 椎动脉型颈椎病的特点是头部旋转时眩晕，甚至猝倒。
1010. 根据阴阳属性的可分性，五脏中属于阴中之阴的脏是肾。
1011. 保守医疗秘密的两方面内容是指为病人保密与对病人保密。
1012. 脾气虚、脾阳虚、脾气下陷、脾不统血证的共同见症是食少便溏，少气乏力。
1013. 按五行属性分类，五行中属水者是藏。
1014. 生地黄的共同功效，除清热凉血外，还有养阴。
1015. 在“为问今之乘华轩、繁徒卫者”中，“为”之义是试。
1016. 在“《礼记》注曰：惟五十然后养阴者有以加”中，“有以”之义为能够。
1017. 气之离于藏也，卒如弓弩之发，如水之下崖。（《太素》卷九《脉行同异》）杨上善注：“如弓弩之发机，比湍流之下岸，言其盛也。”此注说明原文所用的修辞手法是比喻。
1018. 在“使观者烂然有第，疑者涣然而冰释”中，“第”之义为次序。
1019. 燥湿利水宜生用、补气健脾宜炒用、健脾止泻宜炒焦用的药物是白术。
1020. 败毒散中人参与他药相配，体现了散中有补。
1021. 低比重尿是慢性肾炎与急性肾炎重要鉴别特征。
1022. 辛开苦降，升清降浊为连朴饮的配伍特点。
1023. 小儿断奶时间宜在8~12个月。
1024. 在“人纲不闲，鸟兽为群”中，“闲”之义为熟悉。
1025. 在“前人作法，后人因焉”中，“因焉”之义为沿袭它。
1026. 患者潮热，热势较高，每于下午3~5时热甚，此种潮热称为日晡潮热。
1027. 固阴煎功效补肾调经，主治月水不调，其方出自《景岳全书》。
1028. 咽喉红肿高突，疼痛剧烈，吞咽困难，称为喉痹。
1029. 开口于中鼻道的是上颌窦和额窦。
1030. 医书多分头痛、头风为二门，然一病也，但有新久去留之分耳。浅而近者名头痛，其痛卒然而至，易于解散速安也；深而远者为头风，其痛作止不常，愈后遇触复发也。皆当验其邪所从来而治之”。这段话出自《证治准绳》。
1031. 手三阳经的走向为从手走头。
1032. “人芝兰之室，久闻而不知其香”说明的是感觉适应。
1033. 枳实导滞丸治疗泄泻、下痢，属于通因通用。
1034. 医生的手指用力较重，甚至按到筋骨以体察脉象，这种指法称为按法。
1035. 金锁固精丸证的病机要点是肾虚精亏。
1036. 在然而非萧敌鲁之明医，诘能知病中，“诘”之义为诘。
1037. 属于大气中的二次污染物是SO<sub>3</sub>。
1038. 阴道之名，最早见于《诸病源候论》。
1039. 症见干咳少痰，咯痰不爽，鼻咽干燥，口干。舌尖红少津，脉细数。证属肺阴亏虚。
1040. 在“若三言三止，脉之咽唾者，此诈病也”中，“三”之义是虚数。
1041. 最易发生转移性脓肿的感染是脓毒症。
1042. 小儿“地图舌”是由于胃之气阴不足。

1043. 病人神志清醒时，小便不能控制而自遗，称之为小便失禁。
1044. 若问诊，经期腹痛3天，灼痛拒按，经量多，色紫红，质稠伴血块，小便黄赤，多为湿热蕴结。
1045. 各级人民政府及其有关部门应当建立严格的突发事件防范和应急处理责任制。
1046. “重阴必阳”、“重阳必阴”属于阴阳的转化。
1047. 心尖部第一心音增强的是二尖瓣狭窄。
1048. 在“知名位之伤德，故忽而不营”中，“营”之义为求。
1049. 痰热咳嗽可见咳嗽痰多，色黄稠粘，喉中痰鸣症状。
1050. 患儿发育迟缓，身体矮小，囟门迟闭，智力低下，宜诊为肾精不足证。
1051. 既能泻水逐饮，又能祛痰止咳的药物是芫花。
1052. 关节的基本组成结构是关节面、关节囊、关节腔。
1053. 四逆散所主证候的病因病机是气机不畅，阳气内郁。
1054. 在“负晋侯出诸厕，遂以为殉”中，“负”的意义是背着。
1055. 在“或发疼痛走注，麻痹不仁”中，“不仁”之义为无感觉。
1056. 在“协和万邦，黎民於变时雍”中，“雍”之义为和睦。
1057. 直立位两上肢自然下垂时，肩胛下角相当于第七肋间
1058. 心尖部出现抬举性心尖搏动的是高血压性心脏病。
1059. 在“夫以蕞尔之躯，攻之者非一涂”中，“蕞尔”之义为小貌。
1060. 妊娠后小腹冷痛，绵绵不休，喜温喜按，形寒肢冷，纳少便溏，舌淡苔白滑，脉沉细滑。其治疗常用方胶艾汤。
1061. 首设专篇讨论消渴病的医著是《金匮要略》。
1062. 治疗脾虚夹痰型经行眩晕的最佳方剂是半夏白术天麻汤。
1063. 桑螵蛸、海螵蛸均有的功效是固精缩尿。
1064. 在配伍上体现一则养肝血以宁心神，一则清内热以除虚烦的方是酸枣仁汤。
1065. 胸部肿块的X线平片检查方法胸部正侧位片。
1066. 银翘散和桑菊饮中共有的药物是桔梗、连翘、芦根、薄荷、甘草。
1067. 小腿外侧、足背、拇趾麻木提示L神经根受压。
1068. 某医学工作者致力于寻找心理学的办法改变或矫正人们有碍身心健康的生活方式和行为习惯，通过教育、训练、和咨询等预防措施，预防心理障碍及各种心身疾病。他的工作范畴属于健康心理学。
1069. 目前我国医学伦理学主要的研究方向是医学实践中的道德问题。
1070. 在在下之病，可泄而出之”中，“泄”之义为用下法。
1071. 在“所传异同，咸悉载录”中，“异同”是一个偏义复词，义偏于“异”
1072. 在“后五日，桓侯体病”中，“病”之义为比疾重，病重。
1073. 按五行规律，肝病及心的是母病及子。
1074. 某病人，两年来经常汗出，以头面部为多，运动后汗出更甚，并伴有精神不振，倦怠乏力，少气懒言之症，且动辄感冒。查体：面色淡白无华，舌淡苔白，脉虚弱。此病人的出汗属于气虚自汗。
1075. 循行于腹中线旁开2寸，胸中线旁开4寸的经脉是足阳明胃经。
1076. 阴虚动风的辨证要点是手足蠕动。
1077. 腹痛，里急后重，下痢赤白，肛门灼热，小便赤涩，苔黄腻，脉滑数。其治法宜清热解毒，调气行血。
1078. 小蓟饮子的主治病证是热结下焦之血淋、尿血。
1079. 正常人眼压为10-21mmHg
1080. 在“燕吟、子之何尝不托尧舜以鸣高”中，“鸣高”之义为清高。
1081. 验证病因假设论证强度最高的流行病学方法是实验流行病学研究。
1082. 脑瘤以20~40岁最为多见
1083. 肺的扩张性或弹性反映了肺的顺应性。
1084. 见于萎缩性胃炎和老年人的黏膜变化为假幽门腺化生。

1085. 半夏厚朴汤所治梅核气的主要病机是痰气互结，肺胃失宣。
1086. 确立“六书”体系的是《说文》。
1087. 口眼歪斜，舌强语謇或失语，半身不遂，肢体麻木，苔滑腻，舌暗紫脉弦滑，宜选用解语丹。
1088. 传染性非典型肺炎的潜伏期通常为 2 周内。
1089. 中风后遗口眼歪斜者，多由风痰阻络所致，宜选用牵正散。
1090. 某男子腰膝酸软，神疲乏力，小便频数，遗精，舌淡苔白脉弱，证属肾气不固。
1091. 心电图 P 波消失可见于心房颤动。
1092. 有机磷农药中毒，毒蕈碱样表现为瞳孔缩小。
1093. 初级卫生保健是由世界卫生组织和联合国儿童基金会联合主持召开的国际会议提出的。
1094. “主病之谓君，佐君之谓臣，应臣之谓使。”出自《黄帝内经》。
1095. “眩晕者，中风之渐也”见于《医学正传》。
1096. 相传我国最早的中医儿科专著是《颅囟经》。
1097. 原发性不孕在古时称全不产。
1098. 代谢性酸中毒是  $\text{HCO}_3^-$  减少。
1099. 具有清热解毒，消痈排脓之功，为治肠痈要药的药物是败酱草。
1100. 胃癌好发于胃窦。
1101. “能经天地阴阳之化者，不失四时中经意思是效法。
1102. 在“永言笔削，未暇尸之中”，“笔削”之义为整理修订。
1103. 在“每修事十两，用石蜂窠六两尽为度”中，“修事”之义为炮制。
1104. 在“饮食伺饔”中，“饔”之义为间隙。
1105. 狭义内障的主要病变在晶珠。
1106. 正常的 Q 波振幅应小于同导联中 R 波的 1/4
1107. 角膜直径大于 13mm 为异常。
1108. 全身淋巴结肿大大多见于传染性单核细胞增多症。
1109. 病人目胞色黑而晦暗者，属肾虚。
1110. 在“盛盛虚虚，而遗人天殃”中，“天殃”之义为灾祸。
1111. 支气管肺癌的最常见症状是咯血。
1112. 产褥期指产妇分娩结束后，到全身器官恢复至未孕状态，约需 6~8。
1113. 乳痈初起，红肿坚硬，应首选蒲公英。
1114. 抽搐不伴有意识障碍最可能的原因是瘧症。
1115. 骨折愈合过程中，血肿机化期出现的骨痂是纤维性骨痂。
1116. 网织红细胞减少最常见的是再生障碍性贫血。
1117. 急性肾盂肾炎治疗措施是根据细菌药物敏感试验选用有效的抗生素治疗 2 周。
1118. 在“燥之与湿，有霄壤之别”中，“霄壤”之义为天地。
1119. 胰岛素抵抗是指机体对胰岛素的生理效应降低。
1120. 成人股骨颈颈干角正常为  $110^\circ \sim 140^\circ$
1121. 外感热病，营分有热，气分有湿的舌象是红绛舌白腻苔。
1122. 视一物成二物而不清者为歧视。
1123. 关于人体实验的国际性著名文件是《赫尔辛基宣言》。
1124. 水牛角入汤剂宜先煎。
1125. 妊娠期间，腰酸腹痛，胎动下坠，阴道少量出血，头晕眼花，心悸失眠，面色萎黄，舌淡，少苔，脉细数，中医辨证为血虚。
1126. 肾主纳气的主要生理作用是使肺之呼吸保持一定的深度。
1127. 在“无火者，不必去水，宜益火之源，以消阴翳”中，“翳”之义为阴寒之气。
1128. 子烦的主要病机是火热乘心，神明不宁。
1129. 望舌可了解人体生理，病理变化，若见苔黑而润为阳虚有寒。
1130. IgM 增高常见的病因是原发性巨球蛋白血症。

1131. 动脉导管未闭杂音常出现的部位是胸骨左缘第二肋间。
1132. 神疲乏力，气短懒言，头晕目眩，面白无华，小便混浊如米泔，食少便溏，舌淡苔白，脉缓，属脾虚气陷证。
1133. 十二经脉中，手足阳经(同名经)交接在头面部。
1134. 对于因车祸突然死亡和因半身不遂长期卧床而致的死亡，给亲人带来的打击，前者要大得多，说明应激反应的强度与应激事件的发生方式有关
1135. 曾用过抗菌药物，疑为伤寒的患者，最有价值的检查是骨髓培养。
1136. 在“一岁告归，著《本草纲目》”中，“告归”之义为请求辞职回家。
1137. 面部色泽的变化可反映脏腑气血的变化，若面色口白多为气虚。
1138. 在“乃为平人之顺脉也”中，“平人”是指正常之人。
1139. 前列腺指诊慢性前列腺炎的特点前列腺大小正常，或稍大或稍小，硬度增加或有结节可有压痛。
1140. 有头疽的引流切口常为十字切口。
1141. 将“因录其所授，重加芟订，存其可济于世者，部居别白，都成一编，名之曰《串雅》”今译，其中可用保留法的是串雅。
1142. 久咳虚喘，劳嗽痰血宜首选冬虫夏草。
1143. 在“针石之间，毫芒即乖”中，“毫芒即乖”是为了说明医生要谨慎。
1144. 肝胆实热常见的症状是抱轮红赤。
1145. 在“仓廩不藏者，是门户不要也”中，这里“户”是指胃。
1146. “一往坚急劲切之化，反谓凉生”中的“一往”的意思是往往。
1147. 既能止血止痢又能杀虫补虚的药物是仙鹤草。
1148. 腻苔的主要特征为苔质颗粒细腻致密。
1149. 在“父命之商，民莹则商，孳孳务修业”中，“修业”之义为经营商业。
1150. 在“苟能体坚厚之实，居不薄之真”中，“居”之义为安于。
1151. “顾夏虫而却笑中的却”意思是后
1152. 三仁汤中有宣上、畅中、渗下作用的代表药物是杏仁、白蔻仁、薏苡仁。
1153. 睫状体的主要功能是产生房水。
1154. 在“木敷者，其叶发中，发”之义为废落。
1155. 在“冀自然之天功”中，“天功”之义为上天的功绩。
1156. 在若当灸，不过一两处，每处不过七八壮中，“壮”之义为量词。灸的次数。
1157. 执业医师的合法处方权是在经注册的执业地点取得。
1158. “痰浊盘踞，胸阳不振，气机痹阻，脉络阻滞”是痰浊闭阻胸痹的主要病机
1159. 十灰散的君药是大蓟、小蓟。
1160. 在“用盖子并瓶口”中，“并”之义为合上。
1161. 督脉的起止穴分别是长强、龈交
1162. 《素问·水热穴论》曰：“肾者，胃之关也。”。
1163. 在乳中虚冷，儿得母寒，故令不时愈中，“令”之义为使。
1164. 清热解毒与疏散风热并用，寓“火郁发之”之义的方剂是普济消毒饮。
1165. 主司二便的脏是肾。
1166. 针眼脓点不溃，吸收欠佳，遗留肿核者，此已转为胞生痰核
1167. 慢性支气管炎有小气道阻塞时，最敏感的肺功能检查指标是闭合容量增加。
1168. 足三阴经从起始部至内踝上 8 寸段的分布是厥阴在前，太阴在中，少阴在后。
1169. 治疗中风闭证首选人中、十二井、太冲、丰隆
1170. 石痛的记载最早见于《诸病源候论》
1171. 在“鼓事外之口吻，发言非难中，“鼓”之义为掉弄。
1172. 剥其章章者著之篇中，“戮”之义为选取。
1173. 在“翁闻其言，涣焉无少凝滞于胸臆”中，“涣焉”之义为消散解开的样子。
1174. “肾主纳气”指的是摄纳肺吸入的清气。
1175. 临产前，宫口开全时直径达 10cm

1176. 目前冠心病心绞痛的诊断主要依据心电图有显著的 S 段压低。
1177. 在“凡治病必察其下”中，“下”的意义是脚
1178. 将水肿分为阴水、阳水的医家是严用和。
1179. 在两之以九窍之变中，“两”之义为用如动词。
1180. 肘横纹中，肱二头肌腱桡侧缘的腧穴是尺泽。
1181. 慢性支气管炎发展为肺心病的 X 线征象是右心室增大。
1182. 在“岁次甲子黄钟之吉”中，“黄钟之吉”是指十一月初一。
1183. 在“室庐坟墓以万计”中，“庐”之义为房舍。
1184. 在“俨然峨高冠、窃虚誉矣”中，“俨然”之义为一本正经地。
1185. 在“亡如世鲜知十之才士，以阙如为耻”中，“鲜”的义为缺少。
1186. 在“从老得终，闷若无端”中，“端”之义为原因。
1187. 造成慢性伤筋最常见的原因是持续劳损。
1188. 在“志存救济，故亦曲碎论之”中“救济”之义为救世济民。
1189. 久卧则伤气。
1190. “夺血者无汗”的理论依据是失血伤津。
1191. 患者，男，60 岁，腹胀，大便干结，小便清长，舌淡苔白，脉涩，宜选火麻仁。
1192. 在足大趾末节内侧，距趾甲角 0.1 寸的腧穴是隐白。
1193. 高渗性缺水早期临床表现是口渴。
1194. 《证治汇补》指出，吐酸不仅有热，而且有寒。
1195. 能疏肝解郁，升阳举陷的药物是柴胡。
1196. 在慢性阻塞性肺疾病患者的教育和宣教中，教育内容包括正确及安全使用氧气，预防感冒和戒烟。
1197. 在“离左西南，月朔死而速冷”中，“酉”为地支记时，为午时，离”是八卦名，亦指午时，如此记时法在修辞上叫作错名。
1198. 在“夫彀劲弩者，效力于发箭”中，“彀”之义为拉满弓弩。
1199. 叶枯不落，花槁不零”，“落”与“零”属于同义避复。
1200. 指关节梭形畸形常见的疾病是类风湿性关节炎。
1201. 在“古之仙人者，皆由学以得之？将特禀异气耶”中，“特”之义为是……还是……
1202. 羚羊钩藤汤的臣药是桑叶。
1203. 利水渗湿作用较强，治疗水湿停滞所致小便不利，水肿，泄泻，带下宜首选猪苓。
1204. 依照法律规定剥夺犯罪人某种权益的强制方法是刑罚。
1205. 理解传统中医药文献文意的最基本方法是进行提要钩玄。
1206. 在“其论医，诸老宿莫能持难”中，“持难”之义为自持己见而问难。
1207. 无头疽的临床特征是难消难溃难敛。
1208. 目前我国最常用的智力量表是斯坦福比纳智力量表。
1209. 在“虽不持钱者，皆与善药，积券如山，未尝诣取直中”，“诣”的意义是命令。
1210. 妊娠晚期，若见头痛眩晕，突然昏不知人，牙关紧闭，四肢抽搐，腰背反张，较可能的脉象是弦滑而数。
1211. 现代推算预产期公式是：从未次月经的第一天起，月数加 9 日数加 7。
1212. 妊娠期间，咳嗽痰多，胸闷气促神疲纳呆，舌淡胖苔白腻，脉濡滑。其治法是健脾除湿，化痰止咳。
1213. 症见突然昏倒，不省人事，两目斜视或直视。面红目赤，肢体强直，口噤，项强，两手握紧拘急，甚则抽搐，角弓反张。舌红或绛，舌苔黄而燥或焦黑，脉弦数。证属风火闭窍。
1214. 皮肤出现青紫斑点或斑块，或伴有鼻衄，齿衄，或有发热，口渴，便多秘，舌质红，苔黄，脉弦数，其选方是十灰散。
1215. “术盛行而身隐约”中的“隐约”意思是潜藏。
1216. 风热袭肺证，若表寒未解，入里化热，可选用麻杏石甘汤。

1217. 五行中“火”的特性是炎上。
1218. 可出现牵涉痛的疾病是心绞痛。
1219. 治疗行痹，在取主穴的基础上，应加膈俞、血海。
1220. 称为“髓海”的是脑。
1221. 《传染病防治法》规定的甲类传染病是指鼠疫、霍乱。
1222. 具有润肺清心，养胃生津功效的药物是麦冬。
1223. 惊悸病名最早由张仲景正式提出。
1224. 补泻手法中呼气时进针，吸气时出针为泻法。
1225. 骨髓增生程度活跃的是慢性粒细胞性白血病。
1226. 因脾虚运化无力而导致的脘腹胀满，治疗应选用的治法是塞因塞用。
1227. 生活基本自理的 Barthel 指数评分结果是 60 分以上。
1228. 邪郁肺卫型风疹的首选方剂是银翘散。
1229. 金锁固精丸的主治病证是肾虚不固之遗精。
1230. 一般不出现全身性水肿的是过敏性水肿
1231. 三叉神经痛针刺按三叉神经分布区第一支，常取攒竹、鱼腰、丝竹空以阳白。
1232. 内生之湿与脾关系最密切。
1233. 在“流涕长潜”中，“潜”之义为流泪。
1234. 在“诏光禄大夫刘向校经传、诸子、诗赋”中，“诏”之义为皇帝命令。
1235. 中风病因学说中，突出以“内风”立论的是金元时期。
1236. 在“乃敢奋编摩之志，僭纂述之权”中，“僭”之义为越分。
1237. 在“神气以醇泊独著”中，“醇泊”之义为醇朴恬静。
1238. 脱位后出现的特征是弹性固定。
1239. 诊断心肌坏死最特异的标志物是 cTnI
1240. 可能出现纵膈摆动的是开放性气胸。
1241. 在“所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根”中，“从”的意义是顺应。
1242. 治疗风湿痹症，腰膝酸痛，下肢痿软无力，遇劳更甚者，应首选五加皮
1243. 在“纵绮罗满目，勿左右顾盼”中，“顾盼”之义为四下看。
1244. 在“至其统论诸药”中，“至”之义为至于。
1245. 胃肠道穿孔最典型的 X 线表现是膈下游离气体影。
1246. 具有发散、行气、行血作用的药物是辛味
1247. 在“左脏肋痛，不能转侧叩中”，“珥”是指腋下肋上
1248. “土苴”是泥土和草芥，此处用以比喻微贱药物。
1249. 在“聚毒药以共医事”中，“毒药”之义为泛指治病药物。
1250. 在“守中者无言”中，“守中”之义为笃守正道
1251. 既治疗肝气郁滞之胁肋作痛，又治疗食积不化的药物是青皮。
1252. 某年夏季，某工地 20 余名工人晚餐吃炒米饭饭后 1~3 小时，20 余名工人中 10 多名工人出现恶心上腹痛、剧烈呕吐、腹泻等，不发热，首先应考虑的食物中毒是葡萄球菌肠毒素中毒。
1253. 猩红热的病原体是链球菌。
1254. 健康人在湿热蒸汽浴室内，一次最多可停留时间为 19 分钟。
1255. 吴茱萸汤和理中丸两方组成中均含有的药物是人参。
1256. 在“俗民既不能生生而务”中，“生生”之义为珍惜生命。
1257. 腹满而吐，食不下，泄泻，时腹自痛，苔白，脉缓弱，证属太阴病。
1258. 治疗脾肾阳虚，五更泄泻，最宜与补骨脂配伍的药物是肉豆蔻。
1259. 在“当归是血家气药，以辛升运行为用，以温和燠煦为功”中“燠煦”之义为温润。
1260. 清气化痰丸的功用是清热化痰，理气止咳
1261. 某女，32 岁，月事延后 7 天，已连续 3 个周期。属于月经后期
1262. 在“其母怀躯，阳气内养中”，“怀躯”之义为怀孕。
1263. 胃脘灼痛，痛势急迫，烦躁易怒，泛酸嘈杂，口干口苦，舌红苔黄脉弦或数。其

治法是疏肝泄热和胃。

1264. 肝脏进行性肿大，质地坚硬如前额，多见于肝癌。
1265. 某制革厂设在室内的废水池闸门堵塞，一名工人欲用水泵抽废水疏通，下池后即感胸闷，爬出时突然神志不清，有 3 名工人进行救助，也先后昏倒。治疗时应预防肺水肿。
1266. 胞宫通过胞脉、胞络直接与心、肾相联系。
1267. 胃肠黏膜分泌过多液体引起的腹泻称为分泌性腹泻。
1268. 在“空悬先天之图”中，“空”之义为徒然。
1269. 细菌性痢疾的主要传播途径是粪-口传播。
1270. 近视眼中 3D 或 3D 以下称为轻度近视
1271. “先生能以术仁其民”的“仁”义为爱怜。
1272. 在“噤逐相与评鹭而授之梓中”，“鹭”之义为评定。
1273. 在“踞炉而坐，火燎其裳”中，“踞”的意义是靠近。
1274. 大便干燥如羊屎，艰涩难下，数日一行，腹胀作痛，属肠燥津亏证。
1275. 期颐听所指老人的年龄是百岁。
1276. 为门诊癌症疼痛患者开具的麻醉药控缓释制剂用量不超过 15 日。
1277. 结核菌素试验阳性者，常提示体内有活动性病灶。
1278. 腹中雷鸣切痛，胸胁逆满，呕吐，为寒邪上逆，宜以附子粳米汤温中降逆。
1279. 在“有如此木”中，“木”之义为棺木之神灵。
1280. 长于鼓舞脾胃清阳之气而治疗湿热泻痢，脾虚泄泻的药物是葛根。
1281. 患者尿中带血，小便频数，赤涩热痛，舌红脉数，治宜用小蓟饮子。
1282. 气秘属气虚下陷、肛门坠胀者，可用补中益气汤合用黄芪汤。
1283. 判断营养状态最简便而迅速的方法是观察皮下脂肪充实程度。
1284. 乳痛最常见的原因是乳汁郁积。
1285. 症见心胸隐痛，久发不愈，心悸盗汗，心烦少寐，腰酸膝软，耳鸣头晕，气短乏力，舌红，少苔，脉细数。证属心肾阴虚。
1286. 手厥阴心包经的起止穴分别是天池、中冲。
1287. 用手指捏住肌肉或肌腱两侧并稍用力向上提起，然后放松的一种手法称为拿法。
1288. 与足厥阴肝经相交接的经是足少阳胆经。
1289. 目部五脏分属中的水轮是指瞳仁。
1290. 在“奋拳击其尻三下”中，“尻”之义为臀部。
1291. 主治外感凉燥证的方剂是杏苏散。
1292. 十枣汤的用法为芫花、甘遂、大戟研粉，大枣煎汤送服。
1293. 非特异性感染的细菌是大肠杆菌。
1294. 生化汤的主治病证是产后血虚，寒凝瘀阻证。
1295. 吐酸属热证者，治疗方剂是左金丸
1296. 公安机关有时会使用测谎仪帮助鉴别犯罪嫌疑人，其使用的原理主要是人在情绪反应时，常常伴随一定的生理唤醒。
1297. 念珠菌性阴道炎外治药物应选用制霉菌素。
1298. 望口唇的颜色、润燥变化主要反映脾胃情况。
1299. 阴跷脉的郄穴是交信
1300. 应用甲醛熏蒸，达到灭菌要求需用 6~12/小时。
1301. 首先提出“三因学说”的是陈无择。
1302. 中药的研制生产、经营、使用和监督管理依照《中华人民共和国药品管理法》。
1303. 在“拘于鬼神者，不可与言至德”中，“至德”此指高深的医理。
1304. 具有凉血止血，清肝火功效的药物为槐花。
1305. 取头、面、胸、腹部腧穴，最适宜的体位是仰卧位。
1306. 在“使探宝者不止一藏，尝鼎者不止一脔”中，“尝鼎一脔”之义为浅尝辄止。
1307. 负性生活事件是指个体感觉不愉快的事件。

1308. 腹痛伴里急后重，最常见的疾病是急性细菌性痢疾。
1309. 小便频数，排尿灼热涩痛，小便短赤，尿血，腰痛，发热口渴，属膀胱湿热证。
1310. 由水谷精气中的慄悍滑利部分所化生的是卫气。
1311. 甲胎蛋白测定对诊断原发性肝癌有较高特异性。
1312. 十枣汤服用的最佳时间是清晨空腹服。
1313. 在“余有戚某过余斋，形色困急，询知患咳经月”中，“经月”之义为个月。
1314. 月经周期时或提前，时或延后，经量或多或少，色黯红有块；脘腹胀满不舒，胸胁乳房胀痛。苔薄黄，脉弦。其治疗法则应为疏肝理气调经。
1315. 虚证的概念是以正气不足，抗病能力低下为主的病理变化。
1316. H. Selye 认为，对机体有害的各种应激源，可引起下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴为主的非特异性反应。
1317. 女患者，月经每 20 日一行，量多色淡，小腹空坠隐痛，纳少便溏，诊断为月经先期。
1318. 在“故《易》曰：后以裁成天地之道”中，“后”之义为君王。
1319. 静止性震颤可见于帕金森病。
1320. 正治的定义是逆着疾病现象而治的治疗方法。
1321. 一侧眼睑闭合障碍，最可能的原因是面神经麻痹。
1322. 在“圣人图设沟渠，通利水道，以备不然”中，“图设”之义为规划设计。
1323. 热毒壅肺，化腐成脓者，其痰液表现是咳吐脓血腥臭痰。
1324. 二尖瓣关闭不全的典型体征是心尖区全收缩期杂音，向左腋下传导。
1325. 既能温经止血、散寒止痛，又能止咳平喘的药物是艾叶。
1326. 诊断慢性前列腺炎时，前列腺镜检白细胞数为>10 个/视野。
1327. 在“性笃行贞，心无怨贰”中，“贰”之义为怀疑。
1328. 性微温而善于芳香化湿的药物是藿香。
1329. 在“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》”中“撰”之义为通“选”，选取
1330. 《灵枢·经脉》说足厥阴肝脉连目系。
1331. 心、脾两脏可同有血虚的证候。
1332. 治疗风火牙痛的组穴是合谷、下关、颊车、外关、风池。
1333. 导致胎漏、胎动不安的主要病机是冲任损伤，胎元不固
1334. 与正气的强弱相关的因素是精神状态。
1335. 在腰部，后正中线上，第 2 腰椎棘突下凹陷中的腧穴是命门。
1336. 在“五脏脉已绝于内，用针者反实其外”中，“绝”之义为虚损。
1337. 太乙神针属于实按灸。
1338. 喘鸣音属于干啰音。
1339. 判断肩关节脱位整复成功的试验标志有搭肩试验阴性。
1340. 对提高机体免疫力、预防传染病起关键作用的是预防接种。
1341. 根据中国九分法，成人双上肢全部烧伤，其面积为 18%。
1342. 调整对刺激事件的认识态度就是使事件变得可控制、可预测
1343. 吲哚美辛(消炎痛)退热的机理是抑制 PGE<sub>2</sub> 在脑内合成并增加脑组织中的环磷酸腺苷。
1344. “今之游权门、食厚奉者”中“食”意思是享受。
1345. 出现潮式呼吸最主要的原因是呼吸中枢兴奋性降低。
1346. 鉴别蓄水证与蓄血证最有意义的是小便自利或不利。
1347. 主动脉瓣关闭不全患者心浊音界是靴形。
1348. 食道常规造影检查使用的造影剂是硫酸钡。
1349. 血清补体活性增高常见的病因是急性炎症。
1350. 评价医德行为善恶的根本标准是有利于患者，有利于医学发展，有利于生存环境的改善。
1351. 舌体两侧出现青紫色斑点，多考虑肝的病变

1352. 有猩红热接触史的易感儿应检疫观察 7 天
1353. 肝肾阴虚，风气内动型脑瘫康复宜滋补肝肾，熄风止痉，选方大定风珠汤加减。
1354. 六淫中易生风动血的是火(热)邪。
1355. 患者心悸健忘，失眠多梦，头晕面白，唇舌色淡，脉细，宜诊为心血虚证。
1356. 具有安静沉着、稳重、情绪反应慢特征的气质类型是黏液质。
1357. 耳鸣如蝉，昼夜不息，耳聋渐发，逐渐加重，其辨证为肾精亏损。
1358. 流行性脑脊髓膜炎的确诊依据是脑脊液与皮肤瘀点涂片及培养找到病原菌。
1359. 在“相火翕然而起，虽不交会，亦暗流而疏泄矣”中，“翕然”之义为一致
1360. 孕妇当慎用牛黄。
1361. 心神是指主宰整个人体精神意识和思维活动。
1362. 地龙与僵蚕的共同功效是息风止痉。
1363. 在“时天圣四年岁次析木中”，“析木”之义为十二星次之
1364. 最适合肩肘伸屈的作业训练是打篮球。
1365. 《经传释词》一书专门讨论先秦两汉古籍中的虚词。
1366. 成人窦性心动过速，是指窦性心律的频率>100 次/分。
1367. 青蒿既能清暑热又能退虚热的药物。
1368. 患者发热口渴，咳喘胸痛，气热鼻扇，尿赤便秘，舌红苔黄，脉数，宜诊为肺热炽盛证。
1369. 麻疹传染性最强时期为前驱期
1370. 白带量多，外阴奇痒，阴道内见凝乳样白带，其诊断应为霉菌性阴道炎
1371. “湿滞经络”的病机是湿邪袭络，留着关节。
1372. 肉桂入煎剂研末冲服时的剂量分别是 1-4.5g、1-2g
1373. 瘀血病证所出现的疼痛之特征是刺痛。
1374. 逆证候性质而治的治则是正治法。
1375. 食积腹痛重证宜用枳实导滞丸。
1376. 在“疾医掌养万民之疾病”中，“疾医”是指内科医生。
1377. 口服有机磷杀虫药后中毒症状出现时间是 5~20 分钟。
1378. 舌伸于口外，不能回缩，或舐口唇周围上下左右，称为吐弄舌。
1379. 对牙刷通过反复实践进行辨认，属于物品失认训练方法。
1380. 川芎茶调散的主治病证是外风头痛。
1381. 五味子主要功效是收敛固涩、益气生津、补肾宁心。
1382. 既能清热燥湿又善于治疗下焦湿热诸证和阴虚发热的药物是黄柏
1383. “诸风掉眩”皆属于肝。
1384. 苓桂术甘汤的功用是温阳化饮，健脾利湿。
1385. 补阳还五汤的君药是生黄芪。
1386. 桑白皮治疗的病证是肺热咳喘，痰多壅盛
1387. 妊娠五个月，腹部增大异常，胸膈满闷，呼吸短促，神疲体倦，舌淡胖，苔白，脉沉滑无力。其治疗常用方鲤鱼汤。
1388. “不诬方将，请俟来哲”中不诬方将“谓不欺骗正在学医的人。
1389. 慢性阻塞性肺气肿患者语音震颤的表现是双侧减弱。
1390. 卵子从卵巢排出，在输卵管峡部与壶腹部交界处受精。
1391. 粪便外观呈白陶土色，最可能的是阻塞性黄疸。
1392. 症见心胸痛如缩窄，遇寒而作，形寒肢冷，胸闷心悸，甚则喘息不得卧，舌淡，苔白滑，脉沉细或弦紧。证属寒滞心脉。
1393. 寒痰湿浊凝滞于胸中，胸阳不振，咳唾胸痹，宜选用的药物是今
1394. “若令服食终日，则肉飞骨腾”中的“肉飞骨腾”喻身体轻捷，能飞升上天
1395. ASTm 升高提示的临床疾病是重症肝炎、肝坏死
1396. 水痘毒热重证的首选方剂是清胃解毒汤。
1397. 陈旧性脱位的复位固定过程中，最关键的步骤是活动解凝。

1398. 在“扁鹊以其言饮药三十日，视见垣一方人”中，“垣”之义为矮墙。
1399. 腋测法正常成人体温是  $36^{\circ}\text{C}\sim 37^{\circ}\text{C}$ 。
1400. 紫苏既能发表散寒，又能行脾胃气滞、安胎的药物。
1401. 激情的特点是短暂且爆发。
1402. 与乳汁的排出关系最密切的脏腑是肝。
1403. 依据糖尿病诊断标准，确诊糖尿病选用血浆血糖。
1404. 在“被发及地，搏膺而踊”中，“膺”的意义是胸。
1405. 在“目惑玄黄”中，“玄黄”之义为泛指天地万物。
1406. 阳黄湿重于热，首选茵陈五苓散合甘露消毒丹。
1407. 胸痹缓解期主要表现为脏腑阴阳气血亏虚，其中心气虚最为常见。
1408. 患者产后三日，不慎受寒，次日恶露停止，小腹冷痛，治疗应首选的方剂是生化汤。
1409. “有素不相识，遇延辨证，病家既不识医，则倏赵倏钱，医家莫肯任怨，则惟芩惟梗”中的“唯芩惟梗”意思是用药敷衍塞责。
1410. 具有脉短如豆，滑数有力特征的脉象是动脉。
1411. 小儿昏睡露睛多属于脾虚气血不足。
1412. 男性，67岁。外出旅游中突发高热、寒战，伴腰痛、尿痛，最先考虑的检查是尿常规、尿培养。
1413. 乳痈溃脓后疼痛减轻，但创面流脓清稀，淋漓不尽，日久不愈，伴全身乏力，面色少华，纳差，舌质淡，苔薄，脉弱无力。证属正虚邪恋证。
1414. “丹青绮焕，备庶物之形容”中“形容”的意思是形态状貌。
1415. 从冬至春及夏的气温变化，说明阴阳之间的关系是消长平衡。
1416. “故水病者，下为肘肿大腹，上为喘呼不得卧”的病理基础是肺肾功能失常。
1417. 肺经腧穴中，治疗咽喉肿痛的首选穴是少商。
1418. 心悸怔忡，心胸憋闷，气短自汗，神疲乏力，畏冷肢凉，舌淡胖，苔白滑，脉弱，属心阳虚证。
1419. 在“人有此三者，是谓坏府，毒药无治”中，“毒药”泛指治病之药。
1420. “初者，病邪初起，正气尚强，邪气尚浅，则任受攻；中者，受病渐久邪气较深，正气较弱，任受且攻且补；末者，病魔经久，邪气侵凌，正气消残，则任受补。”此语出自《医宗必读》。
1421. 把“不知自古神圣未有舍望闻问而独凭一脉者”中的“自”译成“即使”，是古文今译法中的替换。
1422. 带下量多，赤白相兼，质粘腻，小腹疼痛，烦热口渴，中医辨证为热毒。
1423. 膀胱三角区及左侧壁散在乳头状瘤，有蒂，周围黏膜红，活检为原位癌，细胞分化3级，最好的治疗是膀胱全切和回肠膀胱术。
1424. 乳痈正虚邪恋者，内治方选托里消毒散。
1425. 与神阙平齐的腧穴是带脉。
1426. 恶寒与发热交替而作，此症是邪在半表半里。
1427. 与防止出血密切相关的两脏是肝与脾。
1428. 具有疏肝解郁行气功效的药物是薄荷。
1429. 可用于骨折损伤初期的是复元活血汤。
1430. 妇科杂病重在调治肝肾脾。
1431. 骨及关节病变X线检查的首选方法是摄片检查。
1432. 在健康教育的实际效果评价活动中，重点是行为改变。
1433. 治疗脾虚型经行泄泻的最佳方剂是参苓白术散。
1434. 经间期出血，量少，色红，质粘，无血块，神疲乏力，胸闷烦躁，苔白腻，脉细弦，其治法是清利湿热。
1435. 治疗阴虚火旺，肺肾阴虚所致盗汗，骨蒸潮热，心烦等证，首选药组是黄柏、知母。

1436. 传染病的基本特征是有传染性、病原体、免疫性和流行性。
1437. “自古名贤治病，多用生命以济危急”中的“生命指活物。”
1438. 出现在应激源反应中不同的原因是因为个体对于应激源的认知评价不同
1439. 肝郁脾虚型肝炎可用逍遥散。
1440. 以脘腹胀满，胃中有振水声，呕吐清水等为主要表现的证候是寒饮停胃证。
1441. 人格包括人格特质和人格倾向。
1442. 创立儿科“五脏证治法则”的专著是《小儿药证直诀》
1443. 在服法中要求“香气大出，即取服，勿过煮”的方剂是银翘散。
1444. 严重的酸中毒患者的呼吸是 Kussmaul 呼吸。
1445. 头后部疼痛，痛引项背者多为太阳头痛。
1446. 肾下垂或游走肾，采用立位体位最容易触到。
1447. 镇肝息风汤中配伍生麦芽的用意是疏肝理气。
1448. 治疗冷秘的主方是济川煎。
1449. 治疗痰饮呕吐的首选组方是章门、公孙、中脘、丰隆。
1450. 伤寒第一次菌血症相当于临床上的潜伏期。
1451. 在“夫惟立言垂训之士有形乎著述之间，其碌碌者当趁起犹预之余，得不靡然从令，争先快睹，而趋简略之地乎？”中，作者认为“仲景之法委废大半”的主要责任者是立言垂训之士。
1452. 小儿传染病发病率最高的年龄段是幼儿期。
1453. 具有软坚散结功效的药物是牡蛎。
1454. 风疹的隔离期是至出疹后 5 天。
1455. 内燥的主要临床表现是口咽干燥，皮肤干涩粗糙，毛发枯不荣，肌肉消瘦，大便干结。
1456. 正常人昼夜尿最高比重与最低比重之差不少于 0.009
1457. 钩体病病原体治疗首选大剂量青霉素。
1458. 一侧胸廓饱满，叩诊鼓音，最可能的疾病是气胸。
1459. 在“凡刺之真，必先治神”中，“真”之义为正法。
1460. 在“王辰之秋，兵发中原，大江之南，所在皆绎骚中”，“绎骚”之义为扰动，骚乱。
1461. 心电图改变有助于区别心肌梗死和变异型心绞痛的是病理性 Q 波。
1462. “固非敢弄斧班门，然不屑沿街持钵”中的“不屑沿街持钵”意思是不愿依赖别人
1463. 泪腺有几个主要的功能，除了营养眼球。
1464. 在“以柴胡为君，黄芩为臣，以成彻热发表之剂”中，“彻”之义为除。
1465. 心脾两虚型老年性痴呆康复时宜健脾利湿，养心安神。
1466. 在“战国从衡，真伪纷争，诸子之言纷然殽乱”中，“从衡”之义为错综复杂的政治形势
1467. 蜘蛛痣不应该出现于脐部。
1468. 在“岁且数千，方通万卷，专车之不受，广厦之不容”中，“受”之义为容纳。
1469. 未经批准擅自开办医疗机构行医应承担的行政责任主要是行政处罚。
1470. 苏子降气汤主治证的病因病机是痰涎壅肺，肾阳不足。
1471. 麻疹的主要传播途径是空气飞沫。
1472. 荆芥入汤剂不宜久煎。
1473. 三仁汤中配伍杏仁的用意是宣利上焦肺气。
1474. 《圣济总录》首次将咽与喉的功能分属不同之脏腑，其为肺、胃。
1475. 胃大部切除术后出现贫血主要是由于减少了壁细胞。
1476. 慢性腹痛的常见病因是结核性腹膜炎。
1477. 面瘫的恢复，应加用足三里。
1478. 在“五脏有五脏之真精，此元气之分体者也”中，“分体”之义为部分。
1479. 妇人脏躁病在心肾脾。
1480. 小儿厌食脾失健运证的治法是调和脾胃，运脾开胃。

1481. 症见发热，微恶寒，少汗，头痛，鼻流浊涕，多因外感风热之邪。
1482. 中医精气神学说中“神”的含义是指人体生命活动的外在表现。
1483. 骨度分寸规定，髌枢至膝中的距离是 19 寸。
1484. 井主心下满，荣主身热，输主体重节痛，经主喘咳寒热，合主逆气而泄”出自《难经》。
1485. 在“洎周之王，亦有冢卿格于医道”中，“格”之义为探究。
1486. 心理测量工具好坏的最基本标志是信度和效度。
1487. 在“一以参详，群疑冰释”中，“冰”为名词作状语，其意义是表比喻，像冰一样。
1488. 在 TPN 期间，发生高糖高渗性酮性昏迷的原因为未掌握好单位时间内
1489. 葡萄糖的入量
1490. 四逆散的君药为柴胡。
1491. 崇尚自然、欣赏艺术、提倡文明体现的情感是美感
1492. 复方新诺明是由磺胺甲噁唑与甲氧苄啶组成。
1493. 针刺环跳穴的最佳体位是侧卧位
1494. 新石器时代已出现外伤科名医俞跗
1495. 治疗痰厥实证的组穴是水沟、内关、巨阙、丰隆。
1496. 清暑益气汤的功用是清暑益气，养阴生津。
1497. 哮喘发作期基本病理变化是痰气相搏，阻于气道。
1498. 肺的通调水道功能主要依据于肺主宣发与肃降。
1499. 分娩时子宫各部分收缩最弱的是子宫颈。
1500. 在“疡医掌肿疡、溃疡、金疡、折病之祝药、剂杀之齐”中，“疡医”之义为相当于今之外科、骨伤科医生。
1501. 肺主通调水道的功能主要依赖于肺主宣发和肃降。
1502. 活血祛瘀剂补阳还五汤的君药是黄芪。
1503. 病人神识不清，语无伦次，声高有力，属于谵语。
1504. 在“以垂医鑑而活苍生中，医鑑”之义为医学经验
1505. “寒主收引”是指使气机收敛，经络筋脉挛急。
1506. 每逢经期口舌糜烂，口燥咽干，五心烦热，其辨证为阴虚火旺。
1507. 与咽喉关系最密切的脏腑是肺胃。
1508. 在五脏脉已绝于外，用针者反实其内”中，“实”之义为补
1509. 妊娠期，腰酸腹痛，胎动下坠，或阴道少量下血，中医诊断为胎动不安
1510. 风疹病毒有致畸作用。
1511. 脉来细小如线，应指明显是细脉
1512. 妇产科最早独立分科于宋代
1513. 菡川王美人怀子而不乳”(《史记·扁鹊仓公列传》)中的“乳”义是生产。
1514. 心火移热于小肠的主要特征性表现是尿赤涩痛。
1515. 平胃散主治病证的病机是湿滞脾胃。
1516. 瘀血胸痹疼痛的特点为刺痛固定不移、痛有定处、夜间多发。
1517. 限制胫骨向前移位的是前交叉韧带。
1518. 成年女性血红蛋白的正常值是 110-150g
1519. 在四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮”(《素问·上古天真论》)中四七”表示的是乘数
1520. 在“用九数，饮于白后之井中，“白”之义为西方。
1521. “至道流行，徽音累属”中的“属属”的意思是接续。
1522. 大失血所致的气脱，称为气随血脱证
1523. 足三阴经都可以主治妇科，前阴病。
1524. 肾盂肾炎血行感染最先侵犯的部分是肾皮质。
1525. 针灸治疗中风病中脏腑，应取用手厥阴经、督脉为主。
1526. 太阳经头痛的特征是后头部连项痛。
1527. 胃中郁热，失于和降，治宜橘皮竹茹汤。

1528. 生地、熟地同用的方剂是百合固金汤
1529. 治疗风火牙痛的首选穴合谷、内庭。
1530. 血瘀所致经行头痛的临床特点是经前经期头痛剧裂如针刺
1531. 在《时方》盛行陈师文, 裴宗元所定大观二百九十七方中, “时方”之义为当时正在
1532. 感冒主因为感受触冒风邪。
1533. 外感温燥, 治宜选用桑杏汤。
1534. 消食药的服务时间是饭后服
1535. 独活寄生汤组成中含有的药物是细辛、防风。
1536. 能缓和拘急疼痛的药物大多具有的药味是甘味。
1537. 每逢经行头晕目眩, 月经量多, 色鲜红, 口干咽燥, 烦躁易怒, 其辨证为阴虚阳亢。
1538. 在夜虚守静人物, 人物则遑”中, “遑”之义为闲暇。
1539. “良工所失, 不知病情, 此亦治之一过也”(《素问·疏五过论》)过”表示的是序数
1540. 胃的特性之一是喜润恶燥主降。
1541. 气机指的是气的运动。
1542. 四逆散的君药为柴胡。
1543. 崇尚自然、欣赏艺术、提倡文明体现的情感是美感
1544. 复方新诺明是由磺胺甲噁唑与甲氧苄啶组成。
1545. 针刺环跳穴的最佳体位是侧卧位
1546. 眩晕的病机与虚火风痰瘀关系最为密切
1547. 胸膜粘连最常见的部位是肋膈角处。
1548. 气血亏虚型缺乳, 宜选用的最佳方剂为通乳丹。
1549. 喉性呼吸困难轻重可IV度。
1550. 泄泻在《内经》一书中称为泄。
1551. 痰火扰神型癫痫可选用当归龙荟丸
1552. 在今只河车一物, 岂遂为厉如是中, 听厉”之义为祸害。
1553. 阴虚感冒少汗的病因病机是津少不能作汗。
1554. 治疗肝肾阴虚型经行乳房胀痛的最佳方剂是一贯煎。
1555. 贫血的概念是指外周血单位体积中红细胞、血红蛋白量低于正常。
1556. 骨折愈合的基础是骨膜细胞增生。
1557. 形成“实”的病机变化最根本的是邪气亢盛。
1558. 医师在医疗活动中对病人和社会履行义务的道德责任感和自我评价能力, 谓之医  
师的良心
1559. 忍病十岁, 寿俱当尽, 不足故自剥裂”中的“故”义为特地
1560. 止嗽散的组成中含有百部。
1561. 消渴病名首见于《内经》。
1562. 肝经郁热型产后乳汁自出, 宜选用的最佳方剂为丹栀逍遥散加减。
1563. 八脉交会穴的记载首见于《针经指南》。
1564. 由于人类活动所造成的环境污染的主要来源是生产性污染、生活性污染、交通运  
输工具。
1565. 新石器时代已出现外伤科名医俞跗
1566. 治疗痰厥实证的组穴是水沟、内关、巨阙、丰隆。
1567. 清暑益气汤的功用是清暑益气, 养阴生津。
1568. 哮喘发作期基本病理变化是痰气相搏, 阻于气道。
1569. 肺的通调水道功能主要依据于肺主宣发与肃降。
1570. 分娩时子宫各部分收缩最弱的是子宫颈。
1571. 在“疡医掌肿疡、溃疡、金疮、折病之祝药、剂杀之齐”中, “疡医”之义为相当于今  
之外科、骨伤科医生。
1572. 限制胫骨向前移位的是前交叉韧带。
1573. 成年女性血红蛋白的正常值是 110-150g

1574. 在四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮”(《素问·上古天真论》)中四七”表示的是乘数
1575. 病人神识不清，语无伦次，声高有力，属于谵语。
1576. 在”以垂医鑑而活苍生中，医鑑”之义为医学经验
1577. ”寒主收引”是指使气机收敛，经络筋脉挛急。
1578. 每逢经期口舌糜烂，口燥咽干，五心烦热，其辨证为阴虚火旺。
1579. 与咽喉关系最密切的脏腑是肺胃。
1580. 眩晕的病机与虚火风痰瘀关系最为密切
1581. 胸膜粘连最常见的部位是肋膈角处。
1582. 气血亏虚型缺乳，宜选用的最佳方剂为通乳丹。
1583. 喉性呼吸困难轻重可IV度。
1584. 泄泻在《内经》一书中称为泄。
1585. 戴上大腿假肢后出现外展步态，可能原因为长度过长
1586. ”风为百病之始”出自《素问·骨空论》。
1587. 县级以上各级人民政府应当采取措施加强对中医药文献的收集、整理、
1588. 研究和保护工作。
1589. 遗精之主宰在心，精之藏制在肾”出自《证治汇补》
1590. 症见卒然仆倒，不省人事，四肢强痉拘挛，口中有声，口吐白沫，烦躁不安，气高息短，痰鸣漉漉，口臭便干。舌红或暗红，舌苔黄腻，脉弦滑。证属痰火扰神。
1591. 中寒的最佳方法是助阳破阴，温里祛寒。
1592. 不寐的病机特点为阳盛阴衰，阴阳失调。
1593. 咳嗽发生的病机关键在于肺脏功能失调。
1594. 在”夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎!中，作者的语气是热情。
1595. 在”有此一者，则重难治也中，”重”之义为甚。
1596. 肺癌最早见的症状是咳嗽。
1597. 恐怖症最常用的行为治疗方法是系统脱敏。
1598. 智力发展最快的时期是儿童期。
1599. 与脑的生理功能关系最密切的脏腑是心肝肾。
1600. 最早把”疳”列为脾胃病的儿科医家是钱乙。
1601. 六淫中最易致疼痛是寒邪
1602. 要查找孔子老者安之，少者怀之”一语的具体出处，应首先查检《十三经索引》。
1603. 既能治疗脾虚水肿，又可健脾安神的药物是茯苓
1604. ”产后…虚劳不足”用当归生姜羊肉汤治之，记载的著作为《金匱要略》。
1605. 肝胃郁热之胃痛，其治法为疏肝泻热和胃。
1606. 心理测验工作应遵守的原则为客观、保密、标准化。
1607. 根据阴阳属性的可分性，一日之中属于阴中之阳的是后半夜。
1608. 大补阴丸中熟地、龟板与知母、黄柏的用量比例为3:2。
1609. 锤状指”带有撕脱小骨片时，保守治疗固定的位置为近侧指间关节屈曲，远侧指间关节过伸位
1610. 水肿的治疗原则是发汗、利尿、攻逐。
1611. 独活具有的功效是祛风湿，止痛，解表
1612. 病例与对照配比的因素，必须是已知的混杂因素或至少有充分理由怀疑的混杂因素。
1613. 能行血中气滞，气中血滞”，”专治一身上下诸痛的药物为延胡索。
1614. 在”且如气口脉盛，则知伤食中，”且”之义为语首助词，无义。
1615. 临床上因受风常表现为颜面肌肉抽掣，或眩晕、震颤、抽搐、颈项强直、角弓反张等，此为风邪的风性主动。
1616. 百合固金汤的主治证候中常见咳痰带血
1617. 治疗筋骨折伤，首选的药组是地鳖虫、骨碎补、自然铜。

1618. 动脉血氧分压的正常值是 95-100mmHg
1619. 循证医学中最好的证据是指大规模的随机对照临床试验。
1620. 墨菲征阳性提示急性胆囊炎。
1621. 痰火扰神型癫痫可选用当归龙荟丸
1622. 在今只河车一物，岂遂为厉如是中，听厉”之义为祸害。
1623. 阴虚感冒少汗的病因病机是津少不能作汗。
1624. 治疗肝肾阴虚型经行乳房胀痛的最佳方剂是一贯煎。
1625. 贫血的概念是指外周血单位体积中红细胞、血红蛋白量低于正常。
1626. 骨折愈合的基础是骨膜细胞增生。
1627. 形成“实”的病机变化最根本的是邪气亢盛。
1628. 医师在医疗活动中对病人和社会履行义务的道德责任感和自我评价能力，谓之医师的良心
1629. 忍病十岁，寿俱当尽，不足故自割裂”中的“故”义为特地
1630. 止嗽散的组成中含有百部。
1631. 消渴病名首见于《内经》。
1632. 肝经郁热型产后乳汁自出，宜选用的最佳方剂为丹栀逍遥散加减。
1633. 八脉交会穴的记载首见于《针经指南》。
1634. 由于人类活动所造成的环境污染的主要来源是生产性污染、生活性污染、交通运输工具。
1635. 治疗湿热内蕴证的最佳方药是甘露消毒丹。
1636. 在“扁鹊曰：敬诺”中，“敬诺”之义为应答之词，犹言遵命。
1637. 在“至于遁天倍情，悬解先觉中，“倍”之义为违背。
1638. 中医理论体系的主要特点是整体观念和辨证论治。
1639. 桑菊饮中体现“升降配伍”的药对是桔梗与杏仁
1640. 治疗痰火型心悸的组穴首选尺泽、丰隆、肺俞、郄门。
1641. 提出“上医治未病之病、中医治将病之病、下医治已病之病”的是孙思
1642. “虚”的病机概念，主要是指正气虚损。
1643. 有关马斯洛五个需要层次由低到高的顺序，为生理的需要、安全的需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要。
1644. 机体阳气不足最多涉及的脏腑是脾肾。
1645. “谓沉为伏，则方治永乖；以缓为迟，则危殆立至”，意在说明诊脉必须审慎。
1646. 初发传染病已转入恢复期，而初发病的症状再度出现，称为混合感染
1647. “用细茶脚汤煮之，一伏时了取出，又研一万匝，方入”（《雷公炮炙论》）中“一万匝”表示的是虚数
1648. 婴儿期的年龄范围 0-1 岁。
1649. 国家实行医师资格考试制度，目的是检验评价申请医师资格者是否具备从事医学实践必需的基本专业知识与能力。
1650. 青春期主要的自我意识矛盾是独立与依赖。
1651. 夏枯草的药用部位是带花的果穗。
1652. 眩晕而见头重如蒙，胸闷恶心，食少多寐，苔白腻，脉濡滑。治用半夏白术天麻汤。
1653. 则泻之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之出自《灵多
1654. 小儿五脏“三不足，二有余”是万全提出的
1655. 腮腺管开口的部位在上颌第二臼齿相对应的颊黏膜上。
1656. 治疗肝气郁结型经行乳房胀痛的最佳方剂是柴胡疏肝散。
1657. 全社会应当尊重医师，医师依法履行职责时应受法律保护。
1658. 怀孕后阴道有少量出血，色淡红，质清稀，小腹空坠而痛，腰酸，心悸气短，神疲肢倦，舌质淡，苔薄白，脉细弱。其证候为气血虚弱。
1659. 在“三试于乡，不售中，“不售”之义为未考中
1660. 引起呕血最常见的疾病是消化性溃疡。

1661. 解表药中既有升阳,又可解毒的药物为升麻。
1662. 根据违法行为的性质和危害程度的不同,法律责任可分为民事责任、行政责任、刑事责任
1663. 六腑中与情志有关的脏腑是胆。
1664. 在循行过程中连舌本、散舌下的经脉是足太阴经
1665. 痢疾的基本特征是里急后重。
1666. 归脾经的食物是猪肉、莲藕。
1667. 关于医学心理学的实验研究方法,其主要特点是只在有目的的一定控制条件下进行。
1668. 食管癌高发区现场普查首选食管黏膜脱落细胞检查。
1669. 猩红热的高发季节是冬春。
1670. 既能行气止痛,又能温肾散寒的药物是乌药。
1671. 在“近仆自淮南携累而东归也”中,“仆”指的是赵子贞。
1672. 尿胆原定性和定量检查有助于肝细胞性黄疸和胆汁淤积性黄疸鉴别。
1673. 呼气时散发烂苹果样气味,常提示患者为消渴病危重期
1674. 脾统血的主要作用机制是控制血液在脉道内运行。
1675. 《医疗机构从业人员行为规范》是2012年6月26日公布执行的
1676. 在犹且各是师说,恶闻至论”中,“是”之义为认为正确。
1677. 活血祛瘀剂属“八法”中的消法。
1678. 舌质淡紫或紫暗而润者属于寒凝血瘀。
1679. 藿香正气散的证治要点有恶寒发热。
1680. 最容易产生内燥病变的脏腑是肺、胃、大肠。
1681. 麻杏石甘汤四药合用,清、宣、降。旁
1682. 导致泄泻发生的重要因素是脾虚湿盛。
1683. 治疗痰火上扰型经行情志异常的最佳方剂是生铁落饮
1684. 中药人工周期疗法在经前期的治则为温肾暖宫辅以滋肾益阴。
1685. 雄黄可用治的病证是虫积腹痛。
1686. 善治下半身风寒湿痹的药物是独活。
1687. 在“夫如是,是医之于医尚不能知,而矧夫非医者”中,“矧”之义为何
1688. “至虚有盛候”的病机,主要是脏腑气血极虚,外现实象
1689. 小脑病变可见醉酒步态。
1690. 《产孕集》中“尺脉转急,如切绳转珠者”描述了临产脉象变化。
1691. 迄孝武世,书缺简脱,礼坏乐崩”中孝武”为谥号。
1692. 近3个月同等程度劳累所诱发的胸痛次数、程度及持续时间均增加,应诊断为恶化型劳力性心绞痛
1693. 火热邪气的性质和致病特点是易生风动血
1694. 直肠指诊时,触到表面凹凸不平、质地坚硬的肿物,应首先考虑的是直肠癌。
1695. 头痛隐隐,时时昏晕,心悸失眠,面色少华,遇劳加重,舌质淡,苔薄白,脉细弱,宜选用加味四物汤。
1696. 在头部,当前发际上0.5寸,神庭旁开3寸的腧穴是本神
1697. 寒热并用,邪正兼顾体现了乌梅丸的配伍特点。
1698. 对疑似结肠癌的患者,应首选检查的指标是PSA
1699. 方剂中不可缺少的药物是君药。
1700. 《神农本草经》谓“安五脏,和心志,令人欢乐无忧”的药物是合欢皮。
1701. Lasegue征是神经根受刺激的表现。
1702. 冠心病患者过分卧床休息不会导致心肌耗氧量相对减少。
1703. 血瘀型胸痹主症的特点是胸部刺痛。
1704. 幼儿期指的是1~3岁。
1705. 麻疹的好发年龄是6个月到5岁

1706. 低蛋白血症可见于甲状腺功能亢进
1707. 妊娠期瘀阻胎元，使用活血化瘀药的原则是衰其大半而止。
1708. 治疗干痞的首选方剂为八珍汤。
1709. 嘴唇糜烂，多为脾胃积热
1710. 引起哮喘发作的诱因诸多，错杂相关，其中以气候变化为主
1711. 在毛发可指数也中，指的语法作用是名词作状语，用手指
1712. 呃逆连声，常由情志不遂诱发，伴胸胁胀满，辨证为气机阻滞证。
1713. 在“阳明勋业烂然，胡世宁笑其多一讲学中，“多”之义为只是
1714. 黄土汤与归脾汤均具有的作用是健脾。
1715. 砂石阻滞胆道，症见身目黄染，右胁疼痛，牵引肩背，伴恶寒发热
1716. 大便色灰白，宜选大柴胡汤加减为佳。
1717. 促进性机能成熟的物质是天癸。
1718. 镜面舌的形成机制是胃阴枯竭。
1719. 在何尔鲁钝之甚也中，“尔”之义为你
1720. 在内踝上寸处前后交叉的经脉是足厥阴肝经、足太阴脾经。
1721. “联系舌根，分散于舌下”的经脉是足太阴脾经。
1722. 脊柱前凸多发生于腰段。
1723. 在“询谋得失，深遂夙心”，遂”之义为实现。
1724. 低动力性休克与低血容量无关。
1725. 小儿单纯性肥胖症临床表现应为皮下脂肪增多，分布均匀。
1726. 在“性好吉者危言见非中，危言”之义为直陈重病的话。
1727. 苔灰黑而干燥者的主病是热极津伤。
1728. 痰湿蕴肺咳嗽伴脘痞呕恶，食少体重者，适用二陈汤。
1729. 在“周密则风寒暑湿无如之何，故终天年而无道者也”中，“道”之义为符合自然规律。
1730. 李某，既往有胆结石病史，昨日肋肋剧痛，连及肩背，恶心呕吐，纳食减退，舌红苔黄，脉弦。此时最佳治疗方剂是硝石矾石散。
1731. 形成阴疽流注的病因多为痰饮。
1732. 颈侧颌下肿块如垒，累累如串珠者，称为瘰癧。
1733. 各脏阴阳的根本在于肾。
1734. 在“厥后博物称华，辨字称康，析宝玉称倚顿，亦仅仅晨星耳中，晨星”之喻义为喻人才稀少
1735. 在“显亲扬名，即男子所有事，彼亦倏然而来者耳”中，“倏然”之义为意外忽来貌
1736. 在“饮是以上池之水中，“上池之水”之义为未沾地的雨水
1737. 随着小儿年龄的增加脉搏会减慢，血压会增高。
1738. 生化汤的组成为当归、川芎、桃仁、炮姜、甘草。
1739. 在“硝黄入口畏攻，神即飘扬”中，“飘扬”之义为涣散。
1740. 癫痫与郁病的鉴别关键是有无自我控制能力。
1741. 椒疮一名始见于《证治准绳·七窍门》
1742. 长期发热的患者，诊断伤寒最可靠的依据是血培养阳性。
1743. 以昼夜分阴阳，前半夜为阴中之阴
1744. “不寐证虽病有不一，然惟知邪正二字则尽之矣。盖寐本于阴，神其主也。神安则寐，神不安则不寐；其所以不安者，一由邪气之扰，一由营气之不足耳……此文出自《景岳全书》。
1745. 在“今之医者，不得予之法，皆仰面傲笑曰”中，“傲笑”之义为嘲笑。
1746. 桶状胸多见于肺气壅滞
1747. 多见于虚证或湿困的脉象是濡脉。
1748. 痢疾杆菌(志贺菌属)的生物学特点是无鞭毛。
1749. 在“偶偶然治差一病……谓天下无双，此医人之膏肓也”中，膏肓”之义为不可疗救的

恶行。

1750. 发热伴腹痛、呕吐、右下腹压痛及反跳痛，最可能的诊断是急性阑尾炎
1751. 在士俗坐无竹耳，使有竹，安知其俗之不可医哉中，坐”之义为因为。
1752. 在”岁饥，浙有司下遏糴令中，”糴”之义为卖出粮食。
1753. 在”如父之意，尽为人之道也”中，”如”之义为顺从
1754. 在”兴言至此，深可惊惧”中，”兴言”之义为语气助词。
1755. 病人颈部结喉处有肿块突起，或大或小，或单侧或双侧，可随吞咽而上下移动，此为瘰疬。
1756. 心脏呈梨形，心尖部可听到舒张期隆隆样杂音，其诊断为二尖瓣狭窄。
1757. 在失然后阴阳和，五气顺，荣卫固，脉络绥中，纓之义为安
1758. 治疗五更泄泻的首选方剂是四神丸。
1759. 阳和汤的组成药物除麻黄、白芥子外，其余是熟地、鹿角胶、姜炭、肉桂、甘草。
1760. 冬天小儿的尿液冷却后呈白色混浊是由于尿酸盐沉积
1761. 狂病早期为痰火上扰，久则易致火盛阴伤。
1762. 在”俾摄录事判官”中，”摄”之义为代理
1763. 若胁痛，胁肋下有癥块，而正气未衰者，可用复元活血汤加三棱、莪术、地鳖虫
1764. 既能祛风湿，利关节，又能降压、解毒的药物是稀莩草。
1765. 泻南补北是按相克规律确定的治法。
1766. 了解消渴患者有无酮症酸中毒，需做血酮检查。
1767. 枳实薤白桂枝汤组成中含有的药物是厚朴、瓜蒌。
1768. 严重气胸会出现气管向健侧移位。
1769. 麻疹的病因病机是湿热下注，瘀血凝滞经络。
1770. 属中医学一般思维方法的是比较、演绎、类比。
1771. 根据已有的知识经验，按现成的方案和程序直接解决问题的思维是常规思维。
1772. 善于治疗肝气郁滞之痛经，人称”气病之总司，妇科之主帅”的药物是香附。
1773. 足厥阴与足少阳经是具有表里关系的经脉
1774. 大肠癌组织学分类最多见的是管状腺癌。
1775. 骨髓液吸取时，应当用力适当，不可过猛。
1776. 清热解毒药中，常用治热毒血痢便脓血的药物是金银花。
1777. 在”如酒之于人，有饮之石而不乱者，有濡吻则颠眩者”中，”颠”之义为顶。
1778. 三宝养生论中的”三宝”是指精气神
1779. 肾为气之根，主要指的是摄纳肺吸入清气的作用。
1780. 怀孕后跌扑闪挫，继之腹痛，阴道少量出血，舌暗红，脉沉弦。治疗首选方圣愈汤。
1781. 胖人或痰湿内盛者易患眩晕、中风的发病因素是体质因素
1782. 按十二经脉分布规律，太阳经行于后头
1783. 火热之邪致病，临床表现除热象显著外，往往伴有口渴喜冷饮，咽干口燥，小便短赤，大便秘结等津伤液耗的症状。此为火邪易伤津耗气的特征。
1784. 怀孕后阴道少量出血，腰酸腹痛，下坠，头晕耳鸣，夜尿多，舌淡暗，苔白，脉沉细滑尺脉弱。其治疗常用方寿胎丸
1785. 在”夫为医之法，不多语调笑，谈谑諠譁”中，”谈谑”之义为说笑。
1786. ”目眩然而不曠”中的`”意思是眨眼。
1787. 在”相对斯须，便处汤药”中，”相”之义为指代病人
1788. 辛味药物的主要作用是行气、活血
1789. 我国第一部病因病理学专著《诸病源候论》。
1790. 燥邪最容易损伤的脏器是肺。
1791. 在月经的产生中，起调节经期、经量的作用的是肝。
1792. 既能消食和胃又能发散风寒的药物是神曲。
1793. 不寐虚证大多属于阴血不足。
1794. 炭疽特征性的皮损为黑色焦痂。

1795. 小儿在新生儿期时期死亡率较高。
1796. 眼病初起，星翳点点，红赤流泪，当治以疏风清热法。
1797. 妊娠晚期，头晕头重，胸闷泛恶，突然倒仆，全身抽搐，气粗痰鸣舌红，苔黄腻，脉弦滑而数。其治法清热开窍，豁痰开窍。
1798. 在“夫圣人之德，又何以加于此乎中加”之义为超过
1799. 猩红热的好发年龄段是 2~8 岁
1800. 治吐血三要法：宜行血不宜止血，宜补肝不宜伐肝，宜降气不宜降火。出于《先醒斋医学广笔记》。