

中医外科学（648 条知识点）

1. 明清时期外科形成多种流派，较有影响的 3 本著作是《疡科心得集》、《外科全生集》、《外科正宗》
2. 《洞失奥旨》说的“气血旺而外邪不能感，气血衰而内正不能拒……”，真实质主要指外科疾病的发生与否，与气血盛衰有密切关系
3. 溃疡脉浮是正虚而邪未去
4. 透脓散是由当归、川芎、炒山甲、皂角刺、黄芪外药物组成的
5. 切开法的注意事项是血瘤、岩肿不宜切开、病人体弱应先内服调补药，然后开刀、面部疔疮，尤其是口鼻部位，应忌早期开刀、进刀时，刀头要求向上挑取，宜向下割划
6. 颜面部疔的特点是易成走黄之势
7. 乳房病最常用的内治原则是理气疏络
8. 中医的“瘰”相当于西医的甲状腺疾病
9. 浅表小面积非头面部和关节部的毛细血管瘤外敷治疗可用五妙水仙膏
10. 精癯的常见并发症是尿潴留
11. 可引起血栓性深静脉炎的发病原因是手术
12. 破伤风是属于以病因命名的
13. 内痔初发的主要症状是无痛性出血
14. 黄水疮的病因是暑湿热毒
15. 血浆药物浓度、听觉诱发电位、食管内压力、病人无体动反应均可作为监测全麻肌松下麻醉深度的客观参考指标
16. 低血钾影响神经，肌肉系统时，最突出的部位是四肢肌
17. 颜面部疔的特点是易成走黄之势
18. 内服麻醉药最早的发明者是华佗
19. 外科疾病致病因素是外感六淫邪毒、感受特殊之毒、饮食不节，情志内伤、房室损伤，外来伤害
20. 疮疡成脓时，其疼痛的表现常为肿势急胀，痛无止时，如有鸡啄，按之中软应指
21. 托法的代表方透脓散的药物组成是黄芪、当归、川芎、皂刺、山甲
22. 刀晕的处理：刀晕轻症，只要扶持病人安静平卧，室温保暖即可、头位稍低，安静卧床、给饮开水或糖水、灸百会、人中或刺合谷、少商等穴救治
23. 有头疽初起症状多见粟粒样脓头
24. 多由素体阴虚，或气血素亏，复感外邪，肝郁气滞，久郁化火，灼津成痰，痰火凝结所致的乳房疾病是乳癆
25. 羊靨含有甲状腺素
26. 脂瘤相当于西医的皮脂腺囊肿
27. 尿道在脏腑归属上如何络属小肠
28. 老年消渴患者，病史近 20 年，10 年前出现足部麻木、发凉不适，近 5 年症状加重，下肢乏力，伴有足趾疼痛，三周前洗脚后出现左足破溃，近一周足部溃疡发展迅速，伴脓性分泌物，肉色灰暗，周围组织红肿，昼夜疼痛，查舌红、苔黄腻、脉弦数，辨证用方宜选四妙勇安汤加减
29. 脱疽营养障碍期的疼痛特点是持续静止痛(夜间痛)
30. I 期内痔常见的症状是便血
31. 鼠乳的特点是发于胸背，半球状隆起，中央有脐窝，蜡样光泽

32. 麻醉前病情评估的主要目的是确定麻醉方案
33. 心肺脑复苏中，为防止脑水肿最常用的方法和措施是降温，脱水治疗
34. 用全身麻醉剂进行外科剖腹手术的首创者是华佗
35. 脾胃湿热火毒壅结可以发为疮疡、诸痛痒疮，皆属于心、体表的疮疡可以影响脏腑而发生病变、脏腑的病变也可以反映于体表均正确反映了脏腑功能与外科疾病的关系
36. 辨别疮疡阴证阳证的主要根据是患者皮肤颜色红活与否、肿胀形势高起还是下陷、局部温度灼热与否、病发于皮肉还是筋骨
37. 疮疡内托法的透托代表方剂是透脓散
38. 调制箍围药，取其清凉解毒作用的，应选用丝瓜叶汁
39. 三陷证中之虚陷证多发生于 4 候
40. 乳癆一般多发生在已婚体弱妇女
41. 癰病肿块的特点是随吞咽动作上下移动
42. 相当于西医的颈部原发性恶性肿瘤的疾病是失荣
43. 急性尿潴留应急有效的治法应是导尿
44. 股肿之湿热下注证，选方宜四妙勇安汤加减
45. 冻疮的主要发病机制是气血瘀滞
46. II 期内痔、混合痔、息肉痔、脱肛有脱垂症状
47. 疥疮的好发部位是皮肤薄嫩，皱褶处
48. 处理喉痉挛的首选措施是面罩加压吸氧
49. 循环骤停施行胸外心脏按压时正确的方法是在胸骨中下 1/3 交界处、压力要使胸骨下沉 3~4cm
50. 在我国医学史，出现专职外科医生是在周代
51. 外科疾病由多种原因引起，但主要是由于火毒、热毒
52. 外科疮疡在化脓阶段，其舌苔多为黄苔
53. 运用消托补内治法则是外科疾病外治法都应遵循消、托、补三大原则、消法是包括解表、通里、清热、祛痰、行气活血等多种方法的治疗法则、托法具有扶正和祛邪的作用、补法可用于多种各期虚衰患者
54. 疔的特点是易脓、易溃、易敛
55. 乳发的临床特征是乳房焮红漫肿，疼痛剧烈，容易腐烂
56. 治疗肉癰的主要方剂是海藻玉壶汤
57. 肾岩翻花是指发生在阴茎的恶性肿瘤
58. 精索与肝络属
59. 曲张静脉破裂出血、湿疹、溃疡、血栓性浅静脉炎是下肢静脉曲张的并发症
60. 脱疽发生的原因是感受特殊之毒
61. 以截石位为准，内痔好发于齿状线上 3、7、11 点处、赘皮性外痔发于肛缘 6、12 点处、混合痔好发于齿线上下 3、7、11 点处、肛裂好发于肛管 6、12 点处
62. 包皮边缘，龟头见散在淡红色丘疹，部分呈菜花状，局部糜烂，首先考虑诊断尖锐湿疣
63. 全脊麻后常见的症状体征包括低血压、呼吸困难、意识模糊、昏迷
64. 休克的根本问题是组织细胞受累
65. 我国现存最早的外科专著是《刘涓子鬼遗方》
66. 气血病变与外科疾病的发病机理关系密切，外科疾病发生与否，与气血盛衰关系密切、气血的盛衰与外科疾病的预后有密切关系、局部气血凝滞，是外科疾病发生的主要病机

之一、气血充足，外疡就容易生肌长肉，迅速愈合

67. 疮疡脓已成指起即复最重要
68. 外科内治法的具体治法是消肿、提脓、生肌
69. 患者，男，48岁。背部生疮，初起肿块上有一粟粒样脓头，抓破后局部肿痛加剧，色红灼热，脓头相继增多，溃后如蜂窝状，伴有寒热头痛，纳呆，便秘，溲赤，舌质红，苔黄，脉弦数。其诊断是有头疽
70. 乳房部漏，漏口有乳汁流出，多由于手术损伤乳腺管
71. 痰火郁结型瘰疬的内因是肝郁胃热
72. 脂瘤最典型的特点是表面有一黑头
73. 深静脉血栓形成的最大危险性是肺栓塞
74. 破伤风的典型症状一般先开始于头面
75. 重症药疹后期，大片膜状脱屑，伴有神疲乏力，口干咽燥，舌红脉细数，辨证应为气阴两虚证
76. 牛皮癣的病因病机多为风湿热邪，久滞血虚、生风化燥
77. 控制性降压最易发生的并发症是心律失常
78. 输血反应包括发热反应、过敏反应、溶血反应、细菌污染中毒
79. 透光试验阳性是诊断水疖的简单而有效的方法
80. 中医外科成为独立的专科是在周代
81. 春令易生疔腮、夏秋之间易生暑疖、冬令易生冻疮、夏秋之间易生暑湿流注均正确反映了六淫的发病与季节的关系
82. 望颜色、望精神、望形态、望舌苔是外科学望诊中的主要内容
83. 外治法一般可分为药物治疗、手术疗法、其他疗法
84. 患者，女，27岁。一个月前左上肢突然疼痛，检查局部光软无头，红、肿、热、痛，范围在6~9cm左右，易肿、易溃、易脓、易敛。应诊断为痈
85. 乳房病检查的最佳时间是月经后1周
86. 肉瘤日久可转化为石瘤的疾病
87. 严重的筋瘤治疗通常需采用手术
88. 男，35岁，吸烟15年，出现右下肢麻木、发凉、间歇性跛行8年。病情发展，出现持续性疼痛，夜间尤为剧烈，下肢肌肉萎缩，足背动脉搏动消失，诊断为血栓闭塞性脉管炎营养障碍期。此患者与下肢动脉硬化性闭塞患者鉴别诊断主要依据是患者发病年轻，病程长
89. 脓疮将敛之象疮面肉色转红，脓水稀少
90. 内痔的发病部位是齿线以上
91. 桑毛虫皮炎外治法应该选用先用橡皮膏粘去毒毛，再用马齿苋捣烂外敷
92. Mendelson综合征是由误吸高酸性胃液引起的
93. 正常血钾值的范围3.5~5.5mmol/L
94. 急性子痈未成脓者外治宜金黄散外敷
95. 世界上最先用葱管作导尿器械进行导尿的记载见于《千金方》
96. 特殊之毒包括蛇毒、疫畜毒、漆毒、沥青毒
97. 诊断外科疾病，首先应辨顺逆
98. 阳证肿疡初起，而肿势局限于一处者，选用红灵丹掺药最为合适
99. 患者，女，38岁。一个月前右颧旁突然红、肿、热、痛，检查肿胀部突起根浅，肿势

- 局限，范围在 3cm 左右，易脓，易溃，易敛。其诊断应是疔
100. 以初产妇为多见，好发于产后第 3~4 周与乳痈关系最密切
101. 急性发病、疼痛、局部灼热、肿胀是癰疽的特征
102. 毛细血管瘤最显著的特点是皮色鲜红
103. 血栓性深静脉炎多发生于下肢静脉
104. 褥疮初起受压部位皮肤出现暗红，渐趋暗紫，迅速变成黑色，皮肤坏死、若创面干净，肉芽组织鲜红，皮肤生长快，褥疮可望愈合、若溃疡面有绿色腥臭脓水，患者形体瘦弱，预后较差
105. 肛漏多是肛门直肠周围脓肿的后遗症
106. 先于躯干出现一甲盖大小玫瑰色斑片，表面细小鳞屑，1 周后躯干、四肢成批出现形状一致小斑片，长轴与皮纹走向一致。应首先考虑诊断为风热疮
107. 最易致低钾血症的是严重肠痿
108. 精瘕多发于老年人
109. 《诸病源候论》是我国第一部病原病理学专著。
110. 外科疾病的主要病理基础是气血凝滞，经络阻塞
111. 肿疡之证出现有余之脉，病理属毒气盛正不虚
112. 阳证肿疡外敷首选油膏是金黄膏
113. 患者，女，60 岁。左小腿焮红灼热疼痛伴高热 3 天，症见小腿皮肤鲜红一片，稍高出皮面，色如丹涂，扪之灼热，疮周色红，边界清楚，按压时红色稍退，放手后立即恢复。体温 39℃，伴胃纳不佳，大便 2 日未行。舌红，苔黄腻，脉滑数。其方剂首选五神汤
114. 乳核的临床特点是乳房中结节，形如丸卵，边界清楚，活动，表面光滑
115. 颈前部位属任脉所主
116. 痰滞、浊气所引起的肉瘤、筋瘤和气瘤，宜应用的治疗方法为化痰散结法
117. 某男，左足怕冷、疼痛、间歇性跛行年余。月余来足痛转为持续性静止痛，夜间痛剧，不能入睡，足背动脉搏动消失。应诊断为脱疽
118. 青蛇毒多见于青壮年男女均罹患
119. 内痔的主要症状是便血、便秘、脱出
120. 丘疹、水疱、隧道、抓痕、结痂和疥疮关系密切
121. 睾丸与肾络属
122. 低渗性脱水时体液容量的变化特点是细胞外液显著减少，细胞内液轻度减少
123. 《刘涓子鬼遗方》成书于南北朝
124. 疫疔由感染特殊之毒而发生
125. 风肿的特点是肿势宣浮，来急去快
126. 对升丹过敏的患者，溃疡提脓祛腐时宜选用黑虎丹
127. 痈的特点的是根脚坚硬，状如钉丁，病情变化迅速，易毒邪走散
128. 外吹乳痈是指哺乳期乳痈
129. 癰的现代涵义是专指甲状腺肿大或肿块类疾病
130. 骨瘤肿块的质地为坚硬
131. 青蛇毒的病位在筋脉
132. 内痔结扎术后第 7~9 天，嘱病人减少活动的主要目的是避免大出血
133. 头发突然成片脱落，脱落区头皮光亮，该病为油风
134. 35 岁男病人，尿频，尿道灼热，会阴部隐痛不适，前列腺液镜检白细胞增多，卵磷脂

小体减少，应诊断为精浊

135. 股肿湿热下注证选方四妙勇安汤加减
136. 等渗性脱水时体液容量的变化特点是细胞外液显著减少，细胞内液正常
137. 疮疡已溃缓脉为正常脉象
138. 患部焮红高肿，疼痛剧烈，口干饮冷，壮热烦躁，呕恶便秘，腹胀拒按，舌苔黄腻或黄糙，脉沉数有力。可用清热通里法，方用内疏黄连汤
139. 丹毒发于小腿，称为流火
140. 乳痈最多见于初产妇
141. 瘰疬相当于西医的急性甲状腺炎
142. 血管瘤相当于西医的皮肤血管瘤
143. 血瘀型脱疽的治疗原则是活血通络止痛
144. 息肉痔是直肠内黏膜上的赘生物、是常见的直肠结肠良性肿瘤、儿童多为单发性、青、壮年多为多发性
145. 热疮外用治则中最正确的是清热解毒、干燥收敛
146. 我国最早的一部临床实用百科全书是《千金要方》
147. 外科疾病发于胸腹，多由于气郁、火郁引起
148. 70 岁男病人，尿频，进行性排尿困难，尿线细，直肠指诊前列腺如鸡蛋大小，中央沟变平，应诊断为精瘰
149. 脱疽湿热毒盛证选方四妙勇安汤加减
150. 高渗性脱水时体液容量的变化特点是细胞内液显著减少，细胞外液轻度减少
151. 疮疡脉象的一般变化是未溃时见有余之脉，已溃时见不足之脉
152. 肿疡溃后脓水稀少，坚肿不消，身热乏力，面色少华，脉数无力，治宜补托法
153. 丹毒的主要病因病机是外邪侵犯，血分有热，郁于肌肤
154. 外吹乳痈瘀乳期，外治之时，应该用吸乳器(或其他方法)充分吸出乳汁
155. 肉瘻、石瘻或气瘻中药内治无效时，应手术治疗
156. 中医认为血管瘤的发生火关系最密切
157. II 度水泡性冻疮，冻疮为冻伤后症见红肿，继而出现大小不一的水疱，有不同程度的疼痛
158. 肛痈是突发性肛门肿痛、坠胀、肛门旁皮下脓肿溃后形成低位肛瘻、直肠后间隙脓肿骶尾部可有钝痛
159. 风瘙痒之湿热蕴结型宜选用龙胆泻肝汤内治。
160. 最早提出“五善七恶”的著作是《太平圣惠方》
161. 外科疾病发于胫足部，多由于湿热、寒湿引起。
162. 5 岁男患儿，出生后右侧阴囊肿大，触诊有囊性感，透光试验阳性，应诊断为水疝
163. 股肿，见突然发病，一侧肢体增粗，皮肤发红，自觉患肢胀痛，活动受限，舌红、苔黄腻，脉弦滑。辨证属湿热下注证
164. 提示血容量不足中心静脉压偏低，尿量少
165. 痰肿的特点是肿块硬如馒，有囊性感
166. 阴证肿疡外敷首选药物是阳和解凝膏
167. 无头疔的特点是皮肤上有一红色结块，范围约 3cm 左右，无脓头
168. 乳痈气滞热壅方宜选用瓜蒌牛蒡汤
169. 瘰疬的治疗方法包括清热凉血法

170. 中医外科所说的瘤大部分属于西医体表良性肿瘤
171. 血栓性深静脉炎(股肿)最大危险性为肺栓塞
172. 浅部肛周脓肿，一次切开手术，切口应是放射状
173. 属于“疣”的疾病是尖锐湿疣
174. 我国第一部论述梅毒的专著是《霉疮秘录》
175. 外科疾病发于头面者，多由于风温、风热引起。
176. 急性尿潴留治宜导尿
177. 脱疽，见肢体发凉、乏力，或伴麻木感，小腿胀痛，活动后加剧，歇后痛减，肤色苍白，肤温降低，舌淡、苔白腻，脉沉细。辨证属寒湿阻络证
178. 中心静脉压偏高，尿量多说明液体量已补充足
179. 溃疡疮面较大，腐肉未脱，肿势已消，宜用红油膏
180. 疔的肿势特点是形如粟米，坚硬如钉
181. 乳癖多发生于中青年女性
182. 可预防气瘰的食物是海带
183. 在乳岩的辅助检查中，可帮助确诊的方法是活体组织病理检查
184. 属于褥疮常见的辨证分型的是寒湿阻络型
185. 外痔的主要症状为肛门坠胀、疼痛、有异物感
186. 淋病的潜伏期多数为 2~5 天
187. 春季发生的疮疡其病因多为风邪
188. 血虚作痒的特点是脱屑作痒，皮肤干燥
189. 囊痈成脓治宜切开引流
190. 中心静脉压很高，尿量少可能有心功能不全存在
191. 箍围药根据病情，需要进行调制，欲取其散瘀解毒，可用醋调
192. 颈痈初起属风热痰毒证者内治方剂最宜选用牛蒡解肌汤
193. 乳发患病之初，外治法最宜用玉露散外敷
194. 肉瘰的最主要症状是颈部肿物
195. 骨瘤的发生主要与肾有关
196. 破伤风的潜伏期最短为 24 小时
197. 肛裂的疼痛是周期性疼痛
198. 对称性痛性结节，不易破溃与瓜藤缠关系密切
199. 夏秋季节发生的疮疡其病因多为暑湿
200. 热胜作痒的特点是皮肤瘾疹，焮热作痒
201. 子痈初起治宜金黄散冷敷
202. 男，24 岁，受伤后出现精神兴奋，烦躁不安，出冷汗，心率 100 次/分，脉压缩小，尿量减小已有休克
203. 溃疡脓出不畅，有少量袋脓者，首选垫棉法
204. 疔疮走黄的主要原因是早期失治误治、挤压碰伤、过早切开、误食辛热之品
205. 乳癖在乳房疾病中，其发病率为首位
206. 瘰病的病因病机是肝郁气滞、痰火郁结、冲任失调、气虚血瘀
207. 骨瘤最有效的治疗方法是手术
208. 血瘀型脱疽治疗的代表方是桃红四物汤
209. 对诊断肛管直肠癌有重要意义的简易检查方法是直肠指诊

210. 疥疮外用药的用药原则是杀虫止痒
211. 冬季发生的疮疡其病因多为寒邪
212. 风胜作痒的特点是走窜无定，遍体作痒，多为干性
213. 病人口渴不止，神智淡漠，反应迟钝，皮肤苍白，出冷汗，四肢凉，呼吸浅快，脉搏细速，收缩压降至 90mmHg 以下，尿少，为休克抑制期
214. 提出疮疡内治“以消为贵，以托为畏”的医家是王维德
215. 乳核是乳房组织的良性肿瘤，相当于西医的乳腺纤维腺瘤
216. 癰疽初期的外治是外敷双柏散
217. 脂瘤最有效的治法是手术
218. 脱疽多见于青壮年男性
219. 内痔发病区为肛柱
220. 淋病的致病菌为淋病双球菌
221. 脓液黄白稠厚者为气血充足
222. 躯干部皮肤突然发红成片，色如丹涂的疾病称为内发丹毒
223. 外科疾病内治三大法则是消、托、补
224. 乳晕部漏多因乳头及乳腺导管先天畸形兼染毒化脓成漏
225. 石瘰一旦确诊，早期治疗应手术治疗
226. 手术法是治疗瘤的首选方法
227. 破伤风的论述：发病者必具创伤和感受风邪两个因素、发病前常有乏力，烦躁，反射亢进、创口可干陷无脓、典型症状为肌肉强直性痉挛
228. 肛管长约 3cm
229. 热疮的病机是肺胃蕴热，外感邪毒，上蒸头面，下注二阴
230. 脓液黄浊臭秽者为气火有余
231. 手指被鱼虾之刺划破皮肤后，局部红斑.无明显全身症状的疾病称为类丹毒
232. 外科清热法的适应证：红肿热痛的阳证，如颈痛，流注、焮红灼热的外科病，如烂疔、丹毒、阴虚火旺的流痰虚热不退、热毒内传的走黄、内陷
233. 乳疔的临床特点是乳晕中央有扁圆形肿块
234. 石瘰肿块疼痛灼热时捣烂外敷的鲜草药可用商陆根
235. 肉瘤的构成组织为脂肪
236. 血栓性静脉炎是指静脉内腔的炎症，同时伴有血栓的形成
237. 肛漏的主要症状是肛门流脓、疼痛、瘙痒
238. 盘状红蝴蝶疮的好发部位面颊部
239. 脓色绿黑、稀薄者为余毒日久损伤筋骨
240. 乳疔是发生于男女性儿童或中老年男性的乳房异常发育性疾病。
241. 海带、海藻、昆布、海蛤壳是治疗瘰病的含碘类药
242. 恶性骨瘤的确诊依据是 X 线
243. 瘰疮换药时，疮面有腐肉用红油膏，九一丹
244. I 度脱肛需要鉴别的疾病是 II 期内痔
245. 黄水疮最易发生于夏秋季节
246. 疮疡患者，精神爽快，言语清亮，寢寐安宁，证属心善
247. 取其散瘀解毒外用药粉以米醋调之
248. 乳腺导管内乳头状瘤属良性肿瘤，可能癌变

249. 痰瘀内结型石瘰内治宜用海藻玉壶汤加減
250. 气瘤长在何处最为多见躯干
251. 脱疽的临床特点是四肢末端、下肢多见、趾节怕冷、苍白麻木
252. I 期内痔的主要症状是便血
253. 尖锐湿疣，中医又称为瘰癧
254. 疮疡患者，身体轻快，不怒不惊，二便通利，指甲红润，证属肝善
255. 取其清热解毒外用粉以菊花汁调之
256. 乳发好发于卫生条件较差的哺乳期妇女
257. 瘰的发病部位是颈前结喉两侧
258. 肉瘤相当于西医的脂肪瘤
259. 瘤自筋肿起，青筋垒垒，盘成团，如蚯蚓聚结，表面呈青兰色，质地柔软，应属筋瘤
260. 血栓性外痔内服方宜选凉血地黄汤
261. 麻风由麻风杆菌引起
262. 疮疡患者，声音洪亮，不喘不咳，呼吸均匀，皮肤润滑，证属肝善
263. 取其缓和刺激外用粉以鸡蛋清调之
264. 乳病的临床表现是乳房肥大、乳晕中央有扁圆形肿块，有轻压痛或胀痛、单侧或双侧发生、个别可伴有其他女性特征
265. 瘰癧局部疼痛明显，伴恶寒发热、头痛口干、脉浮数，其证属风热痰凝
266. 脾虚痰凝型气瘤宜采用十全流气饮加減进行治疗
267. 受冻后，宜搽冻疮膏、用红灵酒按摩患处、立即脱离寒冷环境
268. 静脉曲张性外痔多为圆形
269. 热疮易发生于好发于皮肤黏膜交界处。
270. 疮面呈翻花如岩穴，溃疡底部有珍珠状结节，为岩性溃疡
271. 收口期常用的掺药是生肌散
272. 乳痛的成因是产后饮食不节，阳明蕴热、产后乳头破碎、情志内伤，肝气郁结、乳汁淤积
273. 气瘰压迫喉返神经可出现声带麻痹
274. 蒂小的气瘤外治方法可采用丝线结扎
275. 廉疮气虚血瘀证的代表方是补阳还五汤合桃红四物汤
276. 早期肛裂可用生肌玉红膏蘸生肌散涂于裂口，每天 2 次
277. 鹅掌风属于真菌病
278. 溃疡呈穿凿形，常可深及骨部，为麻风溃疡
279. 收口期常用的油膏是生肌白玉膏
280. 检查乳房部位的方法是端坐，暴露乳房，观察其形态、以四指平按轻柔触摸有肿块否、按摸乳晕，观看有无乳头溢液、按摸腋窝，锁骨下、上区有无肿大淋巴结
281. 久居水质缺碘地区的瘰病患者，中医认为其病因大多是山瘵邪气
282. 肝郁痰凝型肉瘤宜用十全流气饮加減治疗
283. 血栓性深静脉炎(股肿)多见于下肢静脉
284. 肛门直肠疾病病位用时钟 12 等分记载的体位是截石位
285. 白疮的特点是搔起层层脱屑、刮去皮屑见薄膜现象和点状出血、发于头皮时头发呈束状、进行期易出现同形反应
286. 疮口呈有空腔或伴瘰管，脓水清稀，杂有败絮状物，为瘰癧之溃疡

287. 疮疡内治，清热解毒之常用方是五味消毒饮
288. 乳腺导管内乳头状瘤的临床特点是乳头溢血
289. 癰疽早期应用方剂是牛蒡解肌汤
290. 脂瘤合并感染后称为脓瘤
291. 青蛇毒相当于西医的血栓性浅静脉炎、病机为气血瘀滞，脉络滞塞不通所致、不一定都有静脉注射史
292. 肛裂的主要症状是便秘、便血、疼痛
293. 皮肤瘙痒症中医又称为风瘙痒
294. 身体强直，目难正视，疮流血水，惊悸时作，是肝恶
295. 疮疡内治，清气分热之常用方是黄连解毒汤
296. 乳管内乳头状瘤中医称之为乳衄
297. 在肉癭的鉴别诊断中，肿物随吞咽移动是肉癭的特征
298. 脂瘤的内容物是皮脂
299. 破伤风的内治法则是祛风镇痉
300. 锁肛痔最常见和最早出现的两个症状是便血和排便习惯改变
301. 螨虫皮炎的特点是粟米至黄豆大小丘疱疹或紫红色肿块、风团，常见抓痕、血痂
302. 身体浮肿，呕吐呃逆，肠鸣泄泻，口糜满布，是脏腑衰败
303. 疮疡内治，清血分热之常用方是犀角地黄汤
304. 乳癆成脓一般在数月以后
305. 癰块肿胀疼痛，伴发热者多属痰火郁结
306. 注射治疗血管瘤使用的中药是消痔灵
307. 破伤风最先出现的症状是张口困难
308. 混合痔的临床特点是内痔与外痔融为一个整体
309. 油风临床分型是血热风燥、肝肾不足、气血两虚、气滞血瘀
310. 疮陷色暗，时流污水，汗出肢冷，嗜卧语低，是气血衰竭
311. 切开法常用于脓肿已成者
312. 乳癖是乳腺组织良性增生性疾病。
313. 理气解郁法治疗癰病的代表方是逍遥散
314. 瘤的发生原因是脏腑功能失调
315. 青蛇毒的典型症状是呈索条状红肿、灼热、压痛
316. 肛痈的发生多与肛门腺感染化脓有关。
317. 白疕的典型皮损特点是银白色鳞屑堆积，刮除后见薄膜现象和筛状出血点现象
318. 在检查胸腹部疮疡患者时，如听到儿啼声或气泡破碎音，则可能为透脓
319. 结扎法常用于痔
320. 郁乳期乳癰内治的方法和方剂是疏肝清胃，通乳散结，瓜蒌牛蒡汤
321. 气癰漫肿伴肢冷腰酸，月经稀少错后，面色无华者多属冲任失调
322. 脂瘤的主要病机是痰气凝结
323. 多形性红斑发病急骤、多形性红斑皮损多形性、多形性红斑可累及口腔黏膜、冻伤不见于黏膜
324. 肛门直肠周围脓肿破溃后多形成肛漏
325. 疔目之风热血燥型宜选用治瘰方治疗
326. 肛门直肠周围痛疽溃脓臭秽，则可能为透脓

327. 挂线法常用于瘰管
328. 乳痈形成的主要原因是肝气郁结，胃热壅滞
329. 瘰癧起病前多有上呼吸道炎症
330. 中医肉瘤的性质是良性肿瘤
331. 青蛇毒是以形态命名的
332. 肛漏手术成败的关键在于正确找到内口并切开或切除
333. 多形红斑中医又称为猫眼疮
334. 小腿腐烂坏死，有浅棕色混浊稀薄脓液，并有恶臭气味，则可能是烂疗
335. 乳房部位的脓肿应放射形切开
336. 乳痈切开排脓的切口应该是放射状切口
337. 气瘰的内治法主方为四海舒郁丸
338. 瘤的诊断主要依据为局部主证
339. 冻疮是以什么命名的病因
340. 肛管直肠癌的早期症状除便血外，还可见排便习惯改变
341. 患淋病的孕妇经产道分娩后，新生儿易患淋菌性结膜炎
342. 火肿的特点是肿而色红，皮薄光泽
343. 面部的脓肿应沿皮肤的自然纹理切开
344. 乳癆又名乳痰
345. 气瘰的特点是随喜怒而消长
346. 茧唇的发病常与长期吸烟，尤其是使用烟斗或烟嘴有关
347. 褥疮气滞血瘀证的内治法则是益气活血祛瘀
348. 头癣好发于儿童，常见的有白秃疮、肥疮
349. 寒肿的特点是肿而木硬，色紫暗青
350. 关节区脓肿应横形切开
351. 直肠癌排便习惯改变是常见的早期症状、便血常被误诊为“痔疮”、大便变细、变扁、早期进行根治手术
352. 乳痈成脓切开后，引起乳漏的主要原因是手术损伤了乳腺导管
353. 气瘰在青春期内不宜手术治疗
354. 气瘤的治疗以中药内治为佳
355. 患者主要表现为左下肢疼痛、肿胀、皮肤温度升高，色略发绀，大腿内侧股管处有明显压痛，肢冷，麻木，增粗，舌质淡，苔薄白，应诊断为股肿(血栓性深静脉炎)
356. 系统性红蝴蝶疮的特点是多见于中青年女性、累及多系统、多脏器损、多伴不规则发热、关节痛、晚期可引起精神、神经症状
357. 风肿的特点是肿势宣浮，不热或微热
358. 肿疡初起，肿势局限者可用消散药
359. 男，28岁，肛门周围突然肿痛3日，持续加剧，伴恶寒，发热，便秘，小便赤。肛周红肿，触痛明显，质硬，表面焮热。舌红，苔薄黄，脉数。此病的病机为火毒蕴结
360. 某女，24岁，产后乳房局部肿胀疼痛，皮肤微红，有结块，局部压痛，恶寒发热。应首先诊断为乳痈
361. 引起气瘰的主要因素是情志内伤
362. 瘤的特点为随处可生、生长缓慢、单个或多发、不易消散
363. 间歇性跛行常见于脱疽

364. 粉刺患者，面部皮疹色红，有痒痛，舌红，苔薄黄，脉浮数。内治多选用枇杷清肺饮
365. 溃疡初起，脓栓未落，腐肉未脱，可选用提脓祛腐药
366. 男，28岁，肛门周围突然肿痛3日，持续加剧，伴恶寒，发热，便秘，小便赤。肛周红肿，触痛明显，质硬，表面焮热。舌红，苔薄黄，脉数。此病的最佳治法为清热解毒
367. 乳痈初起的临床症状有乳房胀痛，恶寒发热
368. 肉瘤相当于西医的甲状腺腺瘤
369. 筋瘤是指体表静脉形成团块
370. 破伤风的潜伏期一般为10天左右
371. 妇女产后头发脱落，毛发稀疏枯槁，伴唇白，心悸，倦怠乏力。舌淡，脉细弱。治疗应选用八珍汤
372. 溃疡疮口太小，腐肉不脱或赘肉突出者可选用腐蚀药与平胬药
373. 男，28岁，肛门周围突然肿痛3日，持续加剧，伴恶寒，发热，便秘，小便赤。肛周红肿，触痛明显，质硬，表面焮热。舌红，苔薄黄，脉数。选用最佳方药为仙方活命饮或黄连解毒汤
374. 乳癖肿块常可分为片块型、结节型、混合型、弥漫型
375. 石瘰相当于西医的甲状腺癌
376. 骨瘤的中医治疗以滋补肾气为本
377. 玉真散的功用是熄风镇痉
378. 酒皴鼻鼻赘期治则是活血化瘀散结
379. 金黄散是箍围药
380. 男性，35岁，肛周经常流脓液，脓质稠厚，肛门胀痛，局部灼热。肛周有一米粒大的溃口，位于截石位2°处，距肛缘约2.5cm，按之有一索状物通向肛内。舌红，苔黄，脉滑。此患者诊断为肛漏
381. 社会经济地位高、学历高、月经初潮早、低产、初次怀孕年龄大，绝经迟易患乳癖
382. 巨大气瘰压迫气管时的主要症状是呼吸困难
383. 脂瘤又称为粉瘤
384. 冻疮早期复温是脱去潮湿的衣着、给预热饮料、隔着软布时揉搓冻伤处、温水浸洗伤处
385. 酒皴鼻的初期表现为时隐时现的弥漫性红斑，见毛细血管扩张
386. 五五丹是提脓祛腐药
387. 男性，35岁，肛周经常流脓液，脓质稠厚，肛门胀痛，局部灼热。肛周有一米粒大的溃口，位于截石位2°处，距肛缘约2.5cm，按之有一索状物通向肛内。舌红，苔黄，脉滑。此病的最佳治法为养阴清热
388. 一般乳发腐烂成脓的时间为2~3天后
389. 瘰疬的性质是炎症性
390. 海绵状血管瘤是一种血管错构瘤
391. 脱疽(血栓闭塞性脉管炎)：患肢沉重、麻木、痠痛，小腿抽痛，间歇性跛行，趺阳脉搏动减弱或消失，局部皮肤苍白，触之冰凉，严重者趾(指)节脱落
392. 婴儿湿疮的辨证调护：忌用水洗涤、乳母忌食辛辣刺激发物、不宜穿羊毛衣，避免强日光照射、睡眠时用纱布或袜子护手以防搔抓
393. 红灵丹是消散药
394. 男性，35岁，肛周经常流脓液，脓质稠厚，肛门胀痛，局部灼热。肛周有一米粒大的溃口，位于截石位2°处，距肛缘约2.5cm，按之有一索状物通向肛内。舌红，苔黄，

脉滑。此病的最佳方药是二妙丸合萆薢渗湿汤

395. 中年妇女乳房肿块界限不清，经前乳房胀痛，应首先考虑乳癖
396. 肉瘤属于甲状腺的良性肿瘤
397. 筋瘤相当于西医的体表静脉曲张
398. 破伤风的典型症状是肌肉强直性痉挛
399. 疣又名鼠乳、枯筋瘕
400. 女，48岁，肛门肿物2年，便时肿物增大变硬，便后可缩小变软，今日因腹泻多次，现肿物不能缩小，坠胀灼痛，现肛缘见椭圆形肿物，色紫，按之较硬，按摩后可稍缩小，舌红，苔黄腻，脉滑数。本病应诊断为静脉曲张性外痔
401. 乳发的形成，主要原因是火毒外侵，肝胃二经湿热蕴结乳房
402. 气瘰的早期症状是甲状腺肿大
403. 瘤的定义是赘生物
404. 裙边疮、裤口毒、老烂脚、小腿下部内外侧的慢性溃疡与臁疮有关
405. 瓜藤缠患者，皮损暗红，反复缠绵不愈。伴关节痛，遇寒加重，肢冷，口不渴。舌淡，苔白，脉迟。证属寒湿入络
406. 女，48岁，肛门肿物2年，便时肿物增大变硬，便后可缩小变软，今日因腹泻多次，现肿物不能缩小，坠胀灼痛，现肛缘见椭圆形肿物，色紫，按之较硬，按摩后可稍缩小，舌红，苔黄腻，脉滑数。可选择最合适的内治法则是清热利湿，活血散瘀
407. 乳房部疾病症见经前乳房胀痛者有乳癖
408. 肉瘤的特点是漫肿质软
409. 阴盛阳衰、血虚寒凝、气血两虚属于冻疮辨证证型
410. 隐翅虫皮炎的特点是条索状虫爬痕迹，上有水疱、脓疱，自觉灼痛
411. 45岁女性患者，在舌的右侧边缘出现一菌状肿物，并在颈部出现肿块，坚硬疼痛，此状为舌菌
412. 肛隐窝炎是肛周化脓性疾病的重要诱因。
413. 乳痈初起治则拟用疏肝清胃法
414. 冻伤病因病理：素体虚弱、外受寒邪、经络阻塞、气血凝滞
415. 同形反应一般出现于白疮的进行期
416. 引起气瘰的内因主要是情志不畅
417. 55岁男性患者，半年前在下唇出现乳头状突起之肿物，以后溃烂翻花如杨梅，此状为茧唇
418. 男，36岁，大便时滴血，色鲜红。肛门视诊截石位9°有一小指头大小的息肉，息肉表面充血明显，脱出肛外，触之柔软，舌红，苔薄白，脉浮数。此病的症型为风伤肠络
419. 颈痈、锁喉痈、脐痈、臀痈均由风热夹痰或湿热蕴阻所致
420. 蛇串疮若水疱不破，应用三棱针或消毒针头挑破，使疱液流出，以减轻疼痛
421. 妊娠及产后易患气瘰的主要原因是肾气亏虚
422. 某男，28岁，足球运动员，常在运动后冷水浴，现感下肢坠胀酸重，小腿出现青紫色筋块，喜暖畏寒，伴形寒肢冷，口淡不渴，小便清长，舌淡暗、苔白腻，脉弦细。其证属寒湿凝筋
423. 冻僵患者进行快速复温时，是把病人浸在温水中，其水温度是38~42℃
424. 男，36岁，大便时滴血，色鲜红。肛门视诊截石位9°有一小指头大小的息肉，息肉表面充血明显，脱出肛外，触之柔软，舌红，苔薄白，脉浮数。此病的最佳治法为清热

凉血，祛风止血

425. 乳腺导管内乳头状瘤多发生于近绝经期妇女
426. 风疹块的好发部位是任何部位
427. 引起气瘰的外因是饮食缺碘
428. 某男，56岁，搬运工，双下肢肿物如蚯蚓状30多年，其皮色淡暗、皮温不高，久站或劳累后瘤体增大，下坠不适感加重，伴气短乏力，腕腹胀坠，腰酸，舌体胖，舌淡，苔薄白，脉细缓无力。证属劳倦伤气
429. 女，75岁，下肢瘫痪若干年，骶尾部，髌部出现溃烂3年，现创面淡白色，分泌物稀薄，秽浊，伴面色㿠白，神疲乏力，纳差食少，舌淡，苔少，脉沉细无力。此时辨证当属褥疮的气血两虚
430. 男，36岁，大便时滴血，色鲜红。肛门视诊截石位9°有一小指头大小的息肉，息肉表面充血明显，脱出肛外，触之柔软，舌红，苔薄白，脉浮数。此病的最佳方药为槐角丸加减
431. 最易继发感染的手足癣为糜烂型
432. 乳核的高发年龄阶段是20~25岁
433. 颈部肿块坚硬如石，凹凸不平，不能随吞咽上下移动的是石瘰
434. 某女，22岁，小腿出现青筋团块数年，灼热，伴五心烦热，口干、舌红、苔黄、脉细数。其证属火旺血燥
435. 女，75岁，下肢瘫痪若干年，骶尾部，髌部出现溃烂3年，现创面淡白色，分泌物稀薄，秽浊，伴面色㿠白，神疲乏力，纳差食少，舌淡，苔少，脉沉细无力。此证可选择的最佳治法补气养血，托毒生肌
436. 男，36岁，大便时滴血，色鲜红。肛门视诊截石位9°有一小指头大小的息肉，息肉表面充血明显，脱出肛外，触之柔软，舌红，苔薄白，脉浮数。对有便血、排便习惯改变的病人，首先进行简便而又十分重要的检查是直肠指诊
437. 面游风之肺胃热盛型宜选用枇杷清肺饮
438. 某女，20岁，左乳发现2枚肿块已半年，无痛。肿块呈卵圆形，表面光滑，活动，边界清楚，质地坚实。伴情绪抑郁，喜叹息，舌淡，脉弦，苔薄白。首先考虑的诊断是乳核
439. 久治不愈或突然变硬，生长迅速，可转化为石瘰的瘰病为肉瘰
440. 25岁妇女，5年前右侧乳房出现圆形肿块，表面坚实光滑，边界清楚，活动度好，病程发展缓慢，诊断为乳核
441. 女，因感冒发热行静脉注射抗生素(青霉素)等后，出现左前臂内侧部约20cm长条状发红区，肿痛，灼热，可扪及索条状物及压痛，上肢活动不利，无发热，舌红，苔黄，脉数。此时辨证应属血热瘀结
442. 男，56岁，肛门坠胀，便次增多，大便带血，色泽暗红，夹有黏液。肛门指诊截石位5°处，距肛缘6cm触及一硬结肿块，推之不移，指套上有脓血。舌红，苔黄腻，脉滑数。此患者的证型为湿热蕴结
443. 瓜藤缠结节较大，色暗红，可外用金黄散调水外敷
444. 某女，20岁，左乳发现2枚肿块已半年，无痛。肿块呈卵圆形，表面光滑，活动，边界清楚，质地坚实。伴情绪抑郁，喜叹息，舌淡，脉弦，苔薄白。其临床辨证分型为肝气郁结
445. 甲状腺的恶性肿瘤称为石瘰

446. 58 岁妇女，1 年前右侧乳房出现肿块，质地坚硬，活动度差，局部皮肤呈“橘皮样”改变，诊断为乳岩
447. 女，因感冒发热行静脉注射抗生素(青霉素)等后，出现左前臂内侧部约 20cm 长条状发红区，肿痛，灼热，可扪及索条状物及压痛，上肢活动不利，无发热，舌红，苔黄，脉数。最恰当的代表方五味消毒饮合三妙丸
448. 男，56 岁，肛门坠胀，便次增多，大便带血，色泽暗红，夹有黏液。肛门指诊截石位 5° 处，距肛缘 6cm 触及一硬结肿块，推之不移，指套上有脓血。舌红，苔黄腻，脉滑数。如用内服药，最佳方剂为槐角地榆丸
449. 引起梅毒的病因是感染梅毒螺旋体
450. 450、某女，20 岁，左乳发现 2 枚肿块已半年，无痛。肿块呈卵圆形，表面光滑，活动，边界清楚，质地坚实。伴情绪抑郁，喜叹息，舌淡，脉弦，苔薄白。其内服方为逍遥散
451. 伴有甲状腺功能紊乱的瘰疬的病因病机是冲任失调
452. 35 岁妇女，近 2 年来月经期出现两侧乳房胀痛，并有大小不等的结节状肿块，边界不清，质地柔韧，诊断为乳癖
453. 患者男性，右足发凉、怕冷、麻木、沉重 1 月余，伴有间歇性跛行，趺阳脉搏动减弱，舌淡，苔白腻，脉沉细。此时辨证应为寒湿阻络
454. 女性，61 岁，大便时肛内肿物脱出，不能自行回纳，需用手送回，伴肛门坠胀，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉弱。肛门视诊见直肠黏膜脱出，呈圆锥状，淡红色，长约 6cm。此患者脱肛为脾虚气陷型。
455. 白疔慢性肥厚性皮损外用宜选软膏
456. 某女，35 岁，乳晕部肿痛溃脓反复发作数月，疮口久不收口，伴乳头凹陷，乳窍有豆渣样分泌物，伴乏力纳差，舌淡、苔薄、脉细。其诊断为乳晕部瘰
457. 肝郁胃热加上风温、风火客于肺所引起的瘰疬证型属于痰火郁结
458. 发展缓慢，多无症状，甚至停止增长的骨瘤属于良性骨肿瘤
459. 患者男性，右足发凉、怕冷、麻木、沉重 1 月余，伴有间歇性跛行，趺阳脉搏动减弱，舌淡，苔白腻，脉沉细。此时最恰当的代表方为黄芪桂枝五物汤
460. 女性，61 岁，大便时肛内肿物脱出，不能自行回纳，需用手送回，伴肛门坠胀，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉弱。肛门视诊见直肠黏膜脱出，呈圆锥状，淡红色，长约 6cm。此病的最佳治法为清热利湿
461. 面游风的特点是多由风热或湿热引起、瘙痒不适、好发于头面部、病程缓慢，常有急性发作
462. 某女，35 岁，乳晕部肿痛溃脓反复发作数月，疮口久不收口，伴乳头凹陷，乳窍有豆渣样分泌物，伴乏力纳差，舌淡、苔薄、脉细。其证型为气血二亏
463. 肝郁气滞、气虚血瘀、冲任失调、痰火郁结是瘰疬的病因病机
464. 骨组织的良性肿瘤和恶性肿瘤统属于中医骨瘤的范畴
465. 患者男，50 岁，胃大部切除术后，整个下肢肿胀疼痛，皮色苍白或紫绀，扪之灼热，腿膝部疼痛固定不移，发热，舌黯或有瘀斑，脉数。此时应诊断为股肿的气滞血瘀
466. 女性，61 岁，大便时肛内肿物脱出，不能自行回纳，需用手送回，伴肛门坠胀，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉弱。肛门视诊见直肠黏膜脱出，呈圆锥状，淡红色，长约 6cm。此病的最佳方药为补中益气汤
467. 蛇串疮之肝经郁热证宜选用龙胆泻肝汤加减

468. 某女，35岁，乳晕部肿痛溃脓反复发作数月，疮口久不收口，伴乳头凹陷，乳窍有豆渣样分泌物，伴乏力纳差，舌淡、苔薄、脉细。其内服方用十全大补汤合托里消毒饮
469. 癰疽的特点是恶寒发热、局部疼痛、局部压迫症状、甲状腺肿大
470. X线见肿瘤边界不清、骨质破坏，骨结构紊乱的骨瘤多属于恶性骨肿瘤
471. 患者男，50岁，胃大部切除术后，整个下肢肿胀疼痛，皮色苍白或紫绀，扪之灼热，腿膝部疼痛固定不移，发热，舌黯或有瘀斑，脉数。本病最佳代表方是通络活血方合抵当汤加减
472. 女性，61岁，大便时肛内肿物脱出，不能自行回纳，需用手送回，伴肛门坠胀，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉弱。肛门视诊见直肠黏膜脱出，呈圆锥状，淡红色，长约6cm。脱肛注射疗法应用6%~8%明矾溶液
473. 《外台秘要》中说“石硫磺，无多少，研粉，以麻油或苦酒涂摩之”。此法指用于治疗疥疮
474. 某女，35岁，乳晕部肿痛溃脓反复发作数月，疮口久不收口，伴乳头凹陷，乳窍有豆渣样分泌物，伴乏力纳差，舌淡、苔薄、脉细。其外治法切开法
475. 癰疽与其他癰疽最有鉴别诊断意义的局部表现是局部疼痛
476. 未染毒的脂瘤首选的治疗方法是手术摘除
477. 男，40岁，左足趾肿痛，呈持续性静止痛，夜间尤甚，患趾暗红，足背汗毛脱落，趾甲变厚，趺阳脉消失，舌淡红，苔薄白，脉沉细而涩。此时辨证应属血脉瘀阻
478. 男，30岁，1天前因便秘用力努责后，突然出现肛缘生一肿物，疼痛剧，坐、行不便，局部可见一圆球形肿物，质硬，色紫黯，伴便秘、口渴、烦热，舌紫，苔淡黄，脉弦涩。本病应诊断为血栓性外痔
479. 风热疮患者内治多选用凉血消风散
480. 左乳红、肿、热、痛、硬，伴憎寒壮热，口干欲饮，小便短赤，大便秘结，脉滑数，苔薄黄而干。其诊断是乳痈
481. 癰疽的全身表现为恶寒发热
482. 已染毒但未酿脓的脂瘤治疗最好采用的方法是中药外敷
483. 男，40岁，左足趾肿痛，呈持续性静止痛，夜间尤甚，患趾暗红，足背汗毛脱落，趾甲变厚，趺阳脉消失，舌淡红，苔薄白，脉沉细而涩。此时最恰当的治则是活血化瘀，通络止痛
484. 男，30岁，1天前因便秘用力努责后，突然出现肛缘生一肿物，疼痛剧，坐、行不便，局部可见一圆球形肿物，质硬，色紫黯，伴便秘、口渴、烦热，舌紫，苔淡黄，脉弦涩。本病应辨证为血热瘀阻
485. 婴儿湿疮有明显糜烂、渗出时，外用药应选用溶液
486. 左乳红、肿、热、痛、硬，伴憎寒壮热，口干欲饮，小便短赤，大便秘结，脉滑数，苔薄黄而干。其病机是肝胃不和，胃热壅滞
487. 肉癰突然增大，伴有局部疼痛者，可能发生了腺瘤囊内出血
488. 已成脓的脂瘤应切开排脓
489. 男68岁，中风后遗症患者，骶尾部皮肤出现褐色红斑，继而紫暗红肿，或有破损。苔薄，舌边有瘀紫，脉弦。此时辨证应当为气滞血瘀证
490. 男，46岁，肛门刺痛明显，便时便后尤甚，持续约2小时。肛门紧缩，截石位6°裂口色紫暗，舌紫黯，脉涩。此病的最佳治法是理气活血，润肠通便
491. 黄水疮痂皮多者，可选用5%硫磺软膏或红油膏掺九一丹外敷

492. 左乳红、肿、热、痛、硬，伴憎寒壮热，口干欲饮，小便短赤，大便秘结，脉滑数，苔薄黄而干。其内治方剂宜用瓜蒌牛蒡汤
493. 肉癭肿物逐渐变硬，坚硬如石，凹凸不平，不能移动，有可能出现癌变
494. “软而不坚，皮色如常，随喜怒消长，无寒无热者。”属于气瘤
495. 男 68 岁，中风后遗症患者，骶尾部皮肤出现褐色红斑，继而紫暗红肿，或有破损。苔薄，舌边有瘀紫，脉弦。该证选择最恰当的代表方是血府逐瘀汤
496. 男，46 岁，肛门刺痛明显，便时便后尤甚，持续约 2 小时。肛门紧缩，截石位 6° 裂口色紫暗，舌紫黯，脉涩。本病的最佳方是六磨汤加減
497. 蛇串疮皮疹消退后局部疼痛不止，舌质黯、苔白，脉弦细，证属气滞血瘀
498. 某女，乳房有结块已数月，近来结块处皮色转微红，隐隐作痛，肿块变软，按之应指，伴潮热颧红，盗汗乏力，食少消瘦、舌红、苔黄、脉细数。其诊断为乳癆
499. 肉癭伴急躁，胸闷易汗，心悸，震颤，有可能是合并甲亢
500. “坚硬紫色，累累青筋，盘曲若蚯蚓状者。”属于筋瘤
501. 男 68 岁，中风后遗症患者，骶尾部皮肤出现褐色红斑，继而紫暗红肿，或有破损。苔薄，舌边有瘀紫，脉弦。此时最恰当的外治方法外擦红灵酒或 4% 红花酊
502. 内痔的好发部位是截石位 3、7、11 点
503. 蛇串疮的特征是皮损为簇状水疱，呈带状分布
504. 某女，乳房有结块已数月，近来结块处皮色转微红，隐隐作痛，肿块变软，按之应指，伴潮热颧红，盗汗乏力，食少消瘦、舌红、苔黄、脉细数。其治则为养阴清热化痰
505. “或软如绵，或硬如馒，不紧不宽，始终只似覆肝。”属于肉瘤
506. 血栓性深静脉炎病变在小腿深静脉可见腓肠肌疼痛，肿胀，压痛
507. 血栓外痔的好发部位是截石位 3、9 点
508. 梅毒，中医又称为杨梅疮
509. 某女，乳房有结块已数月，近来结块处皮色转微红，隐隐作痛，肿块变软，按之应指，伴潮热颧红，盗汗乏力，食少消瘦、舌红、苔黄、脉细数。其选用的方剂为六味地黄汤合清骨散
510. 多发性肉瘤者首选的治疗方法是中药内服
511. 血栓性深静脉炎病变在髂股静脉可见发热、脉快、整个下肢疼痛，水肿，大腿内侧、股管处有压痛
512. 肛漏只有外口而无内口者称为外盲漏
513. 四肢伸侧钱币状斑片，上覆较厚白色鳞屑刮去后见薄膜现象和点状出血，诊断为白疟
514. 某女，乳房有结块已数月，近来结块处皮色转微红，隐隐作痛，肿块变软，按之应指，伴潮热颧红，盗汗乏力，食少消瘦、舌红、苔黄、脉细数。其外治法是切开排脓
515. 体积很小的无症状单发肉瘤多应不予处理
516. 血栓性深静脉炎血栓脱落，产生肺栓塞时见胸痛，呼吸困难，紫绀、咳嗽、咯血，甚至休克
517. 肛漏只有内口而无外口者称为内盲漏
518. 梅毒于 16 世纪初叶传入我国
519. 某男，55 岁，乳晕中央一扁圆形肿块，质中，轻度压痛。伴腰腿酸软，易疲劳，气短纳差。舌淡，苔白，脉沉弱。其诊断为乳病
520. 肉瘤体积较大者最宜采用的治疗方法为手术切除
521. 阳和汤用于脱疽的寒湿阻络

522. 静脉曲张性外痔的好发部位是截石位 3、7、11 点
523. 干性白屑风可选用颠倒散洗剂
524. 某男，55 岁，乳晕中央一扁圆形肿块，质中，轻度压痛。伴腰腿酸软，易疲劳，气短纳差。舌淡，苔白，脉沉弱。其临床辨证分型为肾阳虚
525. 某男，55 岁，乳晕中央一扁圆形肿块，质中，轻度压痛。伴腰腿酸软，易疲劳，气短纳差。舌淡，苔白，脉沉弱。其临床辨证分型为肾阳虚
526. 桃红四物汤用于脱疽的血脉瘀阻
527. 肛裂的好发部位是截石位 6、12 点
528. 淋病的临床特征有尿道口溢脓，涂片镜检可见革兰氏阴性双球菌
529. 某男，55 岁，乳晕中央一扁圆形肿块，质中，轻度压痛。伴腰腿酸软，易疲劳，气短纳差。舌淡，苔白，脉沉弱。其内服方为右归丸
530. 四妙勇安汤用于脱疽的湿热毒盛证
531. 内痔、肛裂、息肉痔、锁肛痔的共有症状是便血
532. 湿疮辨证调护：忌用热水烫洗、避免肥皂等刺激、避免搔抓、发作期间暂缓预防注射和接种牛痘、忌食辛辣刺激荤腥物品
533. 某男，55 岁，乳晕中央一扁圆形肿块，质中，轻度压痛。伴腰腿酸软，易疲劳，气短纳差。舌淡，苔白，脉沉弱。其外治法为阳和解凝膏掺黑退消外敷
534. 顾步汤用于脱疽的热毒伤阴
535. 内痔、息肉痔、直肠脱垂的共有症状是脱垂
536. 白疔的分型为寻常型、关节型、红皮病型、脓疱型
537. 某女，50 岁，单侧乳头间歇性溢血，色鲜红，溢血之异管口部位恒定，有时乳晕下可扪及质软之肿块，约 0.5cm 大小，有时扪不到。伴情绪急躁，夜寐不宁，胸胁胀痛，舌红，苔薄黄，脉弦数。其诊断为乳腺导管内乳头状瘤
538. 冻疮阴盛阳衰的内治法则是回阳救逆，温通血脉
539. 肛管癌多为鳞状细胞癌
540. 牛皮癣的皮疹特点是圆形或多角形的扁平丘疹，融合成片，易苔藓化
541. 某女，50 岁，单侧乳头间歇性溢血，色鲜红，溢血之异管口部位恒定，有时乳晕下可扪及质软之肿块，约 0.5cm 大小，有时扪不到。伴情绪急躁，夜寐不宁，胸胁胀痛，舌红，苔薄黄，脉弦数。其病机为肝郁火旺
542. 冻疮血虚寒凝证的内治法则是补养气血，温通血脉
543. 直肠癌多为腺癌
544. 药毒皮损泛发，红斑、水疱、糜烂渗液、表皮剥脱，伴痒剧，烦躁。舌红，苔黄，脉数，治宜清热利湿解毒
545. 某女，50 岁，单侧乳头间歇性溢血，色鲜红，溢血之异管口部位恒定，有时乳晕下可扪及质软之肿块，约 0.5cm 大小，有时扪不到。伴情绪急躁，夜寐不宁，胸胁胀痛，舌红，苔薄黄，脉弦数。其治则为疏肝解郁，凉血止血
546. 冻疮瘀滞化热证的内治法则是清热解毒，活血止痛
547. 贯穿结扎法多用于治疗纤维型内痔
548. 某女，50 岁，单侧乳头间歇性溢血，色鲜红，溢血之异管口部位恒定，有时乳晕下可扪及质软之肿块，约 0.5cm 大小，有时扪不到。伴情绪急躁，夜寐不宁，胸胁胀痛，舌红，苔薄黄，脉弦数。其最适宜的内服方为逍遥蒺藜散
549. 扩肛法多用于治疗早期肛裂

550. 老年人出现皮肤瘙痒，病程长，舌红苔薄，脉细数，其病机为血虚肝旺
551. 某患者乳房焮红漫肿极甚，疼痛难忍，毛孔深陷，恶寒发热，三天后皮肤湿烂，变为焦黑腐烂的溃面。舌红，苔黄燥，脉数。其诊断为乳发
552. 一次切开挂线法多用于治疗骨盆直肠间隙脓肿
553. 疥疮瘙痒的特点是夜间痒剧，遇热加重
554. 某患者乳房焮红漫肿极甚，疼痛难忍，毛孔深陷，恶寒发热，三天后皮肤湿烂，变为焦黑腐烂的溃面。舌红，苔黄燥，脉数。其病机为火毒炽盛，与肝胃湿热互结
555. 高位单纯性肛漏的治疗多选用挂线疗法
556. 猫眼疮的皮损典型特点是圆形紫红色水肿性红斑，中央色深，周围绕以鲜红色晕
557. 某患者乳房焮红漫肿极甚，疼痛难忍，毛孔深陷，恶寒发热，三天后皮肤湿烂，变为焦黑腐烂的溃面。舌红，苔黄燥，脉数。其内治方为龙胆泻肝汤合黄连解毒汤
558. 静脉曲张性外痔的治疗多选用静脉丛剥离术
559. 癣的治疗可用灰黄霉素、剪发、拔甲、拔发、洗头、10%水杨酸软膏、5%硫磺软膏
560. 某患者乳房焮红漫肿极甚，疼痛难忍，毛孔深陷，恶寒发热，三天后皮肤湿烂，变为焦黑腐烂的溃面。舌红，苔黄燥，脉数。其外治法为用七三丹提脓去腐，玉露膏外敷
561. 需用挂线疗法方能治愈的是高位肛瘘
562. 头癣治疗可用内服治癣方或苦参丸、灰黄霉素、剪发、洗头、拔发、外用 10% 硫磺软膏
563. 某女，30 岁，乳房胀痛经前期为甚，月经来潮后减轻，伴乳房发现肿块，形态不一，边界清。且腰酸乏力，神疲倦怠，月经延迟，量少色淡。舌淡，苔白，脉沉细。其诊断为乳癖
564. 肛门内外只有一个开口的是外盲瘻
565. 养血润燥法常用方剂为当归饮子
566. 某女，30 岁，乳房胀痛经前期为甚，月经来潮后减轻，伴乳房发现肿块，形态不一，边界清。且腰酸乏力，神疲倦怠，月经延迟，量少色淡。舌淡，苔白，脉沉细。其临床辨证分型为冲任失调
567. 内痔兼有贫血者可选用注射法
568. 男性单纯性淋病的主要症状是尿频、尿急、尿痛，尿道口溢脓
569. 某女，30 岁，乳房胀痛经前期为甚，月经来潮后减轻，伴乳房发现肿块，形态不一，边界清。且腰酸乏力，神疲倦怠，月经延迟，量少色淡。舌淡，苔白，脉沉细。其内服方为二仙汤合四物汤
570. 混合痔宜用注射法
571. 治疗疥疮最佳外用药选为 5%~20% 硫磺软膏
572. “乳房结核，初如梅子，数月不疗，渐大如鸡子，串延胸胁，破流稀脓白汁而内宴相通，外见阴虚等证”。这段描述的是乳癆
573. 属于血栓性外痔辨证分型的血热瘀阻证
574. 瘾疹的病因病机；风热、风寒居于肌表、情志内伤、冲任不调、胃肠湿热郁于肌肤、气血不足，虚风内生
575. 乳中肿块形如鸡卵，皮色不变，质地坚实，表面光滑，边界清楚，很易推动，虽经年累月，亦不会溃破，多考虑为乳核
576. 属于静脉曲张性外痔辨证分型的湿热下注证
577. 酒皴鼻临床分期为红斑型、丘疹型、鼻赘型

578. 乳房内肿块，坚硬如石，表面高低不平，边缘不整齐，常与皮肤粘连，活动度差，多考虑为乳岩
579. 肛漏常用的检查方法是探针检查
580. 虫咬皮炎有明显的糜烂、渗出时，外用药应选择溶液剂型
581. 乳中结核，形如梅李，推之可移，不痛，日久，可中软成脓，溃后脓水清稀，杂有败絮状物，其诊断是乳癆
582. 直肠高位息肉常用的检查方法是乙状结肠镜检查
583. 热疮的特征是好发于皮肤黏膜交界处、皮损初起为红斑，继而形成小水疱，破后露出鲜红糜烂面、发生于外生殖器者，可引起尿频、尿痛
584. 乳中结块，形如鸡卵，推之可移，不痛，日久，不化脓，亦不溃破，其诊断多为乳核
585. 血栓外痔好发于肛门齿线下载石位 3、9 点
586. 慢性湿疮外用药治疗原则是止痒、抑制表皮细胞增生、促进真皮炎症浸润吸收
587. 乳房部漏常发生于哺乳期
588. 内痔好发于肛门齿线上截石位 3、7、11 点
589. 与牛皮癣关系密切的是好发于颈项、尾骶、腠窝，瘙痒剧烈
590. 乳晕部漏常发生于非哺乳期
591. 结扎法适用于低位带蒂息肉
592. 结节性红斑，中医又称为瓜藤缠
593. 乳痈发于妊娠期者称内吹乳痈
594. 灌肠法适用于多发性息肉
595. 双腮窝对称性苔藓化斑片，表面粗糙脱屑，周围有扁平多角形丘疹，最应考虑的诊断是牛皮癣
596. 乳痈发于哺乳期者称外吹乳痈
597. 血栓外痔的主要症状是肛周剧痛
598. 属于湿疮的是风热疮
599. 乳癆多见乳晕中央有扁圆形肿块，与乳头呈同心圆排列
600. 结缔组织外痔的主要症状是肛门异物感
601. 瓜藤缠外用治疗原则是消炎、散结、止痛
602. 乳核多见乳房有卵圆形肿块，活动，表面光滑
603. 肛漏的局部症状为流脓、疼痛、瘙痒
604. 银屑病中医又称为白疕
605. 诊断为乳痈的是乳头溢奶，乳房有结块，红肿热痛
606. 肛门旁皮下脓肿的症状多表现为肛周红、肿、热、痛
607. 一期梅毒主要表现为硬下疳
608. 乳头溢脂样物，乳晕部有瘻管诊断为乳漏
609. 肛痈溃后用红油膏纱条引流。
610. 风热疮的临床特点是好发躯干、玫瑰红色斑疹上覆细小鳞屑、先有母斑后有子斑、病程 4-6 周
611. 诊断为乳腺管内乳头状瘤的是乳头溢血，乳晕下单发肿块，质软
612. 肛痈溃后脓尽应用生肌散纱条。
613. 不论何种类型，均应祛风化湿、活血杀虫的病是麻风
614. 乳房内脓肿切开引流取乳房放射状切口

615. 肛漏只有 1 个漏管，并通过外括约肌深层以下，内口在肛窦附近，为低位单纯性肛漏
616. 瓜藤缠之湿热瘀阻型应选用萆薢渗湿汤合桃红四物汤
617. 乳房内深部脓肿或乳房后脓肿切开引流取乳房下缘纵形切口
618. 肛漏有 3 个外口，管道有分支窦道，其主管通过外括约肌深层以上，有两个内口，是高位复杂性肛漏
619. 尖锐湿疣的临床表现为菜花状赘生物，多发生于生殖器及肛周
620. 乳晕下脓肿切开引流取乳晕边缘弧形切口
621. 一成年男性，常有便血，有肿物脱出肛外，便秘，肛门坠胀，异物感，有时出现肿痛，应考虑为Ⅱ期内痔
622. 热疮是由风热外感所致
623. 一 4 岁儿童，大便每日一行，色黄质软，便时下血，应首先考虑为直肠息肉
624. 黄水疮好发于夏秋季节，儿童多见、具有传染性、易产生败血症、肺炎、急性肾炎等并发症、多表现为脓疱、脓痂
625. 一青年妇女，近月余便时疼痛剧烈，大便秘结，点滴下血，应考虑为早期肛裂
626. 湿疹的特征是总因禀赋不耐，风湿热邪居于肌肤而致、一般分为急性、亚急性、慢性三期、对称分布、多形损害、剧烈瘙痒、反复发作易成慢性
627. 血栓剥离切除术可用于治疗血栓性外痔的手术方式
628. 预防接触性皮炎的最佳措施是明确病因，除去残留物，下次不接触
629. 外痔切除术可用于治疗结缔组织外痔的手术
630. 二期梅毒主要表现为虫蛀样脱发、横痃、扁平湿疣、鳞屑性丘疹
631. 静脉丛剥离切除术可用于治疗静脉曲张性外痔的手术
632. 药毒初次发病的潜伏期为 5~20 天
633. 二期内痔的主要症状是大便滴或射鲜血，可有肿物脱出
634. 扁瘡之热毒蕴结型治则为清热解毒
635. 多考虑为陈旧性肛裂的是大便带血，肛门疼痛
636. 患者男，70 岁。平素头发花白，近期头发大片均匀脱落，伴全身毛发脱落。头昏、耳鸣、腰膝酸软。舌淡、苔剥、脉细。此症属油风之肝肾不足型
637. 肛痈与血栓外痔的共有症状是肿痛
638. 粉刺患者外治常可选用颠倒散洗剂
639. 肛痈与肛漏的共有症状是流脓
640. 药毒治疗的第一步措施是停用致敏药物
641. 一般出现便血症状的疾病是直肠息肉、肛裂、肛隐窝炎、肛漏
642. 猫眼疮外用治疗原则是清热、收敛、止痒
643. 常表现为无痛性便血的疾病是直肠息肉
644. 药毒中症状最重的一型是大疱性表皮松解型
645. 猫眼疮寒湿阻络型内治宜选用桂枝汤合当归四逆汤
646. 瘾疹的特征是反复发作，时隐时现
647. 肺胃热盛型酒皰鼻常用内服方剂为枇杷清肺饮
648. 瘾疹反复发作，迁延日久，午后加重，伴心烦易怒，口干，手足心热，舌红；脉沉细，方用当归饮子