

中医外科主治冲刺知识点《专业实践能力》(200 条知识点)

1. 患者，女，61 岁。右上肢内侧出现群集性水疱，呈带状排列，伴疼痛 4 天。皮疹色淡，疱壁松弛，口不渴，食少腹胀，大便时溏，舌淡苔白或白腻，脉沉缓。其诊断是血风疮
2. 痛无定处，忽彼忽此，走注甚速，其疼痛的成因为风
3. 某男，78 岁。因半身不遂长期卧床失于护理，骶部皮肤出现褐色红斑，稍有破损，舌边瘀紫苔薄，脉弦。首先考虑的疾病是褥疮
4. 患者白疔病史多年，皮损多发生在腋窝、腹股沟，糜烂，痂屑黏厚，瘙痒剧烈，伴关节肿胀、疼痛，晨僵明显，舌红苔黄腻，脉滑。方药应选清瘟败毒饮加减
5. 某患者，男，50 岁。双下肢红肿 2 天，有成片的丘疱疹，渗出较多，瘙痒无休。外用药宜选溶液湿敷
6. 患者，男，30 岁。右手掌红肿热痛，整个手掌肿胀高突，掌心失去正常的凹陷，手背肿势明显，疼痛剧烈，红肿蔓延到手臂，伴发热、头痛。其诊断是托盘疔
7. 患者，男，50 岁，某煤矿工人。双下肢均见青筋垒垒，盘曲成团，色青紫，自觉下肢沉重而胀，抬高稍缓。应诊断为筋瘤
8. 患者，男，35 岁。左足怕冷疼痛，间歇性跛行年余。月余来，足痛持续不绝，夜间加剧，辗转难寐，趺阳脉搏动消失。此应诊断为脱疽
9. 患者，女性，40 岁。甲状腺次全切除手术后，患者出现声音嘶哑。喉镜检查显示左侧声带麻痹。手术中可能损伤的结构是左侧喉返神经
10. 患者左小腿不慎被开水烫伤，局部皮肤色红肿胀作热，疼痛剧烈，间有大小不等水疱，基底部潮湿。其烫伤深度为浅Ⅱ度
11. 肛痿患者，脓出稀薄不臭，淋漓不尽，伴低热盗汗，面色萎黄，神疲，纳呆。检查：局部疮口潜形，周围有空腔。治疗应首选青蒿鳖甲汤
12. 患者，男，36 岁。项后及上睑皮肤瘙痒已有 3 年，皮损增厚、干燥，呈席纹状，稍有脱屑，自觉阵发性奇痒，入夜尤甚。其诊断是牛皮癣
13. 一男性患者，50 岁。症见右侧乳晕下有一扁圆形肿块，边缘清楚，活动度好，有轻压痛。考虑乳癖
14. 某褥疮患者，创面腐肉难脱，难以愈合，面色白，神疲乏力，纳差食少，舌淡少苔，脉沉细无力。临床首选方剂是托里消毒散
15. 某女，颜面部可见对称性褐色色素沉着斑，边缘明显，伴有月经不调，月经色暗有血块，舌质暗红有瘀斑，脉涩。诊为气滞血瘀之黧黑斑
16. 患者，男，35 岁。肛旁肿痛 3 天，持续加剧，伴有恶寒、发热、便秘、溲赤，肛周红肿，质硬，触痛明显，舌红苔薄黄，脉数。其诊断是肛周脓肿
17. 一壮年男子，用力排便后，肛门缘剧烈疼痛。检查见截石位 3 点肛缘有暗紫色肿块，触痛阳性。此应诊为血栓性外痔
18. 患者，颈部淋巴结肿大，质地坚硬，形体消瘦。为明确病理组织学诊断，需进行何种检查颈淋巴结活检
19. 患者，男，46 岁。稍劳后尿道即有白浊溢出，伴头晕，精神不振，腰膝酸软，阳痿，早泄，舌淡胖苔白，脉沉细。实验室检查：前列腺液卵磷脂小体明显减少。其治法宜温肾固精
20. 患者，女，60 岁。左小腿焮红、灼热、疼痛伴高热 3 天。症见小腿皮肤鲜红一片，稍高出皮面，色如丹涂，扪之灼热，压痛明显，边界清楚，按压时红色稍退，放手后立即恢复。患者体温 39℃，伴胃纳不佳，大便 2 日未行。舌红苔黄腻，脉滑数。其治疗方法首选利湿清热解毒
21. 患者，男，25 岁。肛旁时流脓水，口苦，小便赤。查局部，见截石位 4 点，距肛缘 4cm，

有一外口，外口呈凸型，脓水较稠厚，局部可扪得硬索，内口位于齿线肛窦处。其诊断是低位单纯性肛瘘

22. 我国现存的第一部外科专著《刘涓子鬼遗方》
23. 患者，男，48岁。左臀部有一肿物，肿形如馒，边界不清，质地柔软，推之可移动，皮色不变，无自觉症状。此应考虑为肉瘤
24. 患者2周前躯干部有一淡红色斑，不痒，近1周来皮损逐渐增多，以躯干为主，局部有细薄鳞屑，肋部皮损呈椭圆形。患者可能是风热疮
25. 患儿，8岁。左小腿肿块，初起隐痛，微胀，微热，皮色暗褐、青紫。其辨证是瘀血肿痛
26. 乳房肿块，特点为单发，圆形或椭圆形，边缘清楚，表面光滑，质地坚实，无疼痛，活动度好。考虑为乳腺纤维腺瘤
27. 患者，女性，48岁。其行胃大部切除术，输血150mL后出现寒战，肌肉注射异丙嗪25mg后继续输血。半小时后，体温39.7℃，血压70/60mmHg，脉搏160次/分，发绀，意识不清，烦躁不安。可能的原因是细菌污染反应
28. 某女，44岁。左乳头溢出血性液体，无痛感、在乳晕部触到豆大圆形肿物，质软不与皮肤粘连、推之活动。治疗应首先考虑乳管内乳头状瘤
29. 患者，女，22岁。皮肤风团，色白，瘙痒，每遇冷风加重。选方为麻黄桂枝各半汤
30. 患者，女，67岁。其中风卧床1月，出现臀骶部皮肤潮红，轻度糜烂，少许渗出而无红肿。外用宜选择三石散
31. 某患者，男性，22岁，体重50kg。其患弥漫性腹膜炎已2天。病人嗜睡，脱水外观，呼吸深而快，呼气中有酮味，面部潮红，脉搏10次/分，膝腱反射迟钝，尿素氮7.9mmol/L。诊断为代谢性酸中毒
32. 患者，男，45岁。小便不畅，尿线变细或点滴而下，小腹胀满隐痛，舌质暗或有瘀点、瘀斑，苔白或薄黄，脉弦或涩。治疗应首选沉香散
33. 某男，26岁，工人。右指头肿胀疼痛7天，呈蛇头状肿，皮色焮红，疼痛剧烈，手指下垂时加重，伴恶寒发热头痛。透光试验见指头腹侧有一豆状黑色点。诊断为蛇头疔，外治宜切开引流
34. 某男，24岁。其夜晚饮酒，晨起时自觉左侧阴囊肿痛、下坠，牵引少腹隐痛，触按左侧睾丸肿大，阴囊皮色正常，伴发热恶寒，舌红苔黄腻，脉滑数。白细胞1510/L。临床诊断为子痈
35. 某患者，男，35岁。右下肢静脉曲张8年，近年出现足靴区轻度肿胀、皮肤脱屑、瘙痒、色素沉着、皮炎、湿疹等改变。这一系列症状说明病变已发展为交通静脉瓣膜功能不全
36. 患者，男性，手足背有边缘清楚的圆形红斑，局部有群集的丘疱疹，丘疹及鳞屑有痂皮，前臂和小腿也有两三处同样的皮损。该患者考虑为钱币型湿疹
37. 某患者，女，70岁。因急腹症入院，急救过程中先后出现少尿、肺水肿、呼吸困难、嗜睡、意识障碍、消化道出血等症状。此应诊断为MODS
38. 患儿颈部瘰癧渐大，互相融合成块，表皮呈暗红色，微热，按压有轻微波动感，脉细数。治宜养阴清热，托毒透脓
39. 患者，女，30岁。大便4日未行，今日排便后肛门疼痛剧烈，持续数小时未缓解，手纸染血，舌偏红，脉弦数。检查：截石位6点肛管见纵行梭形裂口，边缘整齐而有弹性。其诊断是肛裂
40. 痈疽肿硬，发热烦躁，干呕饮冷，大便秘结，舌干口苦，脉沉实。治疗宜选用内疏黄连汤

41. 某患者，女性，24岁，体重50kg。其患因急性胃炎反复呕吐已2周，时有头晕，手足麻木，但口渴不明显，尿中钠离子、氯离子减少，血清钠133mmol/L。估计需补充25g氯化钠
42. 患者，男，13岁。自幼便时有物脱出肛外，脱出物呈淡红色，长约3~5cm，触之柔软，无弹性，不易出血。其诊断是脱肛(I度脱垂)
43. 一男性患者，右足发冷，怕冷，沉重，麻木感余月，伴有间歇性跛行，趺阳脉搏动减弱，舌淡苔白腻，脉沉细。此应诊为脱疽的寒湿阻络
44. 患者，男，35岁。其饮酒后出现便血，呈喷射状，色鲜红，无疼痛，便时肛门内无物脱出。该患者最可能的诊断是肛管直肠癌
45. 脱疽患者，高龄，合并多种基础疾病，长期卧床，足趾溃疡，足趾坏死，清创处理后，见肉芽色暗，生长缓慢。患者自觉乏力倦怠、不欲饮水，体重进行性下降，五心烦热，查见舌淡尖红少苔，脉细无力。辨证用方宜选黄芪鳖甲汤合八珍汤
46. 患者皮肤上有一红色肿块，直径约3cm左右，无脓头，表面灼热，触之疼痛，3天后化脓，形成脓肿，溃后迅速愈合。应诊断为无头疖
47. 患者，女，56岁。既往有结石病史。腰部胀痛，时发时止，遇劳加重，疲乏无力，尿少或频数不爽，舌淡苔薄，脉细无力。治疗应首选济生肾气丸
48. 患者，男性，60岁。右阴囊可复性肿物14年，不能还纳1天，伴呕吐，停止排气排便。查体示心率108次/分，血压150/105mmHg，右阴囊肿大，压痛明显，腹膨隆，肠鸣音亢进。白细胞1410/L，中性粒细胞85%。对该患者的最佳处理是急作腹股沟疝探查，并作肠切除准备
49. 患儿6岁。X线片诊断为锁骨青枝骨折。正确的处理是三角巾悬吊患肢3周
50. 患者，女，25岁。产后乳房肿块疼痛，排乳不畅，皮色正常，局部发热，压痛，无应指感，伴发热恶寒。内治应首选瓜蒌牛蒡汤
51. 患者，女，40岁。双乳肿块界限不清，经前乳房胀痛，伴有月经不调，腰酸乏力，舌质淡红苔白，脉细。治疗应首选二仙汤合四物汤
52. 乳痈溃脓后疼痛减轻，但创面流脓清稀，淋漓不尽，日久不愈，伴全身乏力，面色少华。纳差，舌淡苔薄，脉弱无力。证属正虚邪恋证
53. 某患者，男性，40岁。20年前患过肺结核，平素健康，近3个月来有刺激性咳嗽，痰中偶有血丝，有时发热；X线：右肺上叶前段有2cm2.5cm的块状阴影，边缘不整呈分叶状。查痰脱落细胞3次均阴性。诊断首先考虑为肺癌
54. 患者，女性，32岁。左侧面颊反复起疱疹3年，每于感冒发热、食辣上火后发作。2天前疱疹又起，局部有烧灼、痒痛感，伴口干、咽痛、便秘。检查示左侧面颊片状水肿性红斑，上有群集的小水疱，舌质红苔黄，脉滑数。诊断辨证为热疮之肺胃热盛证
55. 患者，男，3岁。生疔于头顶皮肉较薄之处，引流不畅，头皮串空。其诊断是蝼蛄疖
56. 患者，女，45岁。左乳头单孔血性溢液2周。患者自觉头晕乏力，心悸多梦，纳差，乳房无疼痛不适。查左乳头中央乳孔有血痂，乳晕下可扪及0.8cm0.5cm肿块，质韧，无压痛，与皮肤无粘连，按压肿块时自中央乳孔流出血性液体。其中医诊断及西医治疗原则应为乳衄，手术治疗
57. 某男，62岁。进行性排尿困难5月余，伴头晕目眩，腰膝酸软，失眠多梦，咽干，舌红苔黄，脉细数。前列腺指诊：前列腺II度增大，中央沟变浅，光滑有弹性。诊断为精癰。治宜选用知柏地黄丸
58. 患者，男性，30岁。腹部砸伤5小时，查体见四肢湿冷，腹肌紧张，全腹压痛、反跳痛。有移动性浊音，肠鸣音消失。该病人目前应进行的处理包括诊断性腹腔穿刺、密切监测生命体征、补充血容量，抗休克治疗、抗感染治疗

59. 患者，女性，23岁。高热2周，应用抗生素、退热药无效，伴脱发、关节疼痛。检查：面部水肿性红斑，手指末端及甲周有紫红色斑片，压之部分色退。为明确诊断需要做的实验室检查有血常规、尿常规、抗核抗体、血清补体
60. 最早提出用截趾术治疗脱疽的医书是《内经》
61. 退休教师，小腿青筋怒张、迂曲20余年，久站久行或劳累时青筋迂曲加重，伴下坠不适感，平素气短乏力，食少腹胀，舌淡苔白，脉缓而无力。辨证用方宜选补中益气汤加减
62. 患者，女，20岁，未婚。其自幼右乳头内陷，2年前开始右乳头有粉渣样分泌物排出，乳头内侧乳晕边缘处反复出现肿块溃破流脓，至今已发作5次，创面脓水淋漓，红肿疼痛，难以收口。查体见患处局部僵肿结块，有脂质样物流出，周围皮肤潮湿，舌红苔薄黄，脉滑数。其中医诊断及方药应为乳漏，银花甘草汤加减
63. 一哺乳期患者，发现乳房右上象限有一直径4cm的肿块，疼痛2天。诊断为乳痈
64. 患者，男，31岁。右侧臀部结块肿胀、疼痛3天，皮肤灼热，红肿以中心为著，边界不清。患者步行困难，身热头痛，病前有局部肌肉注射史。应诊断为臀痈
65. 男性前阴病，临床表现为睾丸硬结，少腹或会阴胀痛，排尿困难或闭塞不通，苔白有齿痕，脉细滑。此属于浊痰凝结
66. 某男，65岁，牧民。阴囊突发红肿剧痛，肿甚而裂，滋流欲溃，阴囊皮肤紫黑，中心腐烂，伴发热恶寒，舌红苔黄，脉滑数。白细胞 $1810/L$ 。诊断为脱囊
67. 患者，女，30岁。便血，血不与大便相混，附于大便表面，或便时点滴而下，或一线如箭，量多，鲜红而无疼痛。首先应考虑内痔
68. 某男，68岁。患者排便时痔核脱出，可自行回纳，便血量少、色淡，经诊断为内痔。查血糖(空腹) $8.0\text{mmol}/L$ 。其有糖尿病病史10年。治疗应首选内治法
69. 某女，26岁。排便时痔核脱出，能自行回纳，便血量少。诊断为内痔。患者孕9个月，治疗禁用注射法
70. 患者肉瘦，急躁易怒，汗出心悸，失眠多梦，消谷善饥，形体消瘦，手部震颤。其辨证为气阴两虚证
71. 一男性患者，39岁。脱疽，症见患肢夜间痛甚难寐，抱膝而坐，患肢紫红，下垂更甚，汗毛脱落，舌质红苔薄白，脉沉细。证属血脉瘀阻
72. 患者进食鱼虾后全身起风团，风团片大、色红、瘙痒剧烈，伴脘腹疼痛，恶心呕吐，大便泄泻，舌红苔黄腻，脉弦滑数。辨证属胃肠湿热证
73. 患者，男性，12岁。8月上旬前额部出现红肿结块，约 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ 大小，中央有脓头未溃，疼痛拒按，伴口渴便秘，尿短赤，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选清暑汤
74. 某男，28岁。主诉终末尿痛、尿频、腰骶及会阴部坠胀2月余。患者便后或晨起后发现尿道口有白色分泌物，腰酸，乏力，舌红苔黄，脉细数。前列腺液检查 $\text{WBC}15 \sim 20/\text{HP}$ ，磷脂小体减少。诊断为精浊。属湿热蕴结
75. 一男性患者，35岁，吸烟15年。患者右下肢麻木，发凉，间歇性跛行8年。初次就诊时，嘱患者戒烟最为重要
76. 患者，男，48岁。其嗜酒多年，鼻头及双面颊发红数年，毛孔扩大，逐渐鼻头肥大，呈结节状，表面凹凸不平，舌暗红苔白腻，脉沉缓。诊断辨证为酒齄鼻，湿热血瘀证
77. 患者，男，23岁。右前臂内侧有红丝一条，向上走窜，停于肘部。用砭镰疗法的操作要点是用三棱针沿红线寸寸挑断，并微微出血
78. 患者，女性，22岁。大便带血，血色鲜红，便后无脱出，伴肛门疼痛，排便时疼痛，排便后稍好转，接着又有剧烈疼痛，约持续半小时，后逐渐缓解。可能的手术方法是侧切术

79. 男性前阴病表现为肾子硬结，少腹或会阴胀痛，排尿困难或闭塞不通，舌红苔黄腻，脉滑数。属于湿热下注
80. 感染性休克病人表现为意识清醒、皮肤潮红、脉搏无力、脉压 $>30\text{mmHg}$ 。毛细血管充盈试验小于 2s，每小时尿量大于 30mL。诊断为高动力性休克
81. 一患者，左上唇部生一小肿块，上有粟粒大脓头，痒痛并作，用手挤之后，红肿明显，并扩大至左面颊部，边界不清，伴高热、烦躁、神昏，苔黄腻。拟诊为走黄
82. 血栓性浅静脉炎，证见胸腹壁有条索状物，固定不移，胀痛，伴胸闷，舌淡红有瘀点，脉弦涩。治宜选用柴胡清肝汤
83. 某男，33 岁。多日来出现小便频急，茎中热痛，尿黄而浊，尿中有白浊滴出，伴会阴、睾丸部胀痛不适。肛诊：前列腺饱满，压痛(++)，质不硬。舌红苔黄腻，脉滑数。诊断为前列腺炎。治宜补肾滋阴，清泻相火
84. 患者，男，38 岁。右手示指红肿疼痛，并有以下特征：①患指均匀肿胀，呈圆柱状。②手指呈半屈曲状，患指做被动伸直运动时，疼痛剧烈。③指腹有显著压痛。应诊断为蛇肚疔
85. 某患者，女，50 岁。大便带血 3 个月，排便有下坠感，里急后重。直肠镜检查：距肛门 10cm 处可见 3cm3cm 肿块，表面呈菜花状，质脆，易出血。病理诊断为直肠腺癌。若选择手术，最佳术式为经腹直肠癌切除术
86. 患者，男性，32 岁。其十二指肠溃疡病史 1 年，口服药物治疗，因 4 小时前呕吐鲜血来诊。血压为 80 / 50mmHg，输血 1000mL 后，血压仍然偏低。查体示贫血貌，剑突下压痛，腹软。此病人最适宜的治疗方法是急诊剖腹手术
87. 一患者被毒蛇咬伤后，局部不红不肿，无渗液，麻木，淋巴结肿大，伴头晕、出汗、胸闷、四肢无力；严重时出现瞳孔散大、语言不清、牙关紧闭、昏迷。证属风毒证
88. 患者王某，全身泛发丘疹、斑丘疹 2 天。9 天前因感冒服用阿莫西林，2 天前躯干起针尖至米粒大小的丘疹或斑丘疹，色鲜红，伴瘙痒，此后皮损很快密集融合，伴发热，口唇焦燥，口渴不欲饮，小便黄，舌绛少苔，脉洪数。诊断为麻疹样型药疹
89. 一名冻伤病人，冻伤部位疼痛、微红，喜暖怕冷，舌淡苔白，脉沉细。其证属血虚寒凝证
90. 臁疮，证见小腿青筋怒张，局部红、疼痛，溃破滋水淋漓，疮面腐暗，伴口渴、便秘、尿赤，苔黄腻，脉滑数。治宜选用二妙丸合五神汤
91. 脱疽证见面色暗淡无华，喜暖怕冷，患肢沉重、酸痛麻木，局部皮肤苍白、触之冰凉、干燥，间歇性跛行，趺阳脉搏动减弱或消失，舌淡苔白腻，脉沉细而迟。治宜选用阳和汤、独活寄生汤加减
92. 患者，男性，车祸伤及头部，伤后出现左侧鼻唇沟变浅，鼻出血，左耳听力下降，左外耳道流出淡血性液体。诊断首先考虑颅中窝骨折
93. 臁疮症见创面色暗，黄水浸渍，患肢浮肿，纳食腹胀，便溏，面色萎黄，舌淡苔白腻。治宜选用参苓白术散合黄连解毒汤
94. 患者，男，70 岁。进行性排尿困难 2 年。症见精神不振，面色白，畏寒喜暖，腰膝冷，每日夜尿 3~4 次，舌苔薄白，脉沉细。其证候是肾阳不足，气化无权
95. 患者，男，39 岁。尿道中有白色分泌物滴出 3 年，伴腰膝酸软，头晕眼花，失眠多梦，遗精，舌红少苔，脉细数。治疗应首选知柏地黄丸
96. 患者刘某，女，70 岁。2000 年 11 月右肋背部肿物大小约 32.5cm，呈菜花状，手术病理为皮肤角化型鳞状细胞癌。2001 年 12 月局部复发。查体：右肋背部可见皮下肿物，大小约 4cm5cm，局部红肿，质硬不活动，有压痛。左腋下淋巴结肿大融合成团，大小约 4cm3cm，质硬，活动度差。该患者中医诊断为岩，不宜手术

97. 患者，男，38岁。婚后7年未育，性欲减退，阳痿早泄，伴腰酸腿软，疲软无力，小便清长，舌质淡苔薄白，脉沉细。除辨证属肾阳虚衰证外，还需“辨精用药”。据患者精子数少、成活率低、活动力差的情况，应在金匱肾气丸合五子衍宗丸的主方基础上加用淫羊藿、巴戟天、菟丝子
98. 病人右下腹部疼痛1天，体温37℃左右，伴恶心呕吐，右下腹部压痛、肌紧张。白细胞1010/L。最可能的诊断为阑尾炎
99. 患者，34岁，患子宫肌瘤行子宫切除术，硬膜外麻醉顺利，探查与牵拉子宫时，血压由120/80mmHg下降至90/60mmHg，心率由80次/分降至50。可能的原因是神经反射
100. 一病人右下腹转移疼痛，检查右下腹部有明显压痛、反跳痛，并可触及包块。患者壮热不退，恶心呕吐，纳呆，舌苔厚腻而黄，脉洪数。治则应为通腑泄热，解毒透脓
101. 某患者全身见10余枚肿块，大小不一，质地柔软，表面光滑，有囊性感，压入皮下，放手随即弹起。本病可诊为气瘤
102. 患者，女，28岁，产后2个月，哺乳期。患者右乳皮肤突发红肿热痛，疼痛难耐，继而出现皮肤湿烂，发黑溃腐，直径达7cm，伴发热恶寒，壮热口渴，舌苔黄腻，脉弦数。考虑为乳发
103. 某患者全身见10余枚肿块，大小不一，质地柔软，表面光滑，有囊性感，可压入皮下，放手随即弹起。内治治则为宣肺调气，解郁散结
104. 患者，女，28岁，产后2个月，哺乳期。患者右乳皮肤突发红肿热痛，疼痛难耐，继而出现皮肤湿烂，发黑溃腐，直径达7cm，伴发热恶寒，壮热口渴，舌苔黄腻，脉弦数。以上患者治疗可选用龙胆泻肝汤加减
105. 某患者全身见10余枚肿块，大小不一，质地柔软，表面光滑，有囊性感，可压入皮下，放手随即弹起。内治方药为通气散坚丸
106. 患者，女，28岁，产后2个月，哺乳期。患者右乳皮肤突发红肿热痛，疼痛难耐，继而出现皮肤湿烂，发黑溃腐，直径达7cm，伴发热恶寒，壮热口渴，舌苔黄腻，脉弦数。若上患者体质素虚、治疗不及时，可发生热毒内攻，高热神昏
107. 某男，30岁，近1周出现腰骶部及会阴部疼痛，小便频急，茎中热痛，尿色黄浊，苔黄腻，脉滑数。直肠指诊：前列腺饱满肿胀，有明显压痛，光滑无硬节。诊为前列腺炎。其病因病机是湿热蕴结
108. 一患者颈部、胫前出现皮疹，瘙痒1年。其近2周来工作忙，加班熬夜，皮疹加重，伴心烦急躁易怒，口苦咽干，失眠多梦，便于。查颈部、胫前有苔藓化斑片，可见抓痕、血痂，舌红，脉弦数。诊断为牛皮癣
109. 某男，30岁，近1周出现腰骶部及会阴部疼痛，小便频急，茎中热痛，尿色黄浊，苔黄腻，脉滑数。直肠指诊：前列腺饱满肿胀，有明显压痛，光滑无硬节。诊为前列腺炎。确立的治则是清利湿热
110. 110、一患者颈部、胫前出现皮疹，瘙痒1年。其近2周来工作忙，加班熬夜，皮疹加重，伴心烦急躁易怒，口苦咽干，失眠多梦，便于。查颈部、胫前有苔藓化斑片，可见抓痕、血痂，舌红，脉弦数。根据临床表现，辨证应为肝经化火证
111. 某男，30岁，近1周出现腰骶部及会阴部疼痛，小便频急，茎中热痛，尿色黄浊，苔黄腻，脉滑数。直肠指诊：前列腺饱满肿胀，有明显压痛，光滑无硬节。诊为前列腺炎。选用的方剂是八正散或龙胆泻肝汤或大分清饮合萆薢分清饮
112. 一患者颈部、胫前出现皮疹，瘙痒1年。其近2周来工作忙，加班熬夜，皮疹加重，伴心烦急躁易怒，口苦咽干，失眠多梦，便于。查颈部、胫前有苔藓化斑片，可见抓痕、血痂，舌红，脉弦数。治疗方剂宜选用龙胆泻肝汤

113. 患者，女性，25岁。产后23天，乳汁排出不畅，乳房局部疼痛，肿胀，结块直径2cm，皮色微红，身冷，发热，头痛骨楚，食欲不振。诊断考虑为乳痈
114. 乳痈患者，女性，26岁。症见右乳房肿痛，皮肤红肿热痛，肿块中央变软，有应指感，伴见壮热不退，舌红苔黄腻，脉洪数。证属热毒炽盛证
115. 患者，女性，25岁。产后23天，乳汁排出不畅，乳房局部疼痛，肿胀，结块直径2cm，皮色微红，身冷，发热，头痛骨楚，食欲不振。若患者治疗不及，病程发展可出现局部疼痛加重，结块增大，局部红肿灼热，10天左右结块中央渐软
116. 乳痈患者，女性，26岁。症见右乳房肿痛，皮肤红肿热痛，肿块中央变软，有应指感，伴见壮热不退，舌红苔黄腻，脉洪数。以上患者治宜清热解毒，托里透脓
117. 患者，女，82岁。症见双下肢麻木、发凉、疼痛，右小腿为重，右小腿肌肉萎缩，右足大趾变黑坏死。患者继往有高血压病史40年。该患者诊断应为动脉硬化闭塞症
118. 乳痈患者，女性，26岁。症见右乳房肿痛，皮肤红肿热痛，肿块中央变软，有应指感，伴见壮热不退，舌红苔黄腻，脉洪数。以上患者治疗应选何方透脓散加减
119. 患者，女，82岁。症见双下肢麻木、发凉、疼痛，右小腿为重，右小腿肌肉萎缩，右足大趾变黑坏死。患者继往有高血压病史40年。该病与脱疽鉴别点在于发病年龄
120. 乳痈患者，女性，26岁。症见右乳房肿痛，皮肤红肿热痛，肿块中央变软，有应指感，伴见壮热不退，舌红苔黄腻，脉洪数。以上患者切开后引流不畅发生袋脓，应在脓腔下方用垫棉法加压
121. 患者，女性，30岁。患者正值哺乳期，诉突发左侧乳房肿块3天，迅速发展至全乳房，体温38℃，左乳较右乳明显增大，皮肤发红、灼热。触诊：整个乳房发硬，有明显压痛，未触及局限性肿块和波动感，左腋窝可触及肿大淋巴结。本病例首先考虑的诊断是炎性乳岩
122. 患者，女性，23岁。症见高热2周，应用抗生素、退热药无效，伴脱发、关节疼痛、烦躁、口唇干燥。检查面部可见水肿性红斑，手指末端及甲周有紫红色斑片，压之部分色退，舌红绛苔黄燥，脉数。实验室检查：白细胞、血小板降低；尿检有蛋白及红细胞；血沉快；血清总补体下降，抗核抗体阳性。临床诊断及中医辨证应为红蝴蝶疮，热毒炽盛证
123. 患者，女性，30岁。患者正值哺乳期，诉突发左侧乳房肿块3天，迅速发展至全乳房，体温38℃，左乳较右乳明显增大，皮肤发红、灼热。触诊：整个乳房发硬，有明显压痛，未触及局限性肿块和波动感，左腋窝可触及肿大淋巴结。本病例进一步的确诊检查是切除活检
124. 患者，女性，23岁。症见高热2周，应用抗生素、退热药无效，伴脱发、关节疼痛、烦躁、口唇干燥。检查面部可见水肿性红斑，手指末端及甲周有紫红色斑片，压之部分色退，舌红绛苔黄燥，脉数。实验室检查：白细胞、血小板降低；尿检有蛋白及红细胞；血沉快；血清总补体下降，抗核抗体阳性。治疗方药应选用犀角地黄汤合黄连解毒汤加减
125. 患者，女性，30岁。患者正值哺乳期，诉突发左侧乳房肿块3天，迅速发展至全乳房，体温38℃，左乳较右乳明显增大，皮肤发红、灼热。触诊：整个乳房发硬，有明显压痛，未触及局限性肿块和波动感，左腋窝可触及肿大淋巴结。本病例的进一步治疗是放疗、化疗
126. 患者，女性，23岁。症见高热2周，应用抗生素、退热药无效，伴脱发、关节疼痛、烦躁、口唇干燥。检查面部可见水肿性红斑，手指末端及甲周有紫红色斑片，压之部分色退，舌红绛苔黄燥，脉数。实验室检查：白细胞、血小板降低；尿检有蛋白及红细胞；血沉快；血清总补体下降，抗核抗体阳性。经治疗，患者体温下降，持续低热，面部

红肿消退，双颊尚有淡暗红色斑片，神疲乏力，自汗盗汗，手足心热，舌红苔少，脉细。证候转变为邪热未清之气阴两伤证

127. 患者，男性，25岁。其素体羸瘦，有肺结核病史。1年前，患者出现右侧睾丸部酸胀隐痛，伴阴囊发凉，苔薄，脉滑。触诊：右侧附睾尾部有不规则的局限性结节，质硬，触痛明显。化验血沉为45mm/h。本病应诊断为子痰
128. 患者，女性，23岁。症见高热2周，应用抗生素、退热药无效，伴脱发、关节疼痛、烦躁、口唇干燥。检查面部可见水肿性红斑，手指末端及甲周有紫红色斑片，压之部分色退，舌红绛苔黄燥，脉数。实验室检查：白细胞、血小板降低；尿检有蛋白及红细胞；血沉快；血清总补体下降，抗核抗体阳性。此时治疗方药应改用生脉散合大补阴丸加减
129. 患者，男性，25岁。其素体羸瘦，有肺结核病史。1年前，患者出现右侧睾丸部酸胀隐痛，伴阴囊发凉，苔薄，脉滑。触诊：右侧附睾尾部有不规则的局限性结节，质硬，触痛明显。化验血沉为45mm/h。辨证为湿痰凝结证
130. 患者，女性，23岁。症见高热2周，应用抗生素、退热药无效，伴脱发、关节疼痛、烦躁、口唇干燥。检查面部可见水肿性红斑，手指末端及甲周有紫红色斑片，压之部分色退，舌红绛苔黄燥，脉数。实验室检查：白细胞、血小板降低；尿检有蛋白及红细胞；血沉快；血清总补体下降，抗核抗体阳性。患者自我调护最重要的是避免日光和紫外线照射
131. 患者，男性，25岁。其素体羸瘦，有肺结核病史。1年前，患者出现右侧睾丸部酸胀隐痛，伴阴囊发凉，苔薄，脉滑。触诊：右侧附睾尾部有不规则的局限性结节，质硬，触痛明显。化验血沉为45mm/h。选择的治则应为温经通络，化痰除湿
132. 患者，男性，4岁。左侧阴囊肿大，直立时肿大明显，平卧时消失。若确诊为水疝，需透光试验阳性检查支持
133. 患者，男性，25岁。其素体羸瘦，有肺结核病史。1年前，患者出现右侧睾丸部酸胀隐痛，伴阴囊发凉，苔薄，脉滑。触诊：右侧附睾尾部有不规则的局限性结节，质硬，触痛明显。化验血沉为45mm/h。方药应为阳和汤加减，兼服小金丹
134. 患者，男性，4岁。左侧阴囊肿大，直立时肿大明显，平卧时消失。若确诊为狐疝，需阴囊部可闻及肠鸣音检查支持
135. 患者中年女性，突发颈部两侧肿块，疼痛，灼热，皮色如常，吞咽时疼痛加重，口渴，咽干，诊为瘰疬。若患者伴有恶寒发热，选方为牛蒡解肌汤
136. 患者，男性，4岁。左侧阴囊肿大，直立时肿大明显，平卧时消失。若患者确诊为水疝且阴囊光亮如晶，苔薄白，脉细滑。应辨证为肾气亏虚证
137. 患者中年女性，突发颈部两侧肿块，疼痛，灼热，皮色如常，吞咽时疼痛加重，口渴，咽干，诊为瘰疬。若表证已解，选方为柴胡清肝饮
138. 患者，男性，4岁。左侧阴囊肿大，直立时肿大明显，平卧时消失。若患者确诊为水疝且阴囊光亮如晶，苔薄白，脉细滑。其治则为温肾通阳，化气行水
139. 患者，女，32岁。剖宫产后，其出现右小腿腓肠肌疼痛，小腿肿胀，腓肠肌压痛明显。诊断当考虑小腿血栓性深静脉炎
140. 患者，男性，4岁。左侧阴囊肿大，直立时肿大明显，平卧时消失。若患者确诊为水疝且阴囊光亮如晶，苔薄白，脉细滑。其选择方药为济生肾气丸加减
141. 患者，女，32岁。剖宫产后，其出现右小腿腓肠肌疼痛，小腿肿胀，腓肠肌压痛明显。若患者肿胀日久不消退，按之不硬，沉重麻木，皮肤发紫，倦怠乏力，舌淡有齿痕苔薄白，脉沉而涩。证属气虚血瘀
142. 患者，男性，65岁。近8年来，其夜尿由2~3次渐增至4~5次，排尿涩滞不畅，昨晚发生小便欲解不能，小腹急满胀痛，舌暗，脉细涩。直肠指诊前列腺增大，约5.5cm

×4.1cm×3.3cm，中央沟消失，质韧有弹性，光滑无结节。首先考虑的疾病是良性前列腺增生症

143. 患者，女，32岁。剖宫产后，其出现右小腿腓肠肌疼痛，小腿肿胀，腓肠肌压痛明显。治法当为益气活血
144. 患者，男性，65岁。近8年来，其夜尿由2~3次渐增至4~5次，排尿涩滞不畅，昨晚发生小便欲解不能，小腹急满胀痛，舌暗，脉细涩。直肠指诊前列腺增大，约5.5cm×4.1cm×3.3cm，中央沟消失，质韧有弹性，光滑无结节。辨证应为下焦蓄血，瘀阻膀胱
145. 患者，女，32岁。剖宫产后，其出现右小腿腓肠肌疼痛，小腿肿胀，腓肠肌压痛明显。若为上证型，方药当选补阳还五汤
146. 患者，男性，65岁。近8年来，其夜尿由2~3次渐增至4~5次，排尿涩滞不畅，昨晚发生小便欲解不能，小腹急满胀痛，舌暗，脉细涩。直肠指诊前列腺增大，约5.5cm×4.1cm×3.3cm，中央沟消失，质韧有弹性，光滑无结节。选择的治则应为活血化瘀，通气利水
147. 患者，男性，56岁。近3年来，其尿频、尿急伴急迫性尿失禁，排尿不畅，尿不尽感。单位体检发现前列腺增大。在体格检查中，与前列腺癌最一致的发现是无弹性硬结
148. 患者，男性，65岁。近8年来，其夜尿由2~3次渐增至4~5次，排尿涩滞不畅，昨晚发生小便欲解不能，小腹急满胀痛，舌暗，脉细涩。直肠指诊前列腺增大，约5.5cm×4.1cm×3.3cm，中央沟消失，质韧有弹性，光滑无结节。方药应为代抵当汤加篇蓄、瞿麦
149. 患者，男性，56岁。近3年来，其尿频、尿急伴急迫性尿失禁，排尿不畅，尿不尽感。单位体检发现前列腺增大。若确诊为前列腺癌，其早期易发生转移的部位是骨骼
150. 患者，女，26岁。月经前双侧乳房胀痛明显。检查时可及双乳房肿块，大小不等，有索条状、结节型及片状肿块。月经后症状减轻。诊断为乳癖
151. 患者，男性，56岁。近3年来，其尿频、尿急伴急迫性尿失禁，排尿不畅，尿不尽感。单位体检发现前列腺增大。如果这个病人病史中有脑血管病和糖尿病，则应把神经源性膀胱考虑在内
152. 患者，女，26岁。月经前双侧乳房胀痛明显。检查时可及双乳房肿块，大小不等，有索条状、结节型及片状肿块。月经后症状减轻。根据上例患者的症状特点，考虑为混合型肿块
153. 患者，男性，56岁。近3年来，其尿频、尿急伴急迫性尿失禁，排尿不畅，尿不尽感。单位体检发现前列腺增大。如果这个病人有神经源性膀胱功能障碍，体格检查可能发现的是肛门括约肌张力、球海绵体肌反射异常
154. 患者，女，26岁。月经前双侧乳房胀痛明显。检查时可及双乳房肿块，大小不等，有索条状、结节型及片状肿块。月经后症状减轻。上例患者治疗要点应为止痛与消块
155. 患者，女性，来诊时见可见颈部肿块。若肿块坚硬如石，高低不平，不能随吞咽上下移动，诊为石瘰
156. 一男孩头部有白色鳞屑斑7天就诊。查头部有一银元大小的白色鳞屑斑，局部毛发干枯无泽，距头皮0.2~0.8cm处头发部分折断，根部包绕有白色鳞屑菌鞘。该患者需做病发真菌镜检才能明确诊断
157. 患者，女性，来诊时见可见颈部肿块。若为突发肿块，肿胀疼痛，吞咽时疼痛加重，伴恶寒发热，诊为瘰癧
158. 一男孩头部有白色鳞屑斑7天就诊。查头部有一银元大小的白色鳞屑斑，局部毛发干枯无泽，距头皮0.2~0.8cm处头发部分折断，根部包绕有白色鳞屑菌鞘。与本病预防与

调护有关的是注意个人卫生、发病后及早、彻底治疗、患儿应隔离、幼儿园、学校、理发店、浴室应做好卫生管理

159. 患者，女性，来诊时见可见颈部肿块。若为弥漫性肿大，边缘不清，随吞咽上下移动，诊为气瘰
160. 某患者左膝上方有一肿块，坚硬如石，紧贴于骨，推之不移。X线摄片：肿块边界清楚，与正常组织有明显的分界线，无骨膜反应。可诊为良性骨瘤
161. 患者，女性，来诊时见可见颈部肿块。若肿块柔韧而圆，如肉团状，发展缓慢，诊为筋瘰
162. 某患者左膝上方有一肿块，坚硬如石，紧贴于骨，推之不移。X线摄片：肿块边界不清，骨质破坏，骨结构紊乱。可诊为恶性骨瘤
163. 患者，男性，45岁。近3个月，会阴部坠胀不适，排尿时轻微刺痛，阴茎勃起时弯曲，疼痛。查：阴茎背部皮肤如常，触诊有条索状硬结，无压痛，舌淡苔薄白，脉濡。首先考虑的疾病是阴茎痰核
164. 患者，男性，26岁，结婚1年。主诉性交时排出精液，呈淡红色，伴射精时疼痛，腰膝酸软，头晕眼花，夜间盗汗，心烦口干，舌红少苔，脉细数。化验精液示红细胞满视野。B超提示精囊炎性改变。诊断为血精 应辨证为阴虚火旺证
165. 患者，男性，45岁。近3个月，会阴部坠胀不适，排尿时轻微刺痛，阴茎勃起时弯曲，疼痛。查：阴茎背部皮肤如常，触诊有条索状硬结，无压痛，舌淡苔薄白，脉濡。辨证为痰湿凝结
166. 患者，男性，26岁，结婚1年。主诉性交时排出精液，呈淡红色，伴射精时疼痛，腰膝酸软，头晕眼花，夜间盗汗，心烦口干，舌红少苔，脉细数。化验精液示红细胞满视野。B超提示精囊炎性改变。诊断为血精 选择的治则应为滋阴泻火，凉血安络
167. 患者，男性，45岁。近3个月，会阴部坠胀不适，排尿时轻微刺痛，阴茎勃起时弯曲，疼痛。查：阴茎背部皮肤如常，触诊有条索状硬结，无压痛，舌淡苔薄白，脉濡。治则应为温经通络，化痰除湿
168. 患者，男性，26岁，结婚1年。主诉性交时排出精液，呈淡红色，伴射精时疼痛，腰膝酸软，头晕眼花，夜间盗汗，心烦口干，舌红少苔，脉细数。化验精液示红细胞满视野。B超提示精囊炎性改变。诊断为血精方药应为知柏地黄丸加减
169. 患者，男性，45岁。近3个月，会阴部坠胀不适，排尿时轻微刺痛，阴茎勃起时弯曲，疼痛。查：阴茎背部皮肤如常，触诊有条索状硬结，无压痛，舌淡苔薄白，脉濡。方药应为化坚二陈丸加减
170. 患者，女性，50岁。左乳外上象限包块，质硬表面欠光滑，表皮呈橘皮样改变，无压痛，伴情志不舒，胸闷不适，苔薄白，脉弦滑。本病可诊为乳腺癌
171. 患者舌体胖大，肿物溃腐，味臭难闻伴便秘溲黄，心烦口渴发热，舌苔黄腻而厚，脉滑数。诊为舌菌。本病辨证属气阴两虚
172. 患者，女性，50岁。左乳外上象限包块，质硬表面欠光滑，表皮呈橘皮样改变，无压痛，伴情志不舒，胸闷不适，苔薄白，脉弦滑。辨证属情志郁结证
173. 患者舌体胖大，肿物溃腐，味臭难闻伴便秘溲黄，心烦口渴发热，舌苔黄腻而厚，脉滑数。诊为舌菌。内治治则为清泻火毒
174. 患者，女性，50岁。左乳外上象限包块，质硬表面欠光滑，表皮呈橘皮样改变，无压痛，伴情志不舒，胸闷不适，苔薄白，脉弦滑。内治治则为疏肝解郁，化痰散结
175. 患者舌体胖大，肿物溃腐，味臭难闻伴便秘溲黄，心烦口渴发热，舌苔黄腻而厚，脉滑数。诊为舌菌。内治方药为黄连解毒汤加减
176. 患者，女性，50岁。左乳外上象限包块，质硬表面欠光滑，表皮呈橘皮样改变，无压

- 痛，伴情志不舒，胸闷不适，苔薄白，脉弦滑。内治方药为神效瓜蒌散合开郁散
177. 患者中年女性，结喉正中偏左有一半圆形包块，初期如雀蛋大，现如鸡蛋大，边界清楚，表面光滑，皮色如常，能随吞咽上下移动。上病例诊断为肉瘤
178. 患者，男，73岁。其因脑梗死卧床15年，3日前突然出现左下肢凹陷性水肿，皮薄光亮，皮温升高，皮色红。该患者诊断应为血栓性深静脉炎
179. 患者中年女性，结喉正中偏左有一半圆形包块，初期如雀蛋大，现如鸡蛋大，边界清楚，表面光滑，皮色如常，能随吞咽上下移动。内治法为理气解郁，化痰软坚
180. 患者，男，73岁。其因脑梗死卧床15年，3日前突然出现左下肢凹陷性水肿，皮薄光亮，皮温升高，皮色红。该患者应卧床制动，抬高患肢
181. 患者中年女性，结喉正中偏左有一半圆形包块，初期如雀蛋大，现如鸡蛋大，边界清楚，表面光滑，皮色如常，能随吞咽上下移动。内治选用方剂为海藻玉壶汤
182. 患者，男，73岁。其因脑梗死卧床15年，3日前突然出现左下肢凹陷性水肿，皮薄光亮，皮温升高，皮色红。本病的最严重的并发症是肺动脉栓塞
183. 患者中年女性，突发颈部两侧肿块，疼痛，灼热，皮色如常，吞咽时疼痛加重，伴恶寒发热，咽痛。上病例诊断为瘰疬
184. 患者，男，73岁。其因脑梗死卧床15年，3日前突然出现左下肢凹陷性水肿，皮薄光亮，皮温升高，皮色红。若此患者在入院治疗第9天出现胸痛、咳嗽、咯血，当考虑肺栓塞
185. 患者中年女性，突发颈部两侧肿块，疼痛，灼热，皮色如常，吞咽时疼痛加重，伴恶寒发热，咽痛。内治法为疏风清热，化痰解郁
186. 患者冬季双手背、前臂出现暗红色斑，水肿，皮损中心颜色呈紫红色，虹膜样改变，遇寒后加重，伴下肢沉重，关节痛，小便清长，舌淡苔白，脉沉细。辨证应为寒湿阻络证
187. 患者中年女性，突发颈部两侧肿块，疼痛，灼热，皮色如常，吞咽时疼痛加重，伴恶寒发热，咽痛。内治选用方剂为牛蒡解肌汤
188. 患者冬季双手背、前臂出现暗红色斑，水肿，皮损中心颜色呈紫红色，虹膜样改变，遇寒后加重，伴下肢沉重，关节痛，小便清长，舌淡苔白，脉沉细。治疗方剂应选桂枝汤合当归四逆汤
189. 患者，女，23岁，已婚。咳嗽2月，午后发热，身热不扬，口干口渴，舌红苔黄。要明确诊断，以结核菌素试验检查方法为首选
190. 190、患者，男性，40岁。主诉终末期尿痛、尿频，会阴及腰骶部胀痛1月余，晨起尿道口可见白色分泌物，伴乏力、腰酸。前列腺液检查白细胞满视野，磷脂小体减少。舌紫暗苔黄，脉沉涩。诊断为精浊。辨证为气滞血瘀证
191. 患者，女，23岁，已婚。咳嗽2月，午后发热，身热不扬，口干口渴，舌红苔黄。上例患者发病数月后左侧乳中可及一个结块，边界不清楚，质硬，推之可动，皮色无明显改变，无疼痛。此应考虑为乳癌
192. 患者，男性，40岁。主诉终末期尿痛、尿频，会阴及腰骶部胀痛1月余，晨起尿道口可见白色分泌物，伴乏力、腰酸。前列腺液检查白细胞满视野，磷脂小体减少。舌紫暗苔黄，脉沉涩。诊断为精浊。选方为前列汤
193. 患者，女，23岁，已婚。咳嗽2月，午后发热，身热不扬，口干口渴，舌红苔黄。以上患者平素忧郁，心情不畅，纳差，善太息。证属气滞痰凝
194. 患者，男，42岁。症见左下肢皮色紫暗，抬高时苍白，足背毳毛脱落，皮肤肌肉萎缩，趾甲变厚，趺阳脉搏动消失，患肢疼痛持续，夜间为重，舌暗红，脉沉细而涩。该患者诊断为脱疽血瘀证
195. 患者，女，23岁，已婚。咳嗽2月，午后发热，身热不扬，口干口渴，舌红苔黄。上

患者除抗癆治疗外可选开郁散合消癆丸

196. 患者，男，42岁。症见左下肢皮色紫暗，抬高时苍白，足背毳毛脱落，皮肤肌肉萎缩，趾甲变厚，趺阳脉搏动消失，患肢疼痛持续，夜间为重，舌暗红，脉沉细而涩。该患者适宜的治法为活血通络止痛
197. 患者，男性，45岁。右侧阴囊肿大，阴囊寒冷，坠胀不适，神疲乏力，腰酸腿软，小便清长，苔白，脉沉细。现确诊为水疝。辨证为肾阳亏虚
198. 患者，男，42岁。症见左下肢皮色紫暗，抬高时苍白，足背毳毛脱落，皮肤肌肉萎缩，趾甲变厚，趺阳脉搏动消失，患肢疼痛持续，夜间为重，舌暗红，脉沉细而涩。上例患者当选桃红四物汤
199. 患者，男性，45岁。右侧阴囊肿大，阴囊寒冷，坠胀不适，神疲乏力，腰酸腿软，小便清长，苔白，脉沉细。现确诊为水疝。选方为加味五苓散
200. 患者，男，42岁。症见左下肢皮色紫暗，抬高时苍白，足背毳毛脱落，皮肤肌肉萎缩，趾甲变厚，趺阳脉搏动消失，患肢疼痛持续，夜间为重，舌暗红，脉沉细而涩。医生当提醒该患者注意戒除吸烟嗜好，注意患肢保暖