

## 医学心理学 (304 条知识点)

1. 气质影响人的行为速度
2. 人们在遇到压力、痛苦、困境时，引起自杀的主要原因是难以对应激源
3. 原发性高血压的患者常具有雄心壮志、争强好胜、办事过分认真、容易激动和烦恼
4. 表演性型人格障碍的特点：感情用事，表情丰富但矫揉造作，爱发脾气、暗示性强、爱表现自己，行为夸张、做作，渴望被别人注意、卖弄风情，喜爱挑逗，给人以轻浮的感觉
5. 心理健康的标准：智力正常、行为健康、情绪乐观、人格健康
6. 适用于慢性疾病医疗过程的模式是共同参与模式
7. 对环境强烈不满是 A 型行为特征
8. 社会性心理应激源主要指人际冲突
9. 心身疾病：心身疾病发病的原因应当是心理社会因素或心理社会因素是重要诱因、具有由心理因素引起的躯体症状、该躯体或者有明确的器质性病理改变，或者有已知的病理生理变化为基础、不是神经症或精神病
10. 症状具有做作、夸张或富有感情色彩的神经症类型是癔症
11. 青少年心理健康教育的主要内容的是性生理、性心理、性道德教育，世界观、价值观、人生观教育，友谊观和恋爱观教育，学习策略和方法的教育
12. 目前最常用的智力高低表示法是离差智商
13. 短时记忆的容量为  $7 \pm 2$  个组块
14. 应激的概念可理解为外界刺激和环境要求
15. 邓巴认为消化性溃疡患者的病前人格特点大多是：工作认真负责，有较强进取心，有强烈的依赖愿望，易怨恨不满，常常压抑愤怒
16. 当人们遭遇了丧失打击之后有可能发展为创伤后应激障碍
17. 青春期主要的自我意识矛盾是独立与依赖
18. 投射性测验的理论基础是精神分析理论
19. 人格包括人格特质和人格倾向
20. 某学生其貌不扬，但学习特别刻苦，最终成为同学们学习的榜样。这是采用了补偿的心理防御方式
21. 某病人拒绝医生有关癌症诊断，先后就诊于许多医院，来证实自己没有病。该病人使用了否认机制
22. 用“潜意识冲突假说”来解释异常心理原因的理论模式为心理动力学理论模式
23. 心理健康标准是人格健全、情绪乐观稳定、行为和生活方式健康、智力正常
24. 一般问题解决模式包含发现问题、分析问题、提出假设、实践和检验假设的几个要素，那么心理治疗过程中的分析认识阶段相当于提出假设
25. “前有狼，后有虎”，这种动机冲突是双避冲突
26. 应激生理反应的神经机制主要通过丘脑下部—垂体前叶—肾上腺皮质轴调节
27. 冠心病患者中有一种特征性的行为模式被称为 A 型行为类型
28. 引起抑郁性障碍的病因可能是生物学因素、心理因素、社会因素
29. 中老年人常遇到的心理问题一般包括记忆力的减退、家庭与工作的冲突、事业与健康的冲突、良好生活习惯的保持
30. 效度反映心理测量结果的真实性
31. 在高考填报志愿时，某位同学的分数达到了两所他特别喜欢的学校的录取分数线，此时他感到的矛盾冲突属双趋冲突

32. 在面对应激事件时,判断自己的应对资源和应对方式的认知评价是拉泽鲁斯的次级评价
33. 疼痛的反应主要包括心理反应、生理反应和行为反应
34. 分裂型人格障碍:性格明显内向,回避社交,多离群独处
35. 成年人的心理健康:家庭稳定是情绪乐观、事业有成的基石,充足的睡眠仍很重要、矫正不良行为是这个时期维护身心健康的关键
36. 为保证材料真实,也为了维护心理治疗本身的声誉及权威性,因此心理治疗要坚持保密原则
37. 知觉的基本特征包括恒常性、相对性、理解性、整体性
38. 调整对刺激事件的认识态度就是使事件变得可控制、可预测
39. 偏头痛首次发病多在青少年期
40. 吗啡制剂最容易产生生理依赖、耐药物性与戒断反应的精神活性物质
41. 心理健康的标准是心情愉快、有自制力、良好的人际关系
42. 目前我国最常用的智力量表是韦克斯勒智力量表
43. 情绪、情感作用:适度的焦虑能发挥人的最高学习效率、低焦虑者在情绪压力下可提高工作效率、人际情感是人际交往中与彼此的需要是否获得满足相联系的内心体验、情绪具有明显的生理成分,直接关系到身心健康
44. 心理应激对健康的消极影响:使已有的疾病加重、使原有的疾病复发、损害适应能力,引发心身症状、与其他因素共同影响引发新的疾病
45. 心理、社会因素与癌症关系:不良心理反应和应付方式对癌症病人生活质量有严重影响、争强好胜、时间紧迫感、脾气暴躁不是癌症病人的行为特点、突然得知患癌症消息的病人情绪反应强烈,易导致免疫力下降、大多数癌症病人患病前都经历过痛苦的生活事件
46. 躁狂发作的症状表现有理想迅速、意念飘忽,轻浮轻佻、惹事生非,好大喜功、夸夸其谈,情绪高涨、干劲十足
47. 心理卫生应从胎儿期抓起
48. 求医行为受多种心理、社会因素的影响
49. 情感是与人的一种需要相联系的体验,这种需要是社会性需要
50. 心理应激对健康的影响表现为促进健康、加重已有疾病、与心身疾病的发病有关、与心理障碍的发病有关
51. 与心身疾病的诊断有关的是根据临床症状、体征和特殊检查明确器质性改变、疾病的发生有相平行的心理社会因素、排除神经症和精神疾病、单纯的生物医学疗法收效甚微
52. 焦虑、人际关系冲突、躯体不适、否认回避现实属于神经症临床症状
53. 中年人流体智力下降的物质基础是神经生理的变化
54. 受到社会尊重和理解、享受医疗服务、保守个人秘密、免除或部分免除健康时的社会责任属于病人权利的内容
55. "人芝兰之室久而不闻其香,入鲍鱼之肆久而不闻其臭。"这说的是感觉的适应性
56. 塞里的全身适应综合征理论:应激反应受下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴和交感神经-肾上腺皮质轴
57. 在治疗神经性呕吐时,要着重解决心理问题
58. 患者主诉1年来常常感到莫名紧张,坐立不安,总预感不好的事情发生,常伴汗出、心慌、手脚震颤。该患者可能患有焦虑性神经症
59. 婴儿期的年龄范围0~1岁
60. 心理测量工具好坏的最基本标志是信度和效度

61. 注意的描述：注意的两个特点是指向性与集中性、注意的基本功能是对信息的选择、注意的广度受知觉特点的影响，一般知觉对象越集中，排列越有规律，越能形成一个整体，注意的范围就越广、注意的稳定性并不是一成不变的，而是在间歇性地加强和减弱
62. 心理应激：相信事件是可控制可预测的可以减轻心理应激、适度的应激可以促进健康、长期的超强度应激会损害健康、有效的放松训练可以降低心理应激水平
63. 强调潜意识心理冲突、个体心理特征产生心身疾病的研究途径是心理动力理论
64. 患者体验到某种观念和冲突来源于自身，但违背自己意愿，极力抵抗却无法控制，属于强迫症
65. 智力发展最快的时期是儿童期
66. 心理测量的误差主要来源有施测条件、主试者素质、应试者动机、应试者生理状态
67. 意志通过影响认知过程和情绪过程对人的健康产生影响
68. 一般适应综合征(GAS)分警戒期、阻抗期、衰竭期三期
69. 研究发现，焦虑人格倾向、内向、孤僻、思虑过多且卵巢功能不全的女性在不良事件刺激时易发生心因性闭经
70. 某患者被诊断为恐惧性神经症，则根据诊断标准，该患者应具有植物神经紊乱、回避害怕的事物和情景、想起恐惧对象惴惴不安、明知道不合理、不必要却仍然无法控制的恐惧和回避等症状
71. 心理健康的培养应从优生计划开始
72. 心理咨询的意义：解除紧张应激压力的手段、防治心身疾病、促进健康长寿、心理卫生知识的传播途径
73. 知觉是人脑对客观事物整体属性的反映
74. 对于因车祸突然死亡和因半身不遂长期卧床而致的死亡，给亲人带来的打击，前者要大得多，说明应激反应的强度与应激事件的发生方式有关
75. 癌症病人听到癌症的诊断后，出现心理反应的顺序是休克--恐惧期，否认--怀疑期，愤怒--沮丧期，接受--适应期
76. 固执、猜疑是偏执型人格障碍的特点
77. 对婴幼儿心理健康的发展至关重要是母亲的爱抚
78. 心理治疗医生是否成熟称职的重要条件以及心理治疗成败的关键是建立良好的医患关系
79. 反映直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的心理过程是感觉
80. 处于相同应激源作用下而产生不同的应激反应，其主要原因是个体的认知评价不同
81. 某中年人，童年生活受挫折，个性克制，情绪压抑，经常焦虑、抑郁，又不善于宣泄，过分谨慎，强求合作调和。他的行为模式最容易导致的躯体疾病是癌症
82. 某女咨询者，35岁，某大学教师。3个月前因出国问题与领导争吵，而后逐渐表现出情绪低落，兴趣减退，对未来悲观失望，认为领导和同事都疏远她，常有怨天尤人的表现。能主动求医，接触良好。其主要的情绪反应是抑郁
83. 中年人随年龄增长而继续上升的智力是晶体智力
84. 不论进行何种心理治疗，治疗者均应遵守真诚原则、保密原则、耐心原则、中立于回避原则
85. 求知欲是一种理智感
86. 在相同背景下，遭遇相同的应激事件时，不同性格的人往往会产生不同的应激反应，这是因为人格因素不同

87. 心身关系是心身统一论
88. 强迫型人格障碍与强迫症确有联系，但前者一般不会强迫思维及刻板的仪式化行为
89. 评价心理健康的标准包括人际和谐、情绪稳定、人格完整、智力正常
90. 某人已被确认为某病，而本人否认自己有病，此人角色行为的改变属于角色行为缺如
91. 衡量感觉能力的客观指标是感觉阈限
92. 一位外科手术前的病人，坐卧不安，眉头紧锁，小动作多。这一现象是应激的情绪反应
93. 最早提出七种经典的心身疾病的是亚历山大
94. 研究发现进食障碍与焦虑障碍密切相关
95. 语言发展的关键期是在 3 岁前
96. 患者由于工作繁忙或者家庭责任而不能安心治疗，这是患者角色冲突
97. 艾森克认为人格有情绪性维度、内外向维度和精神质维度
98. 布雷迪曾做过这样的实验，两只猴子各坐在自己被约束的椅子上，每隔一定时间通一次电，其中一只(A)猴子能自己断电而避免电击，另一只猴子(B)则不能，最终 B 得了溃疡病
99. 心身疾病的主要干预方法是消除心理、社会刺激因素、行为矫正、认知干预治疗
100. 某成年患者极端自私，以自我为中心，冷酷无情，多次违法乱纪。青少年时期屡次被劳动教养。其可能患有反社会型人格障碍
101. 自我意识的形成与培养应主要放在少年期
102. 处于恢复期时最理想的医患关系模式是共同参与型
103. 安静、不易激动、不灵活，这种神经活动类型所对应的气质类型是黏液质
104. 属于成熟防御机制的是幽默
105. 培养健全的人格、锻炼应对能力，调节情绪、储备社会支持力量、建立良好的人际关系均是心身疾病的预防从个人角度来说应遵循的原则
106. 认为"异常心理是由生物学因素影响而形成的"的理论模式为心理生物学理论模式
107. 智力发展的关键期在 7 岁前
108. 一位因高血压病住院治疗的老先生，得知患癌症的老伴想吃水果，于是偷偷跑出医院买苹果送到家中，结果因劳累使病情加重。这是病人角色的哪种变化角色行为减退
109. 一个有经验的医生，能够从 X 光片上看到并不为一般人所觉察的病灶，这是知觉的理解性
110. 目前心理应激的系统模型：应激是应激源、应激中介因素和应激反应多因素的作用过程、各因素相互影响，互为因果、各因素之间动态的平衡或失衡决定个体的健康或疾病、人格因素在系统模型中起核心作用
111. 睡眠障碍中，临床上多发生于遇到重大生活事件的人或神经症患者的是入睡困难入睡困难
112. 古代人的迷信把心理障碍行为异常归结，如月亮、星辰、精灵、魔鬼
113. 游戏对幼儿心理发展的作用：可增长知识，开发智力、有利于道德品质培养、有利于发展交往能力、有利于发展语言表达能力
114. 维护心理健康的原则是面对现实，适应环境、认识自己，悦纳自己、结交知己，与人为善、挫折磨砺，积极进取
115. "鱼与熊掌不可兼得"，这种动机冲突是双趋冲突
116. 应对就是个体对生活事件及其伴随的心身不平衡状态所作的认识和行为努力
117. "破釜沉舟"表现了避一避冲突的心理冲突



118. 按照心理现象进行分类，感觉障碍、思维障碍、记忆障碍属于认知过程障碍
119. 培养儿童自制力的关键时期是 2~3 岁
120. 共同参与型的医患关系模式最适合于慢性病人
121. 情感对于情绪来说具有的特点是稳定而深刻
122. 所谓否认机制(denial)是指否定应激事件，降低潜意识中的焦虑
123. 生物—心理—社会医学模式认为心身是统一的、心理对健康和疾病有能动作用、心理因素、社会因素和生物因素都影响人体健康和疾病的发生、在健康和疾病问题上应将人视为一个整体
124. "过分地谨小慎微，完美主义，胆小怕事，优柔寡断，过于细致，刻板固执，一丝不苟，反复推敲"，是强迫型人格障碍
125. 个体的心理健康主要从以良好的人际关系表现出来
126. 明尼苏达多项人格调查表最初是根据精神病临床需要编制的
127. 当感知过的事物重新出现在眼前时，能够识别出来，这是再认
128. 引起神经症的应激事件：应激事件的强度一般不太强但持续时间比较长、在别人看来无足轻重的应激事件可能引起神经症患者的强烈反应、患者对应激事件往往有一定的认识、应激事件更多来源于患者内心
129. 按照心身医学的观点，消化性溃疡属于心身疾病
130. 喜好用夸张性的方式表达情感，吸引他人注意，但情感肤浅、易变，以自我为中心，爱幻想，易受暗示，渴望得到赞许。描述属于表演型人格障碍
131. 青少年期的一般心理特点是自我意识基本形成
132. 某女青年，八级钳工，患糖尿病住院接受治疗，离开了熟悉的工作环境和同事，感到孤独，情绪低落。一天，病区水管坏了没人修理，她主动将其修理好，得到了大家的肯定，在以后的几天，该青年情绪明显好转。这说明她的自我成就的需要得到了满足
133. 马斯洛需要层次论中最高层次需要是自我实现的需要
134. 中年人心理卫生保健中强调的是确立生存意义、适度锻炼运动、加强人际交往、保持平和心态
135. 在发病、发展、转归和防治等方面都与心理、社会因素密切相关的躯体疾病称为心身疾病
136. 疑病症、强迫症、焦虑症、恐怖症属于神经症
137. 心理治疗的 4 个基本过程是问题探索阶段、分析认识阶段、治疗行动阶段、结束巩固阶段
138. 人格发展关键期是 3~7 岁
139. 人格特征具有独特性与共同性、社会性与生物性、稳定性与可塑性、整体性
140. 个体面对应激源，通过各种适当的行为和心理对策来消除紧张状态，称为应对
141. 心身疾病的治疗原则是心身相结合的原则
142. 与违法犯罪关系最为密切的人格障碍类型为反社会性型人格障碍
143. 人在社会中扮演多种角色，其行为应随时间环境不同进行调整，这是角色转换
144. 语言发展关键期是 1~3 岁
145. 心理过程包括认识、情绪和意志三个阶段
146. 心理应激：应激源是心理社会因素、可产生心理反应、可危及个人的健康、可产生生理反应
147. 癌症患者病前有一定的性格缺陷，这种性格称之为 C 型性格
148. 人格障碍是从童年或青少年始发、往往持续终生、人格显著偏离常态、适应不良的行为

模式难以矫正

149. 对于一位急性阑尾炎手术患者，医生采取的最合适的医患关系模式是指导—合作模式
150. 卡特尔认为人格是由人格特质构成的
151. 心理应激可引起生理反应、可引起心理和行为反应、经过认知评价、可能提高工作效率
152. 按照医学心理学的观点，冠心病属于心身疾病
153. 抑郁性障碍可能导致的最严重后果是自杀
154. 进入患者角色的根本原因是患病
155. 观察能力属于能力中的一般能力
156. H.Selye 认为，对机体有害的各种应激源，可引起以下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴为主的非特异性反应
157. 与 A 型行为性格关系最密切的疾病是冠心病
158. 抑郁发作时，一日之内的规律是昼重夜轻
159. 医师判断患者疾病已经康复，但患者本人认为自己还需要住院治疗，属于角色行为强化
160. 白雪在晚霞的映照下，呈现出红色，但是我们对雪地的知觉仍然是白色。这是因为人的知觉具有恒常性
161. 应激与神经系统的关系：情绪和行为与大脑边缘系统关系密切、额叶是与情绪有关的新皮质、紧张情绪可使交感神经系统功能亢进、交感神经系统参与了应激的免疫调节作用
162. A 型行为特征：有时间紧迫感、有竞争性、干工作非常认真、为成就努力奋斗
163. 恋物癖、窥阴癖、易性癖属于性心理障碍
164. 主动—被动式医患关系模式的原型是父母—婴儿
165. 记忆是人脑对过去经历过的事物的反映、记忆包括识记、保持、再认或再现三个基本环节、记忆按保持时间长短可分为感觉记忆、短时记忆、长时记忆、记忆保持过程是对识记材料的存储和巩固
166. 表示生活事件（应激源）的强度最好用累计 LCU 的值
167. 心身疾病的诊断需要考虑躯体、心理和社会三方面
168. 恐怖症最常用的行为治疗方法是系统脱敏
169. 艾森克人格问卷的分量表，代表情绪稳定性特征的是 N
170. 具有安静沉着、稳重、情绪反应慢特征的气质类型是黏液质
171. 应激系统中的认知评价受生活事件的性质、个性特征、社会支持、应对方式的影响
172. A 型行为的特征是时间紧迫感、竞争敌意、脾气急躁
173. 常见的人格障碍类型包括偏执型人格障碍、反社会型人格障碍、强迫型人格障碍、表演型人格障碍
174. 心理治疗和心理咨询本质上是相同的，但也有差别：工作任务不同、对象和情境不同、身份和工作方式不同、解决问题的性质和内容不同
175. 绘画能力属于能力中的特殊能力
176. 结婚属于正性生活事件
177. 冠心病、胃溃疡、癌症、原发性高血压属于心身疾病
178. 抑郁发作典型症状：抑郁心境、思维迟缓、思维内容障碍、意志活动减退
179. 卡特尔人格因素问卷，将人格因素分为 16 个
180. 心境的特点是持久且稳定
181. Lazarus 和 Folkman 认为应激过程最关键的因素是认知评价
182. 某患者，男，45 岁，某省厅干部，平时不嗜烟酒，生活规律，但性情急躁，易激动，

工作认真，争强好胜，雄心勃勃，1年前单位减员时调入某厂工作，常因小事上火，发脾气。3天前因心绞痛入院，诊断为冠心病。病前病人行为类型为A型

183. 妄想属于思维障碍
184. 心理咨询的基本手段包括宣泄、领悟、强化自我控制、增强自信心
185. 医师通常根据患者身体检查及辅助检查结果给疾病下诊断，这是思维的间接性特性
186. 个体处于应激状态时，表现出心率加快，血压增高，呼吸加速，血糖升高和肌张力增强，这些生理反应说明活动增强的神经内分泌系统是交感-肾上腺髓质轴
187. 十二指肠溃疡、癌症、糖尿病、支气管哮喘属于心身疾病
188. 洛夏墨迹测验、主题统觉测验、霍兹曼墨迹测验、词语联想测验属于人格的投射类测验
189. 最早提出气质概念的是希波克拉底
190. 合理化机制(rationalization)又称文饰作用
191. "考试不及格，则说考题太难超出要求。"这属于心理防御机制中的文饰
192. 当一个人真正意识到病情严重，初次感到死亡的威胁时，典型的反应是感到震惊并否认疾病
193. 事先有预定目的，不需要意志努力而产生的注意是有意后注意
194. 受奖励、休假、转学、失眠属于心理应激源
195. 冠心病多发生在40岁以后，脑力劳动者居多
196. 主动-被动模式的医患模式特征是"医师为患者做什么"
197. "江山易改，本性难移。"这句话说明的是气质的稳定性
198. 社会支持属于问题集中性应对
199. 广义心身疾病是指心理、社会因素在发病、发展过程中起重要作用的躯体功能性障碍、躯体器质性疾病
200. 医生需努力调动病人积极性的是共同参与型医患关系
201. 情绪可通过神经系统、内分泌系统和免疫系统的生理反应对人体的健康产生影响
202. 文化性应激源包括语言、生活方式、风俗习惯、宗教信仰
203. 替代学习疗法属于行为疗法
204. 恶性肿瘤患者的性格常为内向性格，情绪不稳定、过度合作、服从、克制、无攻击性、谨慎、孤独、抑郁
205. 记忆概念的理解：是一种很重要的心理过程，贯穿在人的各种心理活动之中、包括识记、保持、再认或回忆三个基本环节、保持过程体现了人脑对识记材料的主动加工、直观的、形象的、有意义的材料比抽象的、枯燥的材料识记效果好
206. 应激反应最贴切的含义是指个体因为应激源所致的生物、心理、社会、行为方面的变化
207. 心理咨询的对象大多数是心理困难的正常人
208. 偏头痛患者的性格常为内向不稳定型，倔强、固执、多虑、敏感、易躁、易怒、要求自己完美无缺等
209. 激情的特点是短暂且爆发
210. 一般而言，对应激性事件了解越多，结果更倾向于压力减轻
211. 某青年男性，因一次医疗事故双目失明，他从昏迷中醒来后，不吃不喝，也不与任何人说话，3天后，曾用刀片割腕自杀。这属于患者角色转化中的角色冲突
212. 富有竞争性，很易引起不耐烦，有时间紧迫感，固执己见，有旺盛的精力和过度的敌意，称之为A型行为类型
213. 公安机关有时会使用测谎仪帮助鉴别犯罪嫌疑人，其使用的原理主要是人在情绪反应

时，常常伴随一定的生理唤醒

- 214. 人格特征、生活经历、应激源性质、当时个体的心身状态影响个体对应激的认知评价
- 215. 某患者，男，61岁，刚从岗位上退下来，被诊断为肝硬化合并腹水，他承认有病，但仍想完成某本书的写作任务，甚至搬到办公室去住，废寝忘食，而忽略了治疗。该患者的行为属于患者角色行为的缺如
- 216. 心境平和，随遇而安，不争强好胜，做事不慌不忙，不计较得失，称之为 B 型行为类型
- 217. 心理实质是人脑对客观现实的主观能动的反映
- 218. 负性生活事件是指个体感觉不愉快的事件
- 219. 患者张某，男，46岁，被确诊为肺癌，即将进行肺部肿瘤切除术。要提供情绪支持、提供有关信息、进行行为应对训练、对手术提供示范和脱敏
- 220. 害怕竞争，逆来顺受，有气往肚子里咽，爱生闷气，称之为 D 型行为类型
- 221. "人逢喜事精神爽"是心境
- 222. 急性心理应激反应症状可能和甲亢混淆
- 223. 一位头部大面积烧伤的患者在获知自己的面容没法完全恢复到从前的模样后，对在场的医生护士进行殴打，这属于患者角色行为的异常
- 224. 心身疾病的治疗原则是心身相结合的原则
- 225. 心理学的研究对象是人的心理活动和行为
- 226. 某乙肝患者升学体检中掩盖病情，报考了一所要求肝功能正常的大学。这种行为属于病人角色适应不良的角色行为缺如
- 227. 有效对应激的评价调整方法是分散对消极应激源的注意
- 228. 心身疾病的诊断原则之一是病情变化与心理社会因素有关
- 229. 与肿瘤有密切关系的行为是 C 型
- 230. 有固定施测条件、标准的指导语、统一的记分方法、使用标准化工具属于心理测量标准化要求的内容
- 231. 对应激以减轻紧张的措施是利用各种放松技术
- 232. 动机产生的两个条件是需要和诱因
- 233. 特征是"医师教会患者做什么"属于指导-合作模式
- 234. 一个家庭关系紧张的人，尽可能缩短在家逗留的时间，变成一个“工作迷”，这一现象是应激的行为反应
- 235. 学习和记忆的电生理学基础是突触长时程增强电位
- 236. 一男性农民，因急性肠梗阻住院，外科医生决定进行手术治疗，病人听后产生了严重的焦虑不安，因为手术不仅医疗费用高，而且他作为一家四口之主，为不能去担负家庭重担感到十分内疚和不安。这是病人角色的角色行为冲突
- 237. 一个人要在公众面前讲话前，心跳加速，血压升高，这一现象是应激的生理反应
- 238. A 型性格的人易患冠心病
- 239. 儿童病人的求医行为属被动型
- 240. 一位外科手术前的病人，坐卧不安，眉头紧锁，小动作多，这一现象是应激的情绪反应
- 241. 思维的重要特征是间接性和概括性
- 242. 建立医患关系的原则是疾病性质和病人的人格特质
- 243. 个体的强烈需求或过高的期望属于心理性应激源
- 244. 情绪由情景、认知、生理变化相互作用而形成



245. 影响病人遵医行为的因素是病人的人口统计学特点、医患关系、疾病严重程度、治疗计划特点
246. 语言、风俗习惯的改变属于文化性应激源
247. 患者，男，58岁。一位内科医生观察到该患者胸部X光片在肺门区有一直径约4cm、密度较高、边缘不整的团块状阴影，于是判断其患有中心型肺癌。这是医生思维特征的间接性
248. 人本主义疗法的特点：以询者为中心、放松训练、非指令性治疗的技巧、言语操作性条件试验
249. 自然灾害造成重大打击属于社会性应激原
250. 想象的基本材料是表象
251. 一个昏迷病人被送到医院，医生对他进行治疗，这种医患关系属于主动-被动型
252. 一位年轻人在公交车上坐在“老幼病残孕”专座上，拒绝把座位让给身边的老人，受到周边人的指责。周边人的行为体现的是道德感
253. 医生劝病人“你应该参加一些晨间锻炼”，这种医患关系属于指导-合作型
254. 需要层次理论是由马斯洛提出的
255. 语言知觉测验属于神经心理学测验
256. 注视一个绿色的圆形一段时间，然后将视线转移到身边的白墙上，将在白墙上看到一个红色的圆影子，这是后像
257. 主题统觉测验属于人格投射测验
258. 马斯洛五个需要层次由低到高的顺序是生理的需要、安全的需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要
259. SCL-90 属于评定量表
260. 人格核心是性格
261. 期望继续享有病人角色所获得的利益，是病人角色的角色行为强化
262. 情绪是与生理需要相联系的
263. 否认自己有病，不及时就医是病人角色的角色行为缺如
264. 按照需要起源，可把需要分为生理性需要和社会性需要
265. 不把自己当病人，仍坚持带病工作是病人角色的角色行为减退
266. “想吃糖，又怕胖”，这种动机冲突是趋避冲突
267. 以精神分析理论为基础的疗法是自由联想疗法
268. 个性结构理论认为本我、自我和超我保持平衡状态有利于人格正常发展
269. 以行为主义理论为基础的疗法是系统脱敏疗法
270. 对现实的态度特征、意志特征、情绪特征、智力特征属于性格特征
271. 以人本主义理论为基础的疗法是询者中心疗法
272. 认知过程包括感觉、知觉、记忆、思维、注意
273. 医务人员对病人的态度首先会成为影响遵医行为的因素
274. 崇尚自然、欣赏艺术、提倡文明体现的情感是美感
275. 病人对其疾病的认识和态度会成为影响遵医行为的因素
276. 一位术前病人既想通过手术解除病痛，又担心手术会影响机体的某些功能，此时所形成的动机冲突是趋避冲突
277. 医疗条件及医务人员的技术水平主要会成为影响疾病诊断的因素
278. 无意想象没有预定目的，不自觉地进行想象活动

- 279. 可以免除或部分免除健康时的社会责任是病人的权力
- 280. 有意想象是根据一定目的，自觉地进行想象活动
- 281. 病人的疾病已康复，但仍不愿意脱离病人角色，属病人角色行为强化
- 282. 马斯洛需要层次论中最高层次需要是自我实现的需要
- 283. 及时就医并遵守医嘱及医院的各项规章制度，属病人的义务
- 284. 发挥自己的潜能，实现自己的理想与抱负的需要是自我实现的需要
- 285. 意志行动中善于控制自己的行动，约束自己言行的心理品质是意志的自制性
- 286. 办事见异思迁，虎头蛇尾的人，其意志活动缺乏坚韧性
- 287. 执拗和一意孤行的人，其意志活动缺乏坚韧性
- 288. “前有狼，后有虎”，这种动机冲突是双避冲突
- 289. “鱼与熊掌不可兼得”，这种动机冲突是双趋冲突
- 290. “想吃糖，又怕胖”，这种动机冲突是趋避冲突
- 291. 一名幼儿去动物园游玩，能说出很多动物的名字，这是知觉的理解性
- 292. 一个有经验的医生，能够从 X 线片上看到并不为一般人所觉察的病灶，这是知觉的理解性
- 293. 气质表现为心理活动的动力特征
- 294. 能力是直接影响活动效率的个性心理特征
- 295. 人格是人的各种稳定的心理特征的总和
- 296. 性格是人对现实稳定的态度及与之相应的行为模式
- 297. 直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映是感觉
- 298. 直接作用于感觉器官的客观事物的整体反映是知觉
- 299. 对物体距离、形状、大小、方位等空间特性的知觉称为空间知觉
- 300. 对物体在空间位移的知觉称为运动知觉
- 301. 以感知过的事物形象为内容的记忆叫形象记忆
- 302. 以体验过的某种情绪或情感为内容的记忆叫情绪记忆
- 303. 注意的稳定性是在一定时间内注意保持在某项活动上的特性
- 304. 注意的分配是在同时进行两种或几种活动时，把注意力指向不同的对象